

第二章 导数与微分

- § 1 导数概念
- § 2 函数的求导法则
- § 3 高阶导数
- § 4 隐函数及由参数方程所确定的函数的导数
- § 5 函数的微分

第四节

隐函数及由参数方程所确定的函数的导数

内容

一、隐函数的导数

二、由参数方程所确定的函数的导数



一、隐函数的导数

显函数 给了 x ,直接得到 y 的函数,如 $y = f(x)$

1 隐函数 如果变量 x 和 y 满足一个方程 $F(x, y) = 0$,在一定条件下,当 x 取某区间内任一值时总有**唯一的** y 与之对应,称方程 $F(x, y) = 0$ 在该区间内确定了一个隐函数 $y = f(x)$


例如, $x - y^3 - 1 = 0$ 可确定显函数 $y = \sqrt[3]{x-1}$

$y^5 + 2y - x - 3x^7 = 0$ 可确定 y 是 x 的函数,


但此隐函数不能显化.

隐函数的图形


二元方程 $F(x, y) = 0$ 所确定的一元隐函数的图形比一元显函数的图形更复杂更漂亮.




$$\sin^2 5x - \sin^2 2y + \sin x \sin 5y = 0$$




$$(x^2 + y^2)^2 - \frac{2xy}{\sin 40xy} = 1$$



$$\sin\left(\sqrt{x^2 + y^2} + 0.1x^2y^2\right) = 0$$



$$\sin((x^2 + y^2)^3 - (x^2 - y^2)^2) + \sin x \sin y = 0.25$$



$$y^5 + 3x^2y^2 + 5x^4 - 12\sin(3x^2 + 3y^2) = 0$$

怎么对隐函数求导呢？

考虑求由方程 $e^y + xy - e = 0$ 所确定的隐函数的导数 $\frac{dy}{dx}$

解 方程两边同时对 x 求导,这里 $y=y(x)$

$\frac{d}{dx}(e^y + xy - e) = 0$ 由复合函数求导法则

$$e^y \cdot y' + y + xy' = 0 \Rightarrow y'(x) = \frac{-y}{x + e^y} \quad (x + e^y \neq 0)$$

2 隐函数求导法则

由方程 $F(x, y) = 0$ 确定的隐函数 $y = f(x)$ 只须对恒等式 $F(x, f(x)) = 0$ 两边对 x 求导,并解出 $f'(x)$ 或 y' ,它是 x, y 的函数,有时利用 $F(x, y) = 0$ 化简 y' ,此时答案 y' 形式有所不同

3 典型题 ①隐函数求一阶导数

例求椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 上点 $P(1, \frac{3}{2})$ 处的切线方程和法线方程

解：方程两边对 x 求导

$$\frac{x}{2} + \frac{2}{3}y \cdot y' = 0 \Rightarrow y' = -\frac{3x}{4y}$$

$$\therefore y' \bigg|_{\substack{x=1 \\ y=\frac{3}{2}}} = -\frac{1}{2}$$

切线方程为 $y - \frac{3}{2} = -\frac{1}{2}(x - 1)$

法线方程为 $y - \frac{3}{2} = 2(x - 1)$

3 典型题 ①隐函数求一阶导数

例 设函数 $y=y(x)$ 由方程 $x^3 + y^3 + 3xy - 6x - 7 = 0$ 确定, 求 $\left. \frac{dx}{dy} \right|_{y=2}$

解 方法一 $\left. \frac{dx}{dy} \right|_{y=2} = \frac{1}{\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=-1}}$ 方程两边对 x 求导

$$3x^2 + 3y^2 \cdot y' + 3y + 3xy' - 6 = 0$$

$$\Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{2 - x^2 - y}{y^2 + x} \Rightarrow \left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=-1, y=2} = -\frac{1}{3} \quad \therefore \left. \frac{dx}{dy} \right|_{y=2} = -3$$

方法二 方程两边对 y 求导

$$3x^2 \cdot \frac{dx}{dy} + 3y^2 + 3 \frac{dx}{dy} \cdot y + 3x - 6 \frac{dx}{dy} = 0 \Rightarrow \frac{dx}{dy} = \frac{y^2 + x}{2 - x^2 - y} \Rightarrow \left. \frac{dx}{dy} \right|_{y=2} = -3$$


3 典型题 ②隐函数求二阶导数

例 求由方程 $x - y + \frac{1}{2}\sin y = 0$ 所确定的隐函数的二阶导数 $\frac{d^2 y}{dx^2}$

解 方程两边对 x 求导

$$1 - y' + \frac{1}{2}\cos y \cdot y' = 0 \Rightarrow y' = \frac{2}{2 - \cos y}$$

对 x 再次求导

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{-2 \cdot \sin y \cdot y'}{(2 - \cos y)^2} = \frac{-2 \sin y}{(2 - \cos y)^2} \cdot \frac{2}{2 - \cos y} = \frac{-4 \sin y}{(2 - \cos y)^3}$$


3 典型题 ②隐函数求二阶导数

例 设函数 $y=y(x)$ 由方程 $e^y + xy = e$ 所确定, 求 $y''(0)$

解 $x=0, y=1$ 两边对 x 求导

$$e^y \cdot y' + y + x \cdot y' = 0$$

对 x 再次求导

$$e^y \cdot (y')^2 + e^y \cdot y'' + y' + y' + x \cdot y'' = 0$$

$$\text{代入 } x=0, y=1 \Rightarrow y'(0) = -\frac{1}{e}$$

$$\Rightarrow y''(0) = \frac{1}{e^2}$$

3 典型题 ③对数求导法

如果一个函数是**幂指函数** $f(x)^{g(x)}$ 或是**连乘连除**以及**根乘幂**等形式,一般可先取对数,再**运用**隐函数求导法,在有加减运算时慎用

例求 $y = \sqrt{\frac{(x-1)(x-2)}{(x-3)(x-4)}}$ 的导数

$$(\ln|u|)' = \frac{u'}{u}$$

解 两边取对数

$$\ln y = \frac{1}{2} [\ln|x-1| + \ln|x-2| - \ln|x-3| - \ln|x-4|]$$

$$\text{对 } x \text{ 求导 } \frac{y'}{y} = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{x-1} + \frac{1}{x-2} - \frac{1}{x-3} - \frac{1}{x-4} \right]$$

$$y' = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{(x-1)(x-2)}{(x-3)(x-4)}} \left[\frac{1}{x-1} + \frac{1}{x-2} - \frac{1}{x-3} - \frac{1}{x-4} \right]$$

3 典型题 ③对数求导法

如果一个函数是**幂指函数** $f(x)^{g(x)}$ 或是**连乘连除**以及**根乘幂**等形式,一般可先取对数,再**运用**隐函数求导法,在有加减运算时慎用

例 求 $y = x^{\sin x}$ ($x > 0$)的导数.

解: 两边取对数,化为隐式

$$\ln y = \sin x \cdot \ln x$$

两边对 x 求导

$$\frac{1}{y} y' = \cos x \cdot \ln x + \frac{\sin x}{x}$$

$$\therefore y' = x^{\sin x} \left(\cos x \cdot \ln x + \frac{\sin x}{x} \right)$$

3 典型题 ③对数求导法

如果一个函数是**幂指函数** $f(x)^{g(x)}$ 或是**连乘连除**以及**根乘幂**等形式,一般可先取对数,再**运用**隐函数求导法,在有加减运算时慎用

例 求由方程 $x^y = y^x + 10^{x^2}$ 所确定的函数 $y=y(x)$ 的导数

注意到 不能用对数求导法

3 典型题

④利用指数恒等式 $a = e^{\ln a}$ 适用于幂指函数

例 求由方程 $x^y = y^x + 10^{x^2}$ 所确定的函数 $y=y(x)$ 的导数

注意到 不能用对数求导法

3 典型题

④利用指数恒等式 $a = e^{\ln a}$ 适用于幂指函数

例 求由方程 $x^y = y^x + 10^{x^2}$ 所确定的函数 $y=y(x)$ 的导数

解 $e^{y \ln x} = e^{x \ln y} + 10^{x^2}$

两边对 x 求导

$$e^{y \ln x} \left(y' \ln x + \frac{y}{x} \right) = e^{x \ln y} \left(\ln y + \frac{x}{y} \cdot y' \right) + 10^{x^2} \cdot \ln 10 \cdot 2x$$

同乘以 xy , 得
$$y' = \frac{xy^{x+1} \ln y - y^2 x^y + 2x^2 y \cdot 10^{x^2} \cdot \ln 10}{yx^{y+1} \ln x - x^2 y^x}$$

3 典型题

④利用指数恒等式 $a = e^{\ln a}$ 适用于幂指函数

例 求 $y = x^{\sin x}$ ($x > 0$) 的导数.

解: $y = e^{\sin x \cdot \ln x}$

两边对 x 求导

$$y' = e^{\sin x \cdot \ln x} \left(\cos x \cdot \ln x + \frac{\sin x}{x} \right)$$

$$\text{即 } y' = x^{\sin x} \left(\cos x \cdot \ln x + \frac{\sin x}{x} \right)$$

3 典型题

③对数求导法

如果一个函数是**幂指函数** $f(x)^{g(x)}$ 或是**连乘连除**以及**根式乘幂**等形式,一般可先取对数,再运用隐函数求导法,在有加减运算时慎用

例 求 $y = x^{\sin x}$ ($x > 0$) 的导数.

解: 两边取对数, 化为隐式

$$\ln y = \sin x \cdot \ln x$$

两边对 x 求导

$$\frac{1}{y} y' = \cos x \cdot \ln x + \frac{\sin x}{x}$$

$$\therefore y' = x^{\sin x} \left(\cos x \cdot \ln x + \frac{\sin x}{x} \right)$$

二、由参数方程确定的函数的导数

1定义 若参数方程 $\begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) \end{cases}$ 确定 y 与 x 间的函数关系, 称此关系所表达的函数为由参数方程所确定的函数

怎么对参数方程求导?

若 $x = \varphi(t)$ 单调连续且反函数 $t = \varphi^{-1}(x)$ 与 $y = \psi(t)$ 能复合, 那么消 t 后参数方程确定的函数可以看成 $y = \psi(\varphi^{-1}(x))$

$$\boxed{\frac{dy}{dx}} = \psi'(t) \cdot \frac{dt}{dx} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \boxed{\frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}}$$

2 参数方程求导法则

设 $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}$ 在 (α, β) 上均可导且 $x'(t) \neq 0$, 则由参数方程确定的函数 $y = y(x)$ 的导数为

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y'(t)}{x'(t)} = \frac{dy/dt}{dx/dt}$$

$$\frac{d^2 y}{d x^2} \neq \left(\frac{y'(t)}{x'(t)} \right)'$$

二阶求导

$$\begin{cases} x = x(t) \\ y' = \frac{dy/dt}{dx/dt} \end{cases} \quad \begin{aligned} \frac{d^2 y}{dx^2} &= \frac{dy'/dt}{dx/dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{y'(t)}{x'(t)} \right) \bigg/ \frac{dx}{dt} \\ &= \frac{y''(t) \cdot x'(t) - y'(t) \cdot x''(t)}{[x'(t)]^3} \end{aligned}$$

3典型题 ①参数方程求二阶导数

例求由参数方程 $\begin{cases} x = \sqrt{1-t^2} \\ y = \arcsin t \end{cases}$ 所确定的函数 $y=y(x)$ 的二阶导数 $\frac{d^2 y}{dx^2}$

解 $\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{1}{\sqrt{1-t^2}} \bigg/ \frac{-t}{\sqrt{1-t^2}} = -\frac{1}{t}$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{dy'/dt}{dx/dt} = \frac{1}{t^2} \bigg/ \frac{-t}{\sqrt{1-t^2}} = -\frac{\sqrt{1-t^2}}{t^3}$$

3典型题 ①参数方程求二阶导数

例计算由摆线的参数方程 $\begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases}$ 所确定的函数

$y=y(x)$ 的二阶导数 $\frac{d^2 y}{dx^2}$


摆线 半径是 a 的圆沿直线滚动时,其上定点的轨迹.

方程 $\begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases}$

周期 $T = 2\pi a$

一拱长 $8a$

一拱面积 $3\pi a^2$



3典型题 ①参数方程求二阶导数

例 计算由摆线的参数方程 $\begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases}$ 所确定的函数

$y=y(x)$ 的二阶导数 $\frac{d^2 y}{dx^2}$

解 $\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{a \sin t}{a(1 - \cos t)} = \frac{\sin t}{1 - \cos t} = \frac{2 \sin \frac{t}{2} \cos \frac{t}{2}}{2 \sin^2 \frac{t}{2}} = \cot \frac{t}{2}$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{dy'/dt}{dx/dt} = -\frac{1}{2 \sin^2 \frac{t}{2}} \cdot \frac{1}{a(1 - \cos t)} = -\frac{1}{a(1 - \cos t)^2}$$

3典型题 ②隐函数参数方程求导

例 设 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} e^x = 3t^2 + 2t + 1 \\ t \sin y - y + \frac{\pi}{2} = 0 \end{cases}$ 所确定,求 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=0}$

解 参数方程两边对 t 求导

$$\begin{cases} e^x \cdot \frac{dx}{dt} = 6t + 2 \\ \sin y + t \cos y \cdot \frac{dy}{dt} - \frac{dy}{dt} = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{dx}{dt} = e^{-x} (6t + 2) \\ \frac{dy}{dt} = \frac{\sin y}{1 - t \cos y} \end{cases}$$

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=0} = \frac{e^x \sin y}{(6t + 2)(1 - t \cos y)} \bigg|_{\substack{t=0 \\ x=0 \\ y=\frac{\pi}{2}}} = \frac{1}{2}$$