

第五章

积分学 $\left\{ \begin{array}{l} \text{不定积分} \\ \text{定积分} \end{array} \right.$

定积分

§ 1 定积分的概念与性质

§ 2 微积分基本公式

§ 3 定积分的换元法和分部积分法

§ 4 反常积分

第一节

定积分的概念与性质



内容

- 一、定积分问题举例
- 二、定积分定义
- 三、定积分性质

一、定积分问题举例

$$\text{矩形面积} = ah$$




$$\text{梯形面积} = \frac{h}{2}(a+b)$$

1. 曲边梯形的面积

设曲边梯形是由连续曲线

$$y = f(x) \quad (f(x) \geq 0)$$

及 x 轴, 以及两直线 $x = a, x = b$ 所围成, 求其面积 A .



解决步骤：

1)分割 在区间 $[a,b]$ 中任意插入 $n-1$ 个分点

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b$$

用直线 $x = x_i$ 将曲边梯形分成 n 个小曲边梯形；

2)取点 在第 i 个窄曲边梯形上任取 $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$

作以 $[x_{i-1}, x_i]$ 为底, $f(\xi_i)$


为高的小矩形,并以此小

矩形面积近似代替相应

窄曲边梯形面积 ΔA_i , 得

$$\Delta A_i \approx f(\xi_i) \Delta x_i$$

$$(\Delta x_i = x_i - x_{i-1}, i = 1, 2, \dots, n)$$





3) 作和

$$A = \sum_{i=1}^n \Delta A_i \approx \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$$

4) 取极限 令 $\lambda = \max\{\Delta x_i\}, 1 \leq i \leq n$

则曲边梯形面积


$$\begin{aligned} A &= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \Delta A_i \\ &= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i \end{aligned}$$



2. 变速直线运动的路程

设物体作直线运动, 已知速度 $v = v(t) (\geq 0)$ 是时间间隔 $[T_1, T_2]$ 上的连续函数, 求在运动时间内物体所经过的路程 s .

解决步骤:



1) 分割 在 $[T_1, T_2]$ 中任意插入 $n-1$ 个分点, 将它分成 n 个小段 $[t_{i-1}, t_i] (i=1, 2, \Lambda, n)$, 在每个小段上物体经过的路程为 $\Delta s_i (i=1, 2, \Lambda, n)$

2) 取点 任取 $\xi_i \in [t_{i-1}, t_i]$, 以 $v(\xi_i)$ 代替变速, 得

$$\Delta s_i \approx v(\xi_i) \Delta t_i \quad (i=1, 2, \Lambda, n)$$

3) 作和

$$s \approx \sum_{i=1}^n v(\xi_i) \Delta t_i$$

4) 取极限

$$s = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n v(\xi_i) \Delta t_i \quad (\lambda = \max_{1 \leq i \leq n} \Delta t_i)$$

上述两个问题的**共性**:

- 所求量和一个区间 $[a,b]$ 以及该区间上的一个函数 $f(x)$ 有关
- 所求量对区间有**可加性**,即总量等于部分量之和
- 所求量解决方法相同:“**分割, 取点, 作和, 取极限**”
- 所求量极限结构式相同: **特殊乘积和式的极限**

二、定积分的定义

1定义 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界, 若对 $[a, b]$ 的任一种分法


$a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_n = b$, 令 $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$, 任取

$\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$, 只要 $\lambda = \max_{1 \leq i \leq n} \{\Delta x_i\} \rightarrow 0$ 时 $\sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$


总趋于确定的极限 I , 则称此极限 I 为函数 $f(x)$ 在区间

$[a, b]$ 上的**定积分**, 记作 $\int_a^b f(x) dx$

$$\text{即 } \int_a^b f(x) dx = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$$



此时称 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上**可积**.



说明: i) $a > b$ 时, $\Delta x_i < 0$, $\int_a^b f(x) dx = -\int_b^a f(x) dx$, $\int_a^a f(x) dx = 0$


ii) $\int_a^b f(x) dx$ 表示一个数, 取决于 $[a, b]$ 和 $f(x)$, 与积分变量的记号无关, 即 $\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(t) dt = \int_a^b f(u) du$

说明:

iii) 几何意义

$f(x) > 0, \int_a^b f(x) dx = A$ 曲边梯形面积

$f(x) < 0, \int_a^b f(x) dx = -A$ 曲边梯形面积的负值




$$\int_a^b f(x) dx = A_1 - A_2 + A_3 - A_4 + A_5$$

各部分面积的代数和


说明:

iii) 几何意义

例1 $\int_0^1 x dx$
 $= \frac{1}{2}$



例2 $\int_0^R \sqrt{R^2 - x^2} dx$
 $= \frac{\pi}{4} R^2$




例3 已知函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上满足 $f(x)>0$, $f'(x)<0$, $f''(x)>0$

试从定积分的几何意义,比较下述三个数的大小

$$I_1 = \int_a^b f(x) dx, \quad I_2 = f(b)(b-a), \quad I_3 = \frac{b-a}{2} [f(a) + f(b)]$$

解 非负函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上单减,上凹

$$\text{故 } I_3 > I_1 > I_2$$



说明:

iv) $\int_a^b f(x)dx$ 是 $\sum_{i=1}^n f(\xi_i)\Delta x_i$ 的极限, 这个极限一旦存在, 与分划, 取法无关; 若由于分划, 取法不同导致和式极限不同或不存, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上一定不可积

例 $D(x) = \begin{cases} 1 & x \text{ 为有理数} \\ 0 & x \text{ 为无理数} \end{cases}$

任取分划 $a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_{n-1} < x_n = b$

若 ξ_i 取有理点 和式为 $b-a$ \therefore 不可积

若 ξ_i 取无理点 和式为 0

二、定积分的定义

2可积准则

可积的必要条件

若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积,则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上必有界

可积的充分条件

设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续,则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积

设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有界,且只有有限个间断点,
则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积

3 怎样利用定积分定义解题

①利用定积分定义求定积分


例. 利用定义计算定积分 $\int_0^1 x^2 dx$.

解: 将 $[0,1]$ n 等分, 分点为 $x_i = \frac{i}{n}$ ($i = 0, 1, \dots, n$)

取 $\xi_i = \frac{i}{n}$, $\Delta x_i = \frac{1}{n}$ ($i = 1, 2, \dots, n$)

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i &= \sum_{i=1}^n \frac{i^2}{n^3} = \frac{1}{n^3} \sum_{i=1}^n i^2 \\ &= \frac{1}{n^3} \cdot \frac{1}{6} n(n+1)(2n+1)\end{aligned}$$

$$\int_0^1 x^2 dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{6} \left(1 + \frac{1}{n}\right) \left(2 + \frac{1}{n}\right) = \frac{1}{3}$$



$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$$

②利用定积分定义求极限（数列之和）

$$a < a + \frac{b-a}{n} < a + 2\frac{b-a}{n} < \Lambda < a + \frac{n}{n}(b-a) = b$$

$$[a, a + \frac{b-a}{n}], [a + \frac{b-a}{n}, a + 2\frac{b-a}{n}], \Lambda, [a + (i-1)\frac{b-a}{n}, a + i\frac{b-a}{n}], \Lambda, [a + (n-1)\frac{b-a}{n}, b]$$

$$\xi_i = a + \frac{i}{n}(b-a) \quad \Delta x_i = \frac{b-a}{n}$$

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(a + \frac{i}{n}(b-a)) \frac{b-a}{n}$$

$$\int_0^1 f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(\frac{i}{n}) \frac{1}{n}$$

例1. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2^2}} + \Lambda + \frac{1}{\sqrt{n^2+n^2}} \right)$

分析：用两边夹准则或用定积分定义求

找一般值 a_i $\begin{cases} = f(\frac{i}{n}) \frac{1}{n} & \text{能用定积分定义求} \\ & \text{必须出现 } \frac{i}{n} \text{ 且当作一个变量} \\ \neq f(\frac{i}{n}) \frac{1}{n} & \text{不能用} \end{cases}$

解： $\frac{1}{\sqrt{n^2+i^2}} = \frac{1}{\sqrt{1+(\frac{i}{n})^2}} \cdot \frac{1}{n}$

$$\int_0^1 f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f\left(\frac{i}{n}\right) \frac{1}{n}$$

$$\text{原式} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{1+(\frac{i}{n})^2}} \cdot \frac{1}{n} = \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} = \ln(1+\sqrt{2})$$

(学完下节后能求)

练习. 用定积分表示下列极限:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sqrt{1 + \frac{i}{n}}$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^p + 2^p + \dots + n^p}{n^{p+1}}$$

解: (1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sqrt{1 + \frac{i}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \sqrt{1 + \frac{i}{n}} \cdot \frac{1}{n} \leftarrow \Delta x_i$

$= \int_0^1 \sqrt{1+x} \, dx$

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^p + 2^p + \dots + n^p}{n^{p+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \left(\frac{i}{n}\right)^p \frac{1}{n} \leftarrow \Delta x_i$

$= \int_0^1 x^p \, dx$

三、定积分的性质 (设所列定积分都存在)

1. 线性性 $\int_a^b [f(x) \pm g(x)] dx = \int_a^b f(x) dx \pm \int_a^b g(x) dx$


$$\int_a^b k f(x) dx = k \int_a^b f(x) dx \quad (k \text{ 为常数})$$

$$\int_a^b dx = b - a$$

2. 可加性 $\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$

证: 当 $a < c < b$ 时, 成立

当 $a < b < c$ 时,



$$\int_a^c f(x) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx$$

$$\therefore \int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx - \int_b^c f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$$

3. 不等式性质

i) 若在 $[a, b]$ 上 $f(x) \geq 0$, 则 $\int_a^b f(x) dx \geq 0$.

ii) 若在 $[a, b]$ 上 $f(x) \leq g(x)$, 则 $\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$

i)' 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $f(x) \geq 0$, 且 $f(x) \not\equiv 0$, 则 $\int_a^b f(x) dx > 0$

iii) $\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx$


4. 估值定理 设 $M = \max_{[a, b]} f(x)$, $m = \min_{[a, b]} f(x)$, 则

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a) \quad (a < b)$$

用于不能
求原函数
的积分

例 $\frac{1}{e} < \int_0^1 e^{-x^2} dx < 1$

例 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续, $g(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续,且 $g(x)$ 不变号,则至少存在一点 $\xi \in [a,b]$ 使得 $\int_a^b f(x)g(x)dx = f(\xi)\int_a^b g(x)dx$

$$\int_a^b f(x)dx = f(\xi)(b-a)$$


取 $g(x)=1$

分析 出现了 $f(\xi)$ 没有导数,考虑用介值定理

证明: 不妨设 $g(x) \geq 0$ 设 $M = \max_{[a,b]} f(x)$, $m = \min_{[a,b]} f(x)$,

则 $m \leq f(x) \leq M$, $mg(x) \leq f(x)g(x) \leq Mg(x)$

$$\int_a^b mg(x)dx \leq \int_a^b f(x)g(x)dx \leq \int_a^b Mg(x)dx \quad \text{即} \quad m \leq \frac{\int_a^b f(x)g(x)dx}{\int_a^b g(x)dx} \leq M$$

由介值定理 $\exists \xi \in [a,b]$,使 $\int_a^b f(x)g(x)dx = f(\xi)\int_a^b g(x)dx$

5.积分中值定理

$f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续,则至少存在一点 $\xi \in [a,b]$ 使得


$$\int_a^b f(x)dx = f(\xi)(b-a)$$

说明: i)题目中出现将定积分变成某一点的函数值的特征
考虑利用积分中值定理

ii) $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续,则至少存在一点 $\xi \in (a,b)$ 使得

$$\int_a^b f(x)dx = f(\xi)(b-a) \quad \text{下节例题}$$

iii)几何意义



$$\begin{aligned} \int_a^b f(x)dx \\ = f(\xi)(b-a) \end{aligned}$$

例1 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续,在 $(0,1)$ 内可导,且 $3\int_{\frac{2}{3}}^1 f(x)dx = f(0)$

证明在 $(0,1)$ 内存在一点 c ,使 $f'(c)=0$

证明 由积分中值定理 $\int_{\frac{2}{3}}^1 f(x)dx = \frac{1}{3}f(\xi)$, $\xi \in [\frac{2}{3}, 1]$

于是 $f(\xi) = f(0)$

又因为 $f(x)$ 在 $[0, \xi]$ 上连续,在 $(0, \xi)$ 内可导,由罗尔定理

$\exists c \in (0, \xi) \subset (0, 1)$, 使 $f'(c) = 0$

例2 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上可微, $f(1)=2\int_0^{\frac{1}{2}} e^{1-x^2} f(x)dx$

证明在 $(0,1)$ 内存在一点 ξ , 使 $f'(\xi)=2\xi f(\xi)$

证明 设 $F(x)=e^{1-x^2} f(x)$

由积分中值定理 $f(1)=2F(\eta)\cdot\frac{1}{2}=F(\eta)$, $\eta\in[0,\frac{1}{2}]$

即 $F(1)=F(\eta)$

因为 $F(x)$ 在 $[\eta,1]$ 上连续,在 $(\eta,1)$ 内可导,由罗尔定理

$\exists \xi \in (\eta,1) \subset (0,1)$, 使 $F'(\xi)=0$

$$F'(x) = -2xe^{1-x^2} f(x) + e^{1-x^2} f'(x) = e^{1-x^2} (f'(x) - 2xf(x))$$

从而 $f'(\xi) - 2\xi f(\xi) = 0$ 命题得证