

## 第四节

## 无穷小与无穷大

内容

无穷小与无穷大

概念 性质

关系



## 一无穷小

**定义** 以0为极限的数列或函数称为无穷小

记为  $\lim \alpha = 0$  包括

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0 \quad \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0 \quad \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$$

**说明** i)证明数列或函数为无穷小，即证明其极限为零

**例如**  $x^2, \sin x, \tan x, 1 - \cos x$  为  $x \rightarrow 0$  时无穷小

$\frac{1}{x}, \frac{\sin x}{x}, e^{-x^2}$  为  $x \rightarrow \infty$  时无穷小

$\frac{1}{\sqrt{n}}$  为  $n \rightarrow \infty$  时无穷小

ii)当说明  $f(x)$  为无穷小时，要指明在何种变化下

# 定理 1 (函数极限与无穷小的关系)

$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \iff f(x) = A + \alpha$ , 其中  $\alpha$  为  $x \rightarrow x_0$  时的无穷小量.

证:  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$

$\iff \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ , 当  $0 < |x - x_0| < \delta$  时, 有

$$|f(x) - A| < \varepsilon \quad |\alpha - 0| < \varepsilon$$

$$\xrightarrow{\alpha = f(x) - A} \lim_{x \rightarrow x_0} \alpha = 0$$

对自变量的其他变化过程类似可证.

常在证明中应用, 可将极限号去掉给出  $f(x)$  的表达式

## 二、无穷大

**定义** 绝对值无限增大的数列或函数称为无穷大

记为  $\lim f(x) = \infty$  3种情况  $\infty, +\infty, -\infty$

6种情况  $x \rightarrow x_0, x_0^+, x_0^-, \infty, +\infty, -\infty$

书上42页

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty \Leftrightarrow \forall M > 0, \exists \delta > 0, \text{ 当 } 0 < |x - x_0| < \delta \text{ 时的 } x,$$

$$\text{总有 } |f(x)| > M$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty \Leftrightarrow \forall M > 0, \exists X > 0, \text{ 当 } |x| > X \text{ 时的 } x, \text{ 总有}$$

$$|f(x)| > M$$

例如  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} =$

$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-x} =$

$\lim_{n \rightarrow +\infty} \ln n =$

$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \tan x =$

$\lim_{x \rightarrow 0^-} \cot x =$

例 证明  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x-1} = \infty$


证：任给正数  $M$ ，要使  $\left| \frac{1}{x-1} \right| > M$ ，即  $|x-1| < \frac{1}{M}$ ，  
只要取  $\delta = \frac{1}{M}$ ，则对满足  $0 < |x-1| < \delta$  的一切  $x$ ，有

$$\left| \frac{1}{x-1} \right| > M$$

所以  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x-1} = \infty$ .

说明：若  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$ ，则直线  $x = x_0$

为曲线  $y = f(x)$  的铅直渐近线。



铅直渐近线

### 三 无穷小与无穷大的关系

**定理2** 在自变量的同一变化过程中,

若  $f(x)$  为无穷大, 则  $\frac{1}{f(x)}$  为无穷小;

若  $f(x)$  为无穷小, 且  $f(x) \neq 0$ , 则  $\frac{1}{f(x)}$  为无穷大.

证明: 设  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$

$\forall \varepsilon > 0, M = \frac{1}{\varepsilon}, \exists \delta > 0$ , 当  $0 < |x - x_0| < \delta$  时的  $x$ , 有  $|f(x)| > M$

$\left| \frac{1}{f(x)} \right| < \frac{1}{M} = \varepsilon$  所以  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{f(x)} = 0$

据此, 关于无穷大的问题都可转化为无穷小来讨论

设  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$   $\forall M > 0, \varepsilon = \frac{1}{M}, \exists \delta > 0$ ,

当  $0 < |x - x_0| < \delta$  时的  $x$ , 有  $|f(x)| < \varepsilon$ ,  $\left| \frac{1}{f(x)} \right| > \frac{1}{\varepsilon} = M$ ,  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{f(x)} = \infty$