


## 第十二章 无穷级数



## 第一节

## 常数项级数的概念和性质



## 内容

## 一基本概念

## 二 级数收敛的必要条件和基本性质

## 三常用典型级数

几何级数 调和级数

## 一、基本概念

### 级数

由数列  $u_1, u_2, u_3, \dots, u_n, \dots$  构成的表达式

$$u_1 + u_2 + u_3 + \dots + u_n + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} u_n$$

称为(常数项)无穷级数, 简称(常数项)级数

### 部分和

前  $n$  项和  $S_n = \sum_{i=1}^n u_i$  称为级数的部分和

### 级数收敛

若  $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$  存在, 称级数  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  收敛

### 和

若  $S = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ , 称  $S$  为级数的和, 此时  $S = \sum_{n=1}^{\infty} u_n$

### 级数发散

若  $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$  不存在(或  $\infty$ ) 称级数发散 如  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n$

## 常用典型级数 等比级数 (又称几何级数)

$$\sum_{n=0}^{\infty} a q^n = a + a q + a q^2 + \cdots + a q^n + \cdots \begin{cases} \text{收敛} & |q| < 1 \\ \text{发散} & |q| \geq 1 \end{cases}$$

解:  $S_n = a + a q + a q^2 + \cdots + a q^{n-1} = a \frac{1 - q^n}{1 - q}$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{当 } |q| < 1 \text{ 时, } \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{a}{1 - q}, \text{ 级数收敛, 其和为 } \frac{a}{1 - q}; \\ \text{当 } |q| > 1 \text{ 时, } \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \infty, \text{ 因此级数发散;} \\ \text{当 } q = 1 \text{ 时, } S_n = n a \rightarrow \infty, \text{ 因此级数发散.} \\ \text{当 } q = -1 \text{ 时, 级数成为 } a - a + a - a + \cdots + (-1)^{n-1} a + \cdots \end{array} \right.$$

从而  $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$  不存在, 因此级数发散.

判定级数  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  是否收敛 (用定义)

计算部分和  $S_n = \sum_{i=1}^n u_i$

判定  $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$  是否存在

例1. 判别下列级数的敛散性:

(1)  $\sum_{n=1}^{\infty} \ln \frac{n+1}{n}$ ;

(2)  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$ .

解: (1)  $S_n = \ln \frac{2}{1} + \ln \frac{3}{2} + \ln \frac{4}{3} + \cdots + \ln \frac{n+1}{n}$

$= (\cancel{\ln 2} - \ln 1) + (\cancel{\ln 3} - \cancel{\ln 2}) + \cdots + (\ln(n+1) - \cancel{\ln n})$

$= \ln(n+1) \rightarrow \infty \quad (n \rightarrow \infty)$

所以级数 (1) 发散;

技巧  
“裂项法”

**例1.** 判别下列级数的敛散性:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \ln \frac{n+1}{n};$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}.$$

$$\begin{aligned} (2) \quad S_n &= \frac{1}{\underline{1 \cdot 2}} + \frac{1}{\underline{2 \cdot 3}} + \frac{1}{\underline{3 \cdot 4}} + \cdots + \frac{1}{\underline{n \cdot (n+1)}} \\ &= \left( 1 - \cancel{\frac{1}{2}} \right) + \left( \cancel{\frac{1}{2}} - \cancel{\frac{1}{3}} \right) + \left( \cancel{\frac{1}{3}} - \cancel{\frac{1}{4}} \right) + \cdots + \left( \cancel{\frac{1}{n}} - \frac{1}{n+1} \right) \\ &= 1 - \frac{1}{n+1} \rightarrow 1 \quad (n \rightarrow \infty) \end{aligned}$$

所以级数 (2) 收敛, 其和为 1.

例2. 设数列  $\{na_n\}$  收敛, 且  $\sum_{n=1}^{\infty} n(a_n - a_{n-1})$  收敛,

试证明级数  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$  收敛

证  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$  的部分和为  $S_n = \sum_{k=0}^{n-1} a_k$

级数  $\sum_{n=1}^{\infty} n(a_n - a_{n-1})$  的部分和为

$$\begin{aligned}\sigma_n &= \sum_{k=1}^n k(a_k - a_{k-1}) = a_1 - a_0 + 2(a_2 - a_1) + \cdots + n(a_n - a_{n-1}) \\ &= -a_0 - a_1 - \cdots - a_{n-1} + na_n \\ &= \underline{na_n} - \underline{S_n}\end{aligned}$$

$\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_n$  存在, 由于  $\{na_n\}$  收敛, 即  $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n$  存在

故  $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$  存在, 故级数收敛



## 二、级数收敛的必要条件和基本性质

### ① 级数收敛的必要条件

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n \text{ 收敛} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0 \text{ 其逆不成立}$$

但若  $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n \neq 0$ , 则  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  必发散

**证明:** 设级数  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  的部分和为  $s_n$ , 且  $s_n \rightarrow s (n \rightarrow \infty)$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (s_n - s_{n-1}) = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n - \lim_{n \rightarrow \infty} s_{n-1} = s - s = 0$$

**注:** i)  $u_n \rightarrow 0$  不能说明  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  收敛, 而要求  $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = s$  存在

ii) 判别一个级数收敛与否, 往往第一步考虑通项  $u_n \xrightarrow{?} 0$

iii) 利用  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  收敛, 可以求极限



例.判断级数的敛散性:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{3n-1} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{3n-1} = \frac{1}{3} \neq 0 \quad \text{发散}$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} n}{\ln(n+1)} \quad \frac{(-1)^{n-1} n}{\ln(n+1)} \not\rightarrow 0 (n \rightarrow \infty) \quad \text{发散}$$

$$(3) \frac{1}{2} - \frac{2}{3} + \frac{3}{4} + \cdots + (-1)^n \frac{n}{n+1} + \cdots$$

$$(-1)^n \frac{n}{n+1} \not\rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty) \quad \text{发散}$$

## 常用典型级数

调和级数  $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$  发散

法一 假设调和级数收敛

$$S_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} \quad \text{设 } \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} S_{2n} = S$$

$$\text{则 } \lim_{n \rightarrow \infty} (S_{2n} - S_n) = 0$$

$$\text{但 } S_{2n} - S_n = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n} > \frac{1}{2n} + \frac{1}{2n} + \cdots + \frac{1}{2n} = \frac{n}{2n} = \frac{1}{2}$$

数列  $\{S_{2n} - S_n\}$  每项都大于  $\frac{1}{2}$ , 极限不能为 0

一般项趋于  
0, 但是级数  
是发散的

## 常用典型级数

调和级数  $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \cdots + \frac{1}{n} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$  发散

法二 当  $n \leq x < n+1$  时

$$\int_n^{n+1} \frac{1}{n+1} dx < \int_n^{n+1} \frac{1}{x} dx \leq \int_n^{n+1} \frac{1}{n} dx$$

所以  $\frac{1}{n+1} < \ln \frac{n+1}{n} \leq \frac{1}{n}$

$$S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \geq \sum_{k=1}^n \ln \frac{k+1}{k} = \ln 2 - \ln 1 + \ln 3 - \ln 2 + \cdots + \ln(n+1) - \ln n$$
$$= \ln(n+1) \rightarrow \infty (n \rightarrow \infty)$$

$\therefore \{S_n\}$  无极限, 级数发散

## 二、级数收敛的必要条件和基本性质

② 线性性 若级数  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ ,  $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$  分别收敛于和  $s, \sigma$

则  $\sum_{n=1}^{\infty} (ku_n \pm \lambda v_n)$  也收敛, 且其和为  $ks + \lambda\sigma$ , 其中  $k, \lambda$  为常数

③  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  收敛,  $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$  发散  $\longrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} (u_n \pm v_n)$  发散

收  $\pm$  发 = 发

收  $\pm$  收 = 收

发  $\pm$  发  $\begin{cases} \text{收} & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \mp \frac{1}{n} \\ \text{发} & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \end{cases}$

## 二、级数收敛的必要条件和基本性质

④有限项性 在级数中改变(加上,去掉或改变)有限项不影响级数收敛性,但和可能改变

例  $1+2+\cdots+9^{9^9} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{2^n} + \cdots$  收敛

证  ~~$u_1 + u_2 + \cdots + u_k$~~   $+ u_{k+1} + \cdots + u_{k+n} + \cdots$  前 $n$ 项和用 $S_n$

将前 $k$ 项去掉得新级数  $u_{k+1} + \cdots + u_{k+n} + \cdots$  前 $n$ 项和用 $\sigma_n$

$$\sigma_n = u_{k+1} + \cdots + u_{k+n} = S_{k+n} - S_k \quad S_k \text{ 是常数}$$

$\sigma_n$  与  $S_{k+n}$  或者同时具有极限或者同时没有极限

⑤加括号性 收敛级数任意加括号后所成的级数仍收敛于原级数的和, 但加括号后所成的级数收敛, 去括号后原来的级数未必收敛

证: 设级数  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  的部分和为  $S_n$

$(1-1)+(1-1)+\cdots$  收敛  
 $1-1+1-1+\cdots$  发散

任意加括号得新级数

$$(u_1 + \cdots + u_{n_1}) + (u_{n_1+1} + \cdots + u_{n_2}) + \cdots + (u_{n_{k-1}+1} + \cdots + u_{n_k}) + \cdots + \cdots$$

新级数的部分和为  $A_k$

$$A_1 = u_1 + \cdots + u_{n_1} = S_{n_1} \quad A_2 = (u_1 + \cdots + u_{n_1}) + (u_{n_1+1} + \cdots + u_{n_2}) = S_{n_2}$$

$$A_k = (u_1 + \cdots + u_{n_1}) + (u_{n_1+1} + \cdots + u_{n_2}) + \cdots + (u_{n_{k-1}+1} + \cdots + u_{n_k}) = S_{n_k}$$

$\{A_k\}$  是  $\{S_n\}$  的一个子数列, 由  $\{S_n\}$  的收敛, 以及收敛数列与

子数列的关系可知,  $\{A_k\}$  收敛, 且  $\lim_{k \rightarrow \infty} A_k = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n$

**推论:** 若加括号后的级数发散, 则原级数必发散

**例.** 判断级数的敛散性

用反证法可证

$$\frac{1}{\sqrt{2}-1} - \frac{1}{\sqrt{2}+1} + \frac{1}{\sqrt{3}-1} - \frac{1}{\sqrt{3}+1} + \frac{1}{\sqrt{4}-1} - \frac{1}{\sqrt{4}+1} + \cdots$$

**解:** 考虑加括号后的级数

$$\left(\frac{1}{\sqrt{2}-1} - \frac{1}{\sqrt{2}+1}\right) + \left(\frac{1}{\sqrt{3}-1} - \frac{1}{\sqrt{3}+1}\right) + \left(\frac{1}{\sqrt{4}-1} - \frac{1}{\sqrt{4}+1}\right) + \cdots$$

$$a_n = \frac{1}{\sqrt{n}-1} - \frac{1}{\sqrt{n}+1} = \frac{2}{n-1}$$

$$\therefore \sum_{n=2}^{\infty} a_n = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \text{ 发散, 从而原级数发散}$$