

# 第四章

## 不定积分

- § 1 微分与不定积分的概念与性质
  - § 2 换元积分法, 积分法:  $(?)' = f(x)$
  - § 3 分部积分法
  - § 4 有理函数的积分
- } 互逆运算

## 第一节

## 不定积分的概念与性质



## 内容

- 一、原函数与不定积分的概念
- 二、基本积分表
- 三、基本积分法

# 一、原函数与不定积分的概念

**1 原函数** 若 $F(x)$ 与 $f(x)$ 在区间 $I$ 内,  $\forall x \in I$   
 $F'(x) = f(x)$  或  $dF(x) = f(x)dx$ ,  
称 $F(x)$ 是 $f(x)$ 在 $I$ 内的一个**原函数**.

**性质:**①连续函数一定有原函数. (原函数存在定理, 下章证)

i)原函数不唯一

若 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的原函数, 则 $F(x) + C$ 也是 $f(x)$ 的原函数

ii)若 $F'(x) = f(x) = \Phi'(x)$ , 则 $\Phi(x) = F(x) + C$

iii)初等函数在定义区间内任何区间上有原函数

**但原函数未必是初等函数**

# 一、原函数与不定积分的概念

**1 原函数** 若 $F(x)$ 与 $f(x)$ 在区间 $I$ 内,  $\forall x \in I$   
 $F'(x) = f(x)$  或  $dF(x) = f(x)dx$ ,  
称 $F(x)$ 是 $f(x)$ 在 $I$ 内的一个**原函数**.

**性质:**①连续函数一定有原函数. (原函数存在定理, 下章证)

②  $f(x)$ 为偶函数  $\xLeftrightarrow{F(0)=0}$   $F(x)$ 为奇函数 例 $f(x) = x^2, F(x) = \frac{1}{3}x^3 + c$

③  $f(x)$ 为奇函数  $\xRightarrow{\quad} F(x)$ 为偶函数 例 $f(x) = x^3, F(x) = \frac{1}{4}x^4 + c$

④  $F(x)$ 以 $T$ 为周期  $\Longrightarrow f(x)$ 以 $T$ 为周期 (下章)

## 2 不定积分的概念与性质

**定义** 在区间 $I$ 内,函数 $f(x)$ 的带有任意常数项的原函数称为 $f(x)$ 在区间 $I$ 内的**不定积分**,记作 $\int f(x)dx$ .

若  $F(x)$ 是  $f(x)$ 在区间  $I$  上的原函数, 则

$$\int f(x)dx = F(x) + C. \quad (C \text{ 为任意常数})$$

积分号      被积函数      积分变量      被积表达式

i) 称为积分常数**不可丢**!  
ii)  $C$ 可换成 $\ln C$   
但不能 $\sin C, e^C$ 等

若  $f(x)$ 在  $I$  内原函数存在,则称 $f(x)$ 在 $I$ 内**可积**,今后总认为被积函数是可积的

## 2 不定积分的概念与性质

性质 ①  $\frac{d}{dx} \int f(x) dx = f(x) = [\int f(x) dx]'$       例  $(\int [f(x) + c] dx)' = f(x) + c$

或  $d(\int f(x) dx) = f(x) dx$

②  $\int f'(x) dx = f(x) + C = \int df(x)$

例 如果  $\int df(x) = \int dg(x)$  则下列结论中不正确的是 (A)

(A)  $f(x) = g(x)$

(B)  $f'(x) = g'(x)$

(C)  $df(x) = dg(x)$

(D)  $d \int f'(x) dx = d \int g'(x) dx$

## 2 不定积分的概念与性质

性质 ①  $\frac{d}{dx} \int f(x) dx = f(x) = [\int f(x) dx]'$       例  $(\int [f(x) + c] dx)'$   
或  $d(\int f(x) dx) = f(x) dx$        $= f(x) + c$

②  $\int f'(x) dx = f(x) + C = \int df(x)$

③  $\int k f(x) dx = k \int f(x) dx \quad (k \neq 0)$

④  $\int [f(x) \pm g(x)] dx = \int f(x) dx \pm \int g(x) dx$

推广  $\int [k_1 f_1(x) \pm k_2 f_2(x) \pm \cdots \pm k_n f_n(x)] dx$   
 $= k_1 \int f_1(x) dx \pm k_2 \int f_2(x) dx \pm \cdots \pm k_n \int f_n(x) dx.$

称为分项积分.

## 二、基本积分表

$$\textcircled{1} \int k dx = kx + C$$

$$\textcircled{2} \int x^{\mu} dx = \frac{x^{\mu+1}}{\mu+1} + C \quad (\mu \neq -1) \quad \left\{ \begin{array}{l} \int \frac{1}{x^2} dx = -\frac{1}{x} + C \\ \int \frac{1}{\sqrt{x}} dx = 2\sqrt{x} + C \end{array} \right.$$

$$\textcircled{3} \int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C$$

**解** 当  $x > 0$  时  $(\ln x)' = \frac{1}{x} \quad \therefore \ln x$  是  $\frac{1}{x}$  在  $(0, +\infty)$  内的一个原函数

$$\text{在 } (0, +\infty) \text{ 内 } \int \frac{1}{x} dx = \ln x + C$$

$$\text{当 } x < 0 \quad [\ln(-x)]' = \frac{1}{-x}(-1) = \frac{1}{x}$$

$\therefore \ln(-x)$  是  $\frac{1}{x}$  在  $(-\infty, 0)$  内的一个原函数

$$\text{在 } (-\infty, 0) \text{ 内 } \int \frac{1}{x} dx = \ln(-x) + C$$

把  $x > 0$  及  $x < 0$  内结果合起来, 即得



## 二、基本积分表

$$\textcircled{1} \int k dx = kx + C$$

$$\textcircled{2} \int x^{\mu} dx = \frac{x^{\mu+1}}{\mu+1} + C \quad (\mu \neq -1) \quad \left\{ \begin{array}{l} \int \frac{1}{x^2} dx = -\frac{1}{x} + C \\ \int \frac{1}{\sqrt{x}} dx = 2\sqrt{x} + C \end{array} \right.$$

$$\textcircled{3} \int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C$$

$$\textcircled{4} \int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C \quad \int e^x dx = e^x + C$$

$$\textcircled{5} \int \cos x dx = \sin x + C \quad \int \sin x dx = -\cos x + C$$

$$\textcircled{6} \int \sec^2 x dx = \tan x + C \quad \int \csc^2 x dx = -\cot x + C$$

$$\textcircled{7} \int \sec x \tan x dx = \sec x + C \quad \int \csc x \cot x dx = -\csc x + C$$

$$\textcircled{8} \int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \arcsin x + C \quad \int \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan x + C$$

### 三、基本积分法

**分项积分法（直接法）**：计算积分时，常常需要对被积函数作适当的恒等变形（**变量代换**, **三角公式**, **代数公式**）使之成为积分表中函数的线性组合形式

**例1.** 求  $\int \frac{2xe^x + \sqrt{x}\sqrt{x}\sqrt{x} + 1}{x} dx$

**解：**原式  $= 2\int e^x dx + \int x^{-\frac{1}{8}} dx + \int \frac{1}{x} dx$   
 $= 2e^x + \frac{8}{7}x^{\frac{7}{8}} + \ln|x| + C$

求代数和的不定积分时，只需在最后写出一个积分常数  $C$  即可.

**例2.** 求  $\int 2^x \cdot e^{-x} dx$

**解：**原式  $= \int \left(\frac{2}{e}\right)^x dx = \frac{1}{\ln 2 - 1} \left(\frac{2}{e}\right)^x + C$

例3. 求  $\int \frac{x^4}{1+x^2} dx$

解: 原式  $= \int \frac{(x^4 - 1) + 1}{1 + x^2} dx = \int (x^2 - 1) dx + \int \frac{dx}{1 + x^2}$

$$= \frac{1}{3}x^3 - x + \arctan x + C$$

例4. 求  $\int \frac{dx}{x^4(1+x^2)}$

解: 原式  $= \int \frac{1+x^2-x^2}{x^4(1+x^2)} dx = \int \frac{1}{x^4} dx - \int \frac{1}{x^2(1+x^2)} dx$

$$= \int \frac{1}{x^4} dx - \int \left( \frac{1}{x^2} - \frac{1}{1+x^2} \right) dx = -\frac{1}{3}x^{-3} + \frac{1}{x} + \arctan x + C$$

**例5.** 求  $\int \frac{dx}{\sin^2 x \cos^2 x}$

**解:** 原式  $= \int \frac{\sin^2 x + \cos^2 x}{\sin^2 x \cos^2 x} dx = \int \left( \frac{1}{\cos^2 x} + \frac{1}{\sin^2 x} \right) dx$   
 $= \tan x - \cot x + C$

---

**例6.** 求  $\int \frac{dx}{1 + \sin x}$

**解:** 原式  $= \int \frac{1 - \sin x}{\cos^2 x} dx = \int \left( \frac{1}{\cos^2 x} - \frac{\sin x}{\cos^2 x} \right) dx$   
 $= \tan x - \sec x + C$

$$\begin{aligned}\cos 2x &= \cos^2 x - \sin^2 x \\ &= 1 - 2\sin^2 x \\ &= 2\cos^2 x - 1\end{aligned}$$

**例7.** 求  $\int \frac{1 - \cos x}{1 - \cos 2x} dx$

**解:** 原式  $= \int \frac{1 - \cos x}{2\sin^2 x} dx = \frac{1}{2} \int \left( \frac{1}{\sin^2 x} - \frac{\cos x}{\sin^2 x} \right) dx$

$$= \frac{1}{2} (-\cot x + \csc x) + C$$

**例8.** 求  $\int \cos^2 \frac{x}{2} dx$

**解:** 原式  $= \int \frac{1 + \cos x}{2} dx = \int \left( \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos x \right) dx$

$$= \frac{1}{2} x + \frac{1}{2} \sin x + C$$

**例9.** 求  $\int \left( \tan^2 x + \frac{4\sin^3 x - 1}{\sin^2 x} \right) dx$

**解:** 原式  $= \int (\sec^2 x - 1 + 4\sin x - \frac{1}{\sin^2 x}) dx$   
 $= \tan x - x - 4\cos x + \cot x + C$

**例10.** 若 $f(x)$ 的导函数是 $\sin x$ ,则 $f(x)$ 的一个原函数为( **B** )

(A)  $1 + \sin x$

(B)  $1 - \sin x$

(C)  $1 + \cos x$

(D)  $1 - \cos x$

**解:**  $f'(x) = \sin x \quad f(x) = \int \sin x dx = -\cos x + C_1$

$$\int f(x) dx = \int -\cos x + C_1 dx = -\sin x + C_1 x + C_2$$

取  $C_1 = 0, C_2 = 1$