

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по Луганской Народной Республике» (ФГБУ «УГМС по ЛНР»)



БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ ЗА ФЕВРАЛЬ 2024 ГОДА

СОДЕРЖАНИЕ

1. СОСТОЯНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

- 1.1. Сеть наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха
- 1.2. Загрязнение атмосферного воздуха на территории Республики
- 1.3. Атмосферные осадки
- 1.4. Прогнозирование неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) для рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе Республики

2. СОСТОЯНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД СУШИ

- 2.1. Сеть наблюдений за загрязнением поверхностных вод суши
- 2.2. Качество поверхностных вод суши
- 3. РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА
- 3.1. Сеть наблюдений за радиоактивным загрязнением
- 3.2. Радиационная обстановка на территории Республики
- 4. ПОКАЗАТЕЛИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

1. СОСТОЯНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

1.1. Сеть наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха

Мониторинг загрязнения атмосферного воздуха на территории деятельности ФГБУ «УГМС по ЛНР» осуществляется в двух городах на семи пунктах наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха (далее – ПНЗ): г. Луганск – 4 ПНЗ; г. Алчевск – 3 ПНЗ.

ПНЗ расположены в жилых районах, вблизи автомагистралей и крупных промышленных объектов. Режим наблюдений 6-дневный, отбор проб воздуха в срок 07 и 13 часов – ручной, в 01 и 19 часов – автоматический.

Программой работ Государственной сети наблюдений предусматривается определение 12 загрязняющих веществ (таблица 1).

Таблица 1 Перечень загрязняющих веществ, за которыми осуществляется контроль загрязнения атмосферного воздуха

Наименование			
Взвешенные вещества	Оксид углерода	Фторид водорода	
Диоксид серы	Аммиак	Сероводород	
Диоксид азота	Пыль каменного угля	Фенол	
Оксид азота	Формальдегид	Бенз(а)пирен	

1.2. Загрязнение атмосферного воздуха на территории Республики

В феврале в Луганске отмечалась *повышенная степень* загрязнения атмосферного воздуха (СИ -1.5; НП -0.5%).

Содержание диоксида серы, диоксида азота, оксида азота, фтористого водорода, формальдегида, пыли каменного угля, бенз(а)пирена в целом по городу было ниже санитарно-гигиенических норм.



Средняя за месяц концентрация формальдегида составила 1,98 ПДК $_{\rm c.c.}$, взвешенных веществ — 1,08 ПДК $_{\rm c.c.}$, среднее содержание других определяемых примесей было ниже ПДК.

По сравнению с январем в феврале степень загрязнения атмосферного воздуха изменилась от низкой до повышенной, за счет увеличения концентрации оксида углерода. Концентрации других определяемых загрязняющих веществ существенно не изменились.

В Алчевске отмечалась *повышенная степень* загрязнения атмосферного воздуха $(CИ-1,6; H\Pi-4,2\%)$.

Содержание взвешенных веществ, диоксида серы, диоксида азота, оксида азота, сероводорода, фенола, формальдегида и аммиака в целом по Алчевску было ниже санитарно-гигиенических норм.

Средняя за месяц концентрация диоксида серы составила 1,04 ПДК $_{\rm c.c.}$, формальдегида — 1,35 ПДК $_{\rm c.c.}$, среднее содержание других определяемых примесей было ниже ПДК.

По сравнению с январем в феврале степень загрязнения атмосферного воздуха изменилась от низкой до повышенной, за счет увеличения концентрации оксида углерода. Концентрации других определяемых загрязняющих веществ существенно не изменились.

При выполнении программы наблюдений случаев высокого и экстремально высокого загрязнения на территории Республики не зафиксировано.

1.3. Атмосферные осадки

В Луганске реакция среды (рН) в атмосферных осадках в среднем – нейтральная, колебалась в диапазоне от 6,24 до 6,81 ед. рН.

1.4. Прогнозирование неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) для рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе Республики

По Республике 13 и 22 февраля отмечались метеорологические условия, способствующие кратковременному (в ночные часы) накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха — продолжительное отсутствие осадков, поля повышенного давления (антициклон), слабые ветра переменных направлений, а также наличие инверсий. При данном комплексе метеорологических условий отдельные источники выбросов загрязняющих веществ могли создавать высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха.

2. СОСТОЯНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД СУШИ

2.1. Сеть наблюдений за загрязнением поверхностных вод суши

Государственная сеть наблюдений за загрязнением поверхностных вод суши на территории Республики включает в себя наблюдения в двух пунктах наблюдений

(трех створах) бассейна р. Северский Донец Азовского гидрографического района на водотоках (р. Лугань I створ, 0,5 км выше г. Луганск; р. Лугань II створ, 1 км ниже г. Луганск; р. Северский Донец, с. Кружиловка) по результатам наблюдений за концентрациями 16 гидрохимических показателей (таблица 2).

Отбор проб воды производится в течение года (в основные фазы гидрологического периода) согласно РД



52.24.309-2016 «Организация и проведение режимных наблюдений за загрязнением поверхностных вод суши на сети Росгидромета» с учетом морфометрии русел рек, поступления сточных вод и их перемешивания с речной водой.

Перечень определяемых показателей физико-химического состава поверхностных вод суши

Наименование		
Температура	Диоксид углерода	
Цветность	Хлориды	
Прозрачность	Сульфаты	
Запах	Кальция ионы	
Взвешенные вещества	Магния ионы	
рН	Жесткость	
Растворенный кислород	Азот нитритный	
Процент насыщения кислородом	$БПК_5$	

2.2. Качество поверхностных вод суши

В феврале на реках Республики наблюдались колебания уровня воды от -35 см до +65 см за сутки.

В течение месяца ледовые явления носили кратковременный характер. Весеннее половодье на реках Республики началось в конце второй-начале третьей декады февраля.

Средняя месячная температура воды в реках Республики колебалась в пределах от 0,2 до 1,7°C.

3. РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА

3.1. Сеть наблюдений за радиоактивным загрязнением

На территории Республики проводится мониторинг радиационной обстановки, который включает в себя ежедневные измерения мощности экспозиционной дозы (МЭД) на 6 стационарных метеорологических постах в населенных пунктах: г. Луганск, г. Сватово, с. Дарьевка, пгт Беловодск, пгт Новопсков, пгт Троицкое.

Измерение МЭД на всех станциях производится согласно РД 52.18.826 – 2015 «Наставление гидрометеорологическим станциям и постам» в 09 часов утра.

3.2. Радиационная обстановка на территории Республики

Радиационный фон по Республике составил 0,14-0,15 мк3в/ч, в столице – 0,14 мк3в/ч, что не превышает естественного для Республики гамма-фона.

4. ПОКАЗАТЕЛИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Показатели качества атмосферного воздуха

Оценка степени загрязнения атмосферного воздуха проводится с учетом санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Для оценки степени загрязнения атмосферного воздуха за месяц используются два показателя качества воздуха:

- ightharpoonup *стандартный индекс СИ* наибольшая, измеренная за короткий период времени, концентрация примеси, деленная на ПДК_{м.р.};

Степень загрязнения атмосферного воздуха оценивается по 4 категориям значения СИ и $H\Pi$:

- \blacktriangleright низкая при СИ = 0-1, НП = 0 %;
- ▶ повышенная при СИ = 2-4, НП = 1-19 %;
- ▶ высокая при СИ = 5-10; НП = 20-49 %;
- \triangleright очень высокая при СИ > 10; НП ≥ 50 %.

Степень загрязнения атмосферного воздуха оценивается при сравнении концентраций примесей (в мг/м^3 , мкг/м^3) с ПДК загрязняющего вещества в атмосферном воздухе (предельно допустимая концентрация).

 $\Pi \mathcal{I} K_{c.c.}$ — предельно допустимая среднесуточная концентрация загрязняющего вещества в воздухе населенных мест, мг/м³.

Показатели качества поверхностных вод суши

Оценка уровня загрязнения поверхностных вод суши производится сравнением концентраций показателей качества воды (в мг/л) с ПДК согласно «Перечню рыбохозяйственных нормативов: ПДК и ОБУВ вредных веществ для воды водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение».

Предельно допустимая концентрация (ПДК) веществ в воде – концентрация вещества в воде, выше которой вода непригодна для одного или нескольких видов пользования (ГОСТ 27065-86).

Показатели радиоактивного загрязнения окружающей среды

Радиационная обстановка характеризуется следующими предельными величинами.

Мощность амбиентного эквивалента дозы (МАЭД) не должна превышать:

 $B3_{\text{MAЭД}}^* = MAЭД$ фоновое среднемесячное значение прошлого месяца, мк $3_{\text{B}}/_{\text{Y}} + 0.11$

Высокое загрязнение (ВЗ) при определении суммарной (природной и искусственной) радиоактивности аэрозолей выпадающих на поверхность земли и аэрозолей, содержащихся в приземном слое атмосферы, устанавливается каждый месяц для каждой метеостанции как:

 ${\rm B3_{выпадений}}=\Phi$ оновые среднемесячные выпадения прошлого месяца, ${\rm Б\kappa/m^2}$ в сутки \times 10.

 $B3_{\text{аэрозолей}} = \Phi$ оновая среднемесячная объемная активность прошлого месяца, $\times~10^{-5} \text{Бк/m}^3 \times 5$

Экстремально высоким загрязнением (ЭВЗ) считается:

 $9B3_{MAЭД} = MAЭД_{\phi o H} + 0,6 мкЗв/ч.$ $9B3_{выпадений} = 110 \ Бк/м^2 в \ сутки (по данным первого измерения)$ $9B3_{аэрозолей} = 3700 \times 10^{-5} \ Бк/м^3$ (по данным первого измерения)

Издатель: ФГБУ «УГМС по ЛНР»

Ответственный исполнитель:

Начальник учреждения И.Н. Баева

Над выпуском работали:

Заместитель начальника учреждения –

начальник ЦМС С.С. Шишова

Заместитель начальника учреждения –

начальник ГМЦ ЛНР С.Н. Шубенок

Заместитель начальника ЦМС – начальник КЛМЗОС

Н.С. Морева

С.И. Плотникова

Заместитель начальника ГМЦ ЛНР – начальник отдела метеорологических прогнозов

Перепечатка любых материалов из Бюллетеня— только со ссылкой на $\Phi \Gamma E Y \ll Y \Gamma M C$ по ЛНР»

^{* -} рассчитывается ежемесячно для каждой станции.