

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по Луганской Народной Республике» (ФГБУ «УГМС по ЛНР»)



БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ ЗА ЯНВАРЬ 2025 ГОДА

СОДЕРЖАНИЕ

1. СОСТОЯНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

- 1.1. Сеть наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха
- 1.2. Загрязнение атмосферного воздуха на территории Республики
- 1.3. Атмосферные осадки
- 1.4. Прогнозирование неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) для рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе Республики

2. СОСТОЯНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД СУШИ

- 2.1. Сеть наблюдений за загрязнением поверхностных вод суши
- 2.2. Качество поверхностных вод суши
- 3. РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА
- 3.1. Сеть наблюдений за радиоактивным загрязнением
- 3.2. Радиационная обстановка на территории Республики
- 4. ПОКАЗАТЕЛИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

1. СОСТОЯНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

1.1. Сеть наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха



Мониторинг загрязнения атмосферного воздуха на территории деятельности ФГБУ «УГМС по ЛНР» осуществляется в двух городах на восьми пунктах наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха (далее – ПНЗ): г. Луганск – 4 ПНЗ; г. Алчевск – 4 ПНЗ.

ПНЗ расположены в жилых районах, вблизи автомагистралей и крупных промышленных объектов. Режим наблюдений 6-дневный, отбор проб воздуха в срок 07 и 13 часов — ручной,

в 01 и 19 часов – автоматический.

Программой работ Государственной сети наблюдений предусматривается определение 11 загрязняющих веществ и 8 тяжелых металлов (таблица 1).

Таблица 1 Перечень загрязняющих веществ, за которыми осуществляется контроль загрязнения атмосферного воздуха

Наименование		
Основные	Специфические	Тяжелые металлы
Взвешенные вещества	Пыль каменного угля	Железо
Диоксид серы	Формальдегид	Кадмий
Диоксид азота	Фторид водорода	Марганец
Оксид азота	Сероводород	Медь
Оксид углерода	Фенол	Никель
	Бенз(а)пирен	Свинец
		Хром
		Цинк

1.2. Загрязнение атмосферного воздуха на территории Республики

В январе в городе Луганск отмечалась *низкая степень* загрязнения атмосферного воздуха (СИ – 1,3; $H\Pi$ – 0,2%).

Содержание взвешенных веществ, диоксида серы, диоксида азота, оксида азота, формальдегида, фтористого водорода, пыли каменного угля и бенз(а)пирена в целом по городу были ниже санитарно-гигиенических норм.

Средняя за месяц концентрация формальдегида составила 2,14 ПДК_{с.с.}, взвешенных веществ 1,18 ПДК_{с.с.}, среднее содержание других определяемых загрязняющих веществ было ниже установленных ПДК.

По сравнению с декабрем в январе степень загрязнения атмосферного воздуха сохранилась низкой, концентрации определяемых загрязняющих веществ существенно не изменились.



По сравнению с январем 2024 года в январе текущего года степень загрязнения сохранилась низкой, концентрации определяемых загрязняющих веществ существенно не изменились.

В январе в городе Алчевск отмечалась *повышенная степень* загрязнения атмосферного воздуха (СИ – 1,6; НП – 1,4%).

Повышенная степень загрязнения атмосферного воздуха определялась содержанием оксида углерода (СИ - 1,6; НП - 1,4%). Содержание взвешенных веществ, диоксида серы, диоксида азота, оксида азота, сероводорода, формальдегида, фенола и бенз(а)пирена в целом по городу было ниже санитарногигиенических норм.

Средняя за месяц концентрация формальдегида составила 1,28 ПДК $_{\rm c.c.}$, среднее содержание других определяемых загрязняющих веществ было ниже установленных ПДК.



В сравнении с декабрем в январе загрязнения атмосферного степень повышенной, сохранилась воздуха концентраций отмечалось снижение оксида углерода. Концентрации загрязняющих других определяемых веществ существенно не изменились.

По сравнению с январем 2024 года в январе текущего года степень загрязнения изменилась от низкой до повышенной, отмечался

рост концентраций оксида углерода. Концентрации других определяемых загрязняющих веществ существенно не изменились.

При выполнении программы наблюдений случаев высокого и экстремально высокого загрязнения на территории Республики не зафиксировано.

1.3. Атмосферные осадки

В Луганске реакция среды (рН) в атмосферных осадках в среднем – нейтральная, колебалась в диапазоне от 6,21 до 6,50 ед. рН.

1.4. Прогнозирование неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) для рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе Республики

По Республике 01, 08, 09, 10, 17, 21, 22 и в период с 27 по 31 января отмечались метеорологические условия, способствующие кратковременному (в ночные часы) накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха — поля повышенного давления (антициклон), слабые ветра переменных направлений, а также наличие инверсий.

При данном комплексе метеорологических условий отдельные источники выбросов загрязняющих веществ могли создавать высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха.

2. СОСТОЯНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД СУШИ

2.1. Сеть наблюдений за загрязнением поверхностных вод суши

Государственная сеть наблюдений за загрязнением поверхностных вод суши на территории Республики включает в наблюдения себя В трех пунктах наблюдений (четырех створах) бассейна Северский Донец Азовского гидрографического района на водотоках (р. Лугань I створ, 0,5 выше г. Луганск; р. Лугань II створ, ниже г. Луганск; р. Лугань. с. Веселенькое; р. Северский Донец, с.



Кружиловка) по результатам наблюдений за концентрациями 16 гидрохимических показателей (таблица 2).

Отбор проб воды производится в течение года (в основные фазы водного режима) согласно РД 52.24.309-2016 «Организация и проведение режимных наблюдений за загрязнением поверхностных вод суши на сети Росгидромета» с учетом морфометрии русел рек, поступления сточных вод и их перемешивания с речной водой.

Таблица 2 Перечень определяемых показателей физико-химического состава поверхностных вол сущи

Наименование		
Температура	Диоксид углерода	
Цветность	Хлориды	
Прозрачность	Сульфаты	
Запах	Кальция ионы	
Взвешенные вещества	Магния ионы	
рН	Жесткость	
Растворенный кислород	Азот нитритный	
Процент насыщения кислородом	БПК ₅	

2.2. Качество поверхностных вод суши



На реках Республики в январе сохранялась стабильная гидрологическая обстановка с меженными значениями уровней воды. В течение месяца на реке Северский Донец наблюдались колебания уровней воды от -8 см до +8 см за сутки.

Текущие уровни воды в реке Лугань находились в пределах нормы (83-101%), в реке Северский Донец — ниже нормы (72%). С 09 по 12 января зафиксирована минимальная отметка наблюдений за уровнем воды в зимний период на р. Лугань (фактический уровень составил 531 см).

Процессы ледообразования на реках Республики в районе гидрологических постов не наблюдались.

Средняя месячная температура воды в реках Республики колебалась в пределах 1,2...3,2°С. Средняя температура воды в январе 2025 года в реках бассейна Северского Донца выше на 0,2...2,2°С, чем в январе 2024 года.

3. РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА

3.1. Сеть наблюдений за радиоактивным загрязнением

На территории Республики проводится мониторинг радиационной обстановки, который включает в себя ежедневные измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МАЭД) на 6 метеорологических станциях: М-І Луганск, М-ІІ Дарьевка, М-ІІ Беловодск, М-ІІ Новопсков, М-ІІ Сватово, М-ІІ Троицкое.

Измерение МАЭД на всех станциях проводится согласно РД 52.18.826 – 2015 «Наставление гидрометеорологическим станциям и постам» в 09 часов утра.

3.2. Радиационная обстановка на территории Республики

Радиационный фон по Республике составил 0.13 - 0.16 мкЗв/ч, в столице -0.13 мкЗв/ч, что не превышает естественного для Республики гамма-фона.

4. ПОКАЗАТЕЛИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Показатели качества атмосферного воздуха

Оценка степени загрязнения атмосферного воздуха проводится с учетом санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Для оценки степени загрязнения атмосферного воздуха за месяц используются два показателя качества воздуха:

- ightharpoonup стандартный индекс СИ наибольшая, измеренная за короткий период времени, концентрация примеси, деленная на ПДК_{м.р.};

Степень загрязнения атмосферного воздуха оценивается по 4 категориям значения СИ и HП:

- ightharpoonup низкая при СИ = 0-1, НП = 0 %;
- ▶ повышенная при СИ = 2-4, НП = 1-19 %;
- \triangleright высокая при СИ = 5-10; НП = 20-49 %;
- \triangleright очень высокая при СИ > 10; НП ≥ 50 %.

Степень загрязнения атмосферного воздуха оценивается при сравнении концентраций примесей (в мг/м^3 , мкг/м^3) с ПДК загрязняющего вещества в атмосферном воздухе (предельно допустимая концентрация).

 $\Pi \mathcal{I} \mathcal{K}$ — концентрация, не оказывающая в течение всей жизни прямого или косвенного неблагоприятного действия на настоящее или будущие поколения, не снижающая работоспособности человека, не ухудшающая его самочувствия и санитарно-бытовых условий жизни. Величины ПДК приведены в мг вещества на 1 м^3 воздуха (мг/м³).

Показатели качества поверхностных вод суши

Оценка уровня загрязнения поверхностных вод суши производится сравнением концентраций показателей качества воды (в мг/л) с ПДК согласно «Перечню рыбохозяйственных нормативов: ПДК и ОБУВ вредных веществ для воды водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение».

Предельно допустимая концентрация (ПДК) веществ в воде – концентрация вещества в воде, выше которой вода непригодна для одного или нескольких видов пользования (ГОСТ 27065-86).

Показатели радиоактивного загрязнения окружающей среды

Радиационная обстановка характеризуется следующими предельными величинами.

Мощность амбиентного эквивалента дозы (МАЭД) не должна превышать:

 $B3_{\text{MA}}=MA$ ЭД фоновое среднемесячное значение прошлого месяца, мк $3_{\text{B}}/_{\text{Y}}+0,11$

Высокое загрязнение (ВЗ) при определении суммарной (природной и искусственной) радиоактивности аэрозолей выпадающих на поверхность земли и

аэрозолей, содержащихся в приземном слое атмосферы, устанавливается каждый месяц для каждой метеостанции как:

 $B3_{\text{выпадений}} = \Phi$ оновые среднемесячные выпадения прошлого месяца, $Бк/м^2$ в сутки \times 10.

 $B3_{\text{аэрозолей}} = \Phi$ оновая среднемесячная объемная активность прошлого месяца, $\times 10^{-5} \text{Бк/m}^3 \times 5$

Экстремально высоким загрязнением (ЭВЗ) считается:

 $ЭВЗ_{MAЭД} = MAЭД_{\phi o H} + 0,6 \text{ мк}3_B/ч.$

 $3B3_{выпадений} = 110 \ \text{Бк/м}^2 \text{в сутки (по данным первого измерения)}$

 ${\rm ЭВ3_{аэрозолей}} = 3700 \times 10^{-5} \ {\rm Бк/m^3} \ ({\rm по} \ {\rm данным} \ {\rm первого} \ {\rm измерения})$

Издатель: ФГБУ «УГМС по ЛНР»

Ответственный исполнитель:

Начальник учреждения

И.Н. Баева

Над выпуском работали:

Заместитель начальника учреждения – начальник ЦМС

С.С. Шишова

Заместитель начальника ЦМС – начальник КЛМЗОС Заместитель начальника ГМЦ ЛНР –

Н.С. Морева

начальник отдела метеорологических прогнозов Начальник отдела гидрологии

С.И. Плотникова Н.В. Рязанова

Перепечатка любых материалов из Бюллетеня — только со ссылкой на $\Phi \Gamma E Y \ll Y \Gamma M C$ по $J H P \gg$

^{* -} рассчитывается ежемесячно для каждой станции.