【藥物編號 01】

● 藥品名稱：脈優錠 5/10 毫克 (Norvasc 5mg / 10mg)

● 常用學名：Amlodipine Besylate

● 慢性病分類：高血壓、冠狀動脈疾病、心絞痛 (鈣離子阻斷劑 CCB)

● 外觀與劑量特徵：

- 5mg 規格：白色八角形（八邊形）錠劑，中央帶有一字深刻痕。



【正面刻字】：AML 5 或 AML-5

【背面刻字】：VLE（原廠標記，早期原廠為 Pfizer 標誌）

- 10mg 規格：白色八角形（八邊形）錠劑，中央帶有一字刻痕。

【正面刻字】：AML 10

【背面刻字】：Pfizer 或代碼標記

● 主要適應症：高血壓、慢性穩定型心絞痛、冠狀動脈疾病。

● 用法用量：每日一次，通常起始劑量 5mg，最高可增至每日 10mg，固定時間服用。

● 重要警語與注意事項：常見下肢水腫、腳踝水腫、頭痛、面部潮紅。服藥期間嚴禁大量食用葡萄柚或飲用葡萄柚汁，以免抑制代謝酵素造成嚴重低血壓。

【藥物編號 02】

● 藥品名稱：易安穩膜衣錠 5/80 毫克、5/160 毫克、10/160 毫克 (Exforge 系列)

● 常用學名：Amlodipine + Valsartan

● 慢性病分類：高血壓 (複方血管擴張劑 CCB + ARB)

● 外觀與劑量特徵：

- 5/80mg 規格：深黃色或橙黃色圓形雙凸膜衣錠，無刻痕。



【正面刻字】：NVR

【背面刻字】：NV

- 5/160mg 規格：深黃色橢圓形膜衣錠。



【正面刻字】：NVR

【背面刻字】：ECE

- 10/160mg 規格：淺黃色橢圓形膜衣錠。

【正面刻字】：NVR

【背面刻字】：UIC

● 主要適應症：單一降血壓藥物無法有效控制之中重度高血壓（非起始治療用藥）。

● 用法用量：每日一次，每次 1 錠，整粒吞服，每日固定時間服用。

● 重要警語與注意事項：孕婦絕對禁用（具致畸胎風險，發現懷孕應立即停藥）。注意姿位性低血壓與血鉀變化，起床或變換姿勢動作宜放緩；禁止與含 aliskiren 藥品併用於糖尿病或重度腎功能不全者。

【藥物編號 03】

● 藥品名稱：康肯膜衣錠 1.25/2.5/5 毫克 (Concor 1.25mg / 2.5mg / 5mg)

● 常用學名：Bisoprolol Fumarate

● 慢性病分類：高血壓、心絞痛、慢性心衰竭 (選擇性乙型受體阻斷劑 Beta-blocker)

● 外觀與劑量特徵：

- 5mg 規格：淡黃色至黃色「心形（愛心形）」錠劑，中央有一字深刻痕。



【刻字】：通常無特殊文字，部分版本兩面皆平滑或帶有微小代碼，獨特的心形外觀為最核心特徵。

- 1.25mg / 2.5mg 規格：白色心形錠劑，帶有中線刻痕。

● 主要適應症：高血壓、心絞痛、穩定型慢性中度至重度心臟衰竭。

● 用法用量：每日早晨一次，每次半顆至一顆 (2.5~5mg)，固定時間服用。

● 重要警語與注意事項：不可擅自驟然停藥，否則恐引發反彈性心悸、心絞痛或血壓飆高；氣喘及重度慢性阻塞性肺病 (COPD) 患者慎用；若靜態心跳過慢（低於每分鐘 50 下）應先停藥回診。

【藥物編號 04】

● 藥品名稱：雅脈膜衣錠 20/40 毫克 (Olmetec 20mg / 40mg)

● 常用學名：Olmesartan Medoxomil

● 慢性病分類：高血壓 (血管張力素受體阻斷劑 ARB)

● 外觀與劑量特徵：

- 40mg 規格：白色橢圓形雙凸膜衣錠。



【正面刻字】: C15

【背面刻字】: 平滑無字

- 20mg 規格：白色圓形雙凸膜衣錠。



【正面刻字】: C14

【背面刻字】: 平滑無字

● 主要適應症：本態性高血壓。

● 用法用量：每日一次，起始劑量為 20mg，若降壓效果不足可調增至 40mg。

● 重要警語與注意事項：孕婦絕對禁用；腎動脈狹窄或腎功能不全患者需定期追蹤血清肌酸酐與血鉀濃度。

【藥物編號 05】

● 藥品名稱：庫魯化錠 500/850/1000 毫克 (Glucophage 500mg / 850mg / 1000mg)

● 常用學名：Metformin HCl

● 慢性病分類：第二型糖尿病 (雙胍類 Biguanide / 第一線首選用藥)

● 外觀與劑量特徵：

- 500mg 規格：白色長橢圓形或圓形錠劑，帶有一字深刻痕。



【刻字】：常刻有「500」數字或藥廠代碼。

- 850mg 規格：白色圓形或長圓形錠劑，表面刻有「850」。



- 1000mg 規格：白色大型長橢圓形錠劑，表面刻有「1000」或中間切痕。



● 主要適應症：第二型糖尿病，特別是伴隨肥胖之患者，可抑制肝臟葡萄糖生成並提升周邊胰島素敏感度。

● 用法用量：每日 2 至 3 次，建議隨餐或餐後立即服用以減少腸胃道副作用。

● 重要警語與注意事項：用藥初期極易出現腹瀉、腹痛、脹氣與噁心感。重度腎功能不全（eGFR < 30 mL/min/1.73m²）或洗腎者禁用；進行靜脈注射含碘顯影劑檢查前需暫停服藥 48 小時以防乳酸中毒。

【藥物編號 06】

● 藥品名稱：佳糖維膜衣錠 25/50/100 毫克 (Januvia 25mg / 50mg / 100mg)

● 常用學名：Sitagliptin Phosphate

● 慢性病分類：第二型糖尿病 (DPP-4 抑制劑)

● 外觀與劑量特徵：

- 100mg 規格：米黃色、淺桃紅或淺橘色圓形雙凸膜衣錠。



【正面刻字】: 277

【背面刻字】: 平滑無字

- 50mg 規格：淡橘色圓形雙凸膜衣錠。

【正面刻字】: 112

【背面刻字】: 平滑無字

- 25mg 規格：粉紅色圓形雙凸膜衣錠。



【正面刻字】: 221

【背面刻字】: 平滑無字

● 主要適應症：第二型糖尿病，藉由抑制 DPP-4 酵素，維持腸泌素活性以促進胰島素分泌並抑制升糖素。

● 用法用量：每日一次，通常劑量為 100mg，可隨餐或空腹服用（腎功能中重度不全者由醫師調降至 25~50mg）。

● 重要警語與注意事項：單獨使用時不易發生低血糖；若出現持續性劇烈腹痛（可能延伸至背部），需立即就醫評估是否為急性胰臟炎。

【藥物編號 07】

● 藥品名稱：得瑪胰／瑪爾胰膜衣錠 1/2/3/4 毫克 (Amaryl 1mg / 2mg / 3mg / 4mg)

● 常用學名：Glimepiride

● 慢性病分類：第二型糖尿病 (第三代磺醯尿素類 Sulfonylurea)

● 外觀與劑量特徵：

- 2mg 規格：綠色長橢圓形錠劑，正反兩面均有一字深刻痕。



【正面刻字】：NMK（或廠牌識別碼）

【背面刻字】：廠牌標記或代碼

- 1mg 規格：粉紅色長橢圓形錠劑，雙面帶刻痕，刻有 NMJ。

- 3mg 規格：黃色長橢圓形錠劑，雙面帶刻痕，刻有 NML。

● 主要適應症：第二型糖尿病，促進胰臟 beta 細胞分泌胰島素。

● 用法用量：每日一次，應於早餐或第一頓主餐前立即服用。

● 重要警語與注意事項：具有明顯的低血糖風險（手抖、冒冷汗、心慌、頭暈、飢餓感），服藥後不可延誤或跳過正餐；嚴重肝腎功能異常者慎用。

【藥物編號 08】

● 藥品名稱：恩排糖／排糖高膜衣錠 10/25/850 毫克 (Jardiance 10mg / 25mg/ 850mg)

● 常用學名：Empagliflozin

● 慢性病分類：第二型糖尿病、心衰竭、慢性腎臟病 (SGLT2 抑制劑 / 排糖藥)

● 外觀與劑量特徵：


- 10mg 規格：淡黃色圓形雙凸膜衣錠。



【正面刻字】: S10

【背面刻字】: 勃林格殷格翰廠牌圖騰

- 25mg 規格：淡黃色橢圓形雙凸膜衣錠。



【正面刻字】: S25

【背面刻字】: 勃林格殷格翰廠牌圖騰

- 850mg 規格：淡粉色橢圓形雙凸膜衣錠。



【正面刻字】: 850

【背面刻字】: 勃林格殷格翰廠牌圖騰 S12

● 主要適應症：第二型糖尿病血糖控制（經由尿液排除糖分）、降低心血管事件死亡風險、治療心臟衰竭及慢性腎臟病。

● 用法用量：每日早晨一次，起始 10mg，視病情調至 25mg，餐前或餐後服用皆可。

● 重要警語與注意事項：服藥期間應維持充足水分補充，避免脫水及姿勢性低血壓；需注意個人私密處衛生，防範生殖泌尿道真菌或細菌感染；罕見情況可能引發正常血糖型酮酸中毒 (euDKA)。

【藥物編號 09】

● 藥品名稱：冠脂妥膜衣錠 5/10/20 毫克 (Crestor 5mg / 10mg / 20mg)

● 常用學名：Rosuvastatin Calcium

● 慢性病分類：高血脂、心血管保護 (Statins 強效降膽固醇)

● 外觀與劑量特徵：

- 10mg 規格：粉紅色圓形雙凸膜衣錠。



【正面刻字】: ZD4522

【背面刻字】: 10（或整面標記 ZD4522 10）

- 5mg 規格：黃色圓形雙凸膜衣錠。



【正面刻字】: ZD4522

【背面刻字】: 5

- 20mg 規格：粉紅色圓形膜衣錠（較大尺寸）。



【正面刻字】: ZD4522

【背面刻字】: 20

● 主要適應症：原發性高膽固醇血症、混合型血脂異常、延緩動脈粥狀硬化進行。

● 用法用量：每日一次，起始 5~10mg，建議每日固定同一時間服用（睡前服用效果佳）。

● 重要警語與注意事項：若發生不明原因的肌肉痠痛、肌肉壓痛、四肢無力，或出現深茶色／可樂色尿液，需高度警惕橫紋肌溶解症，應立即停藥並就醫檢查；亞洲人起始劑量建議由 5mg 開始。

【藥物編號 10】

● 藥品名稱：立普妥膜衣錠 10/20/40/80 毫克 (Lipitor 10mg / 20mg / 40mg / 80mg)

● 常用學名：Atorvastatin Calcium

● 慢性病分類：高血脂、心血管保護 (Statins 長效降膽固醇)

● 外觀與劑量特徵：

- 10mg 規格：白色橢圓形或圓形雙凸膜衣錠。



【正面刻字】：ATV

【背面刻字】：10（或正面刻有 PD156）

- 20mg 規格：白色橢圓形雙凸膜衣錠。



【正面刻字】：ATV

【背面刻字】：20（或正面刻有 PD157）

- 40mg 規格：白色圓形或橢圓形膜衣錠。



【正面刻字】：ATV

【背面刻字】：40（或正面刻有 PD158）

● 主要適應症：降低血中低密度脂蛋白膽固醇 (LDL-C) 及三酸甘油酯，預防心肌梗塞、中風及心血管疾病風險。

● 用法用量：每日一次，每次 10~40mg，整天任何固定時間（白天或睡前）服用皆可。

● 重要警語與注意事項：需定期追蹤肝功能指數 (AST/ALT)；服藥期間避免長期大量飲用葡萄柚汁；若有不明原因肌肉疼痛或無力應儘速回診。

【藥物編號 11】

● 藥品名稱：伯基腸溶微粒膠囊 100 毫克 (Bokey 100mg)

● 常用學名：Aspirin (腸溶微粒 Acetylsalicylic Acid)

● 慢性病分類：抗血栓、心血管中風預防 (抗血小板凝集)

● 外觀與劑量特徵：

- 100mg 規格：長圓柱形硬膠囊，帽蓋為鮮橘色、瓶身為透明（橘色／透明雙色），內部填充白色微粒。



【膠囊印字】：外殼印有黑色字樣「YSP」與「BKCP」。

● 主要適應症：預防心肌梗塞、血栓栓塞症、短暫性缺血性腦發作及缺血性中風再發。

● 用法用量：每日一次，每次 1 粒。屬於腸溶微粒劑型，必須以開水整粒吞服，切勿咬碎、咀嚼或拆開膠囊粉末，以免破壞腸溶保護層造成胃黏膜損傷。

● 重要警語與注意事項：具消化道潰瘍與胃腸道出血風險；安排牙科手術、拔牙或各類外科手術前 5 至 7 天，必須主動告知醫師評估停藥時機；平時注意是否有黑便（瀝青便）、牙齦異常出血或不明皮下瘀血。

【藥物編號 12】

● 藥品名稱：保栓通膜衣錠 75/300 毫克 (Plavix 75mg / 300mg)

● 常用學名：Clopidogrel Bisulfate

● 慢性病分類：抗血栓 (ADP 受體拮抗劑 / 抗血小板)

● 外觀與劑量特徵：

- 75mg 規格：粉紅色圓形雙凸膜衣錠。



【正面刻字】: 75

【背面刻字】: 1171

- 300mg 規格：粉紅色長橢圓形膜衣錠



【正面刻字】: 300

【背面刻字】: 1332

● 主要適應症：心臟冠狀動脈支架置放術後動脈硬化血栓預防、缺血性腦中風或周邊動脈阻塞疾病。

● 用法用量：每日一次，每次 1 錠 (75mg)，餐前或餐後服用皆可。

● 重要警語與注意事項：支架術後患者切勿自行擅自停藥，驟然停藥恐誘發急性支架血栓阻塞造成猝死；若安排拔牙或手術前 5 天需由心臟專科醫師評估停藥；若出現咳血、血尿、異常大量出血需儘速急診。

【藥物編號 13】

● 藥品名稱：福避痛膜衣錠 40/80 毫克 (Feburic 40mg / 80mg)

● 常用學名：Febuxostat

● 慢性病分類：慢性痛風、高尿酸血症 (黃嘌呤氧化酶抑制劑)

● 外觀與劑量特徵：

- 80mg 規格：淡黃色至黃色長橢圓形（膠囊形）雙凸膜衣錠。



【正面刻字】: 80

【背面刻字】: 平滑無字或帶有淺切痕

- 40mg 規格：淡黃色長橢圓形雙凸膜衣錠。

【正面刻字】: 40

【背面刻字】: 平滑無字

● 主要適應症：慢性痛風患者的高尿酸血症。

● 用法用量：每日一次，每次半顆至一顆 (40~80mg)，隨餐或空腹均可。

● 重要警語與注意事項：不可在痛風急性發作期開始服藥（容易加劇並延長急性發作）；初期降尿酸時可能誘發痛風反彈發作，應多飲水並搭配醫師開立之消炎止痛藥。

【藥物編號 14】

● 藥品名稱：昂特欣錠 50/100 微克 (Eltroxin 50mcg / 100mcg)

● 常用學名：Levothyroxine Sodium

● 慢性病分類：甲狀腺機能低下 (甲狀腺素補充療法)

● 外觀與劑量特徵：

- 100mcg (100 微克) 規格：白色至米白色圓形雙凸錠劑，兩面皆有清晰標記。



【正面刻字】: 100

【背面刻字】: GS（上方）與 21C（下方），即 GS 21C（原廠 GSK 代碼）

- 50mcg (50 微克) 規格：白色至米白色圓形雙凸錠劑，兩面皆有清晰標記。



【正面刻字】: 50

【背面刻字】: GS（上方）與 11E（下方），即 GS 11E（原廠 GSK 代碼）

● 主要適應症：甲狀腺機能減退症、黏液性水腫、甲狀腺腫。

● 用法用量：每日早晨一次，必須空腹以白開水整粒吞服（服用後半小時至一小時後方可進食早餐）。

● 重要警語與注意事項：鈣片、鐵劑、制酸劑（胃藥）或豆漿牛奶會嚴重干擾甲狀腺素吸收，必須間隔至少 4 小時以上服用；不可擅自增減劑量以防引發心悸、心律不整、體重驟降或骨質疏鬆。

【藥物編號 15】

● 藥品名稱：活路利淨膜衣錠 0.2/0.4 毫克 (Harnalidge 0.2mg / 0.4mg)

● 常用學名：Tamsulosin HCl

● 慢性病分類：良性攝護腺肥大 (前列腺平滑肌鬆弛劑 / Alpha-1 阻斷劑)

● 外觀與劑量特徵：

- 0.2mg 規格：白色圓形雙凸膜衣錠，刻有 557。



【正面刻字】：557

- 0.4mg 規格：橘色膠囊或持續釋放錠，標有 04。



● 主要適應症：良性攝護腺肥大伴隨的排尿障礙（夜尿、頻尿、排尿無力、餘尿感）。

● 用法用量：每日一次，每次 1 粒 (0.2mg)，固定早餐後或同一餐後以水吞服。

● 重要警語與注意事項：本藥為持續釋放劑型，切勿咬碎、咀嚼或磨粉；初次服藥可能引發姿位性低血壓、頭暈或視野模糊，早晨下床或起立動作應放慢防跌倒；白內障手術前需主動告知眼科醫師。