

常用慢性病藥丸辨識與用藥安全手冊

三高（高血壓、高血糖、高血脂）及心血管疾病常見藥物外觀比對與衛教指引

CHRONIC MEDICATIONS PART 1：常見降血壓藥物

脈優錠 5mg (Norvasc / Amlodipine)

鈣離子阻斷劑 (CCB)

【外觀特徵】：白色、八角形錠劑，中央有一字刻痕。放鬆血管平滑肌。

【刻字標記】：一面刻有「AML 5」字樣，另一面刻「VLE」。

【主要適應症】：高血壓、冠狀動脈疾病、慢性心絞痛。

【用法用量】：每日一次，每次 1 錠 (5mg)，固定時間服用。

【注意事項與警語】：常見下肢/腳踝水腫、頭痛；避免併服葡萄柚汁以防血壓過低。

易安穩膜衣錠 (Exforge 5/80 / Amlodipine + Valsartan)

複方製劑 (CCB + ARB)

【外觀特徵】：淡黃色或淡橙色圓形雙凸膜衣錠，無刻痕。

【刻字標記】：常有特定代碼刻字，一面印「NVR」，另一面印「NV」。

【主要適應症】：單一藥物無法有效控制之中重度高血壓。

【用法用量】：每日一次，每次 1 錠，固定時間服用。

【注意事項與警語】：孕婦禁用；注意姿勢性低血壓與血鉀變化，起床更衣動作宜放緩。

CHRONIC MEDICATIONS PART 2：常見降血糖藥物

庫魯化錠 500mg (Glucophage / Metformin)

雙胍類 (第一線)

【外觀特徵】：白色長橢圓形或圓形錠劑，中間常帶有切痕。

【刻字標記】：多數刻有「500」或廠牌縮寫代碼。

【主要適應症】：第二型糖尿病第一線用藥，減少肝臟葡萄糖生成並提升胰島素敏感性。

【用法用量】：每日 2~3 次，建議隨餐或餐後立即服用以減輕腸胃不適。

【注意事項與警語】：初期易有腹瀉、腹脹；嚴重腎功能不全或洗腎者禁用。

佳糖維膜衣錠 100mg (Januvia / Sitagliptin)

DPP-4 抑制劑

【外觀特徵】：米黃色、淺桃紅或橘色圓形雙凸膜衣錠。

【刻字標記】：一面常見刻字「277」，另一面平滑無字。

【主要適應症】：第二型糖尿病，延長腸泌素作用以刺激胰島素分泌。

【用法用量】：每日一次，每次 100mg，不受進食影響。

【注意事項與警語】：單獨使用時低血糖風險較低；需注意急性胰臟炎症狀（如持續劇烈腹痛）。

CHRONIC MEDICATIONS PART 3：常見降血脂藥物

冠脂妥膜衣錠 10mg (Crestor / Rosuvastatin)

Statins (強效)

【外觀特徵】：粉紅色圓形雙凸膜衣錠。

【刻字標記】：常刻有「ZD4522 10」等標記（一面「ZD4522」，另一面「10」）。

【主要適應症】：原發性高膽固醇血症、降低低密度脂蛋白（LDL-C）效果顯著。

【用法用量】：每日一次，每次 5~10mg，建議夜間睡前固定服用。

【注意事項與警語】：若出現不明原因肌肉痠痛、無力或深色茶色尿液，應儘速就醫評估。

立普妥膜衣錠 20mg (Lipitor / Atorvastatin)

Statins (長效)

【外觀特徵】：白色橢圓形或橢圓凸起膜衣錠。

【刻字標記】：刻有「ATV 20」等標記（或 PD156）。

【主要適應症】：降低低密度脂蛋白（LDL-C）、三酸甘油酯，降低心肌梗塞風險。

【用法用量】：每日一次 10~20mg，整天任何固定時間服用皆可。

【注意事項與警語】：需定期監測肝功能與肌酸激酶（CK），服用期間避免過量食用葡萄柚汁。

CHRONIC MEDICATIONS PART 4：心血管抗血栓藥物

伯基腸溶微粒膠囊 100mg (Bokey / Aspirin)

抗血小板凝集

【外觀特徵】：橘色 / 透明雙色長圓柱膠囊（或白色微粒膠囊），內含白色微粒。

【刻字標記】：印有「YSP」與「BKCP」字樣。

【主要適應症】：抑制血小板 COX-1，用於預防心肌梗塞、血栓栓塞與缺血性腦中風。

【用法用量】：每日一次，每次 1 粒；為腸溶微粒劑型，應整粒吞服不可嚼碎。

【注意事項與警語】：注意胃腸道出血風險；拔牙或手術前 5~7 天須告知醫師評估停藥時機。

保栓通膜衣錠 75mg (Plavix / Clopidogrel)

ADP 受體拮抗劑

【外觀特徵】：粉紅色圓形膜衣錠。

【刻字標記】：一面常刻「75」，另一面刻「1171」。

【主要適應症】：心導管支架置放後動脈硬化血栓預防，或對阿斯匹靈不耐受時使用。

【用法用量】：每日一次，每次 1 錠 (75mg)，餐前餐後皆可。

【注意事項與警語】：不可擅自驟然停藥以免發生急性支架血栓；若出現咳血、血尿須速就醫。

類別	代表藥物與特徵簡稱	服藥時機	不可忽視警訊
降血壓	脈優 (八邊 AML 5)、易安穩 (黃圓 NVR)	晨起固定時段	嚴重眩暈、下肢水腫
降血糖	庫魯化 (白長橢圓 500)、佳糖維 (橘圓 277)	隨餐或固定時間	冷汗手抖、劇烈腹痛
降血脂	冠脂妥 (粉圓 ZD4522)、立普妥 (白橢 ATV 20)	睡前或固定時間	肌肉痠痛、茶色尿
抗血栓	伯基 (橘白膠囊)、保栓通 (粉圓 75/1171)	開水整粒吞服	黑便、異常出血不止