

個別症例安全性報告

報告ID：ICSR-2025-001

報告種別：自発報告

報告日：2025-11-15

報告者：田中医師（東京総合病院）

報告者資格：医師

発生国：日本

MedDRAバージョン：27.0

患者情報

患者イニシャル：K.T.

年齢：65歳

性別：女性

体重：58 kg

人種：アジア人

既往歴・合併症：本態性高血圧（10年前に診断、本事象発現前は良好にコントロールされていた）。既知の薬剤アレルギーなし。

被疑薬

薬剤名：DrugX

有効成分：Compound-X 10 mg

製造販売業者：Pharma Sample Co., Ltd.

剤形：フィルムコーティング錠

用法：1日1回、朝、経口投与

用量：10 mg

投与経路：経口

効能・効果：本態性高血圧

投与開始日：2025-11-01

投与終了日：2025-11-14（有害事象のため投与中止）

薬剤に対する処置：投与中止

併用薬

本事象発現時、報告された併用薬はなし。

有害事象

事象1：頭痛（重度）

発現日：2025-11-04

転帰：軽快

重篤度：非重篤

事象2：浮動性めまい

発現日：2025-11-04

転帰：軽快

重篤度：非重篤

事象3：悪心

発現日：2025-11-05

転帰：軽快

重篤度：非重篤

因果関係評価

報告者による因果関係：可能性あり（Possible）

企業による因果関係：可能性あり（Possible）

WHO-UMC判定：可能性あり（Possible）

症例経過

本態性高血圧の10年の既往を有し、本事象発現前まで良好にコントロールされていた65歳のアジア人女性。かかりつけ医により、2025-11-01よりDrugX 10 mgの1日1回投与が開始された。それまでは生活習慣の改善のみで管理されており、降圧薬による薬物療法の既往はなかった。処方時のベースライン血圧は152/94 mmHgであった。

初回投与から3日後（2025-11-04）、患者は重度の拍動性の前頭部頭痛を発現し、起立時のめまいを伴った。翌日にはさらに、嘔吐を伴わない悪心のエピソードを認めた。患者は直ちに医療機関を受診せず、2025-11-14に処方医へ連絡し、同日DrugXの投与が中止された。対症療法を要することはなかった。本報告時点で、3症状はいずれも投与中止後約3日間かけて徐々に軽快していた。

他の原因は特定されなかった。患者からは、最近の食事内容の変更、新規薬剤の使用、併発疾患のいずれもないとの報告があった。薬剤の投与開始と症状発現との時間的關係は、DrugXとの因果關係が可能性あり（Possible）であることを支持するものである。

追跡調査

完全な回復を確認するため、次回予定受診日である2025-12-01に追跡調査を予定している。