

Mecánica Clásica II

Índice general

1. Mapeos	1
1.1. Definición y ejemplos básicos	1
1.2. Imagen inversa, dominio y rango	2
1.3. Inyectividad, sobreyectividad y biyectividad	3
1.4. Mapeo constante, restricción y composición	3
1.5. Mapeo inclusión e identidad	3
1.6. Mapeo inverso	3
2. Producto Cartesiano	5
2.1. Definición y ejemplos	5
2.2. Cardinalidad del producto cartesiano	6
2.2.1. Casos particulares	6
2.3. Producto cartesiano de conjuntos continuos	7
2.4. Producto cartesiano de conjuntos unidimensionales curvos	7
2.5. Producto cartesiano en dimensiones mayores	8
2.6. Integración y producto cartesiano	8
2.6.1. El caso rectangular $D = I_1 \times I_2$	9
2.6.2. Integrales de una derivada parcial y el borde del rectángulo	10
3. Frontera	11
3.1. Espacios topológicos	11
3.2. Espacios de Hausdorff	12
3.3. Entornos	13
3.4. Un teorema auxiliar: la propiedad de Arquímedes	13
3.5. Puntos de acumulación	14
3.6. Interior de un conjunto	15
3.7. Conjuntos compactos	16
3.8. Clausura de un conjunto	16
3.9. Frontera de un conjunto	16
3.10. La frontera de un rectángulo	17
4. Transformación de Coordenadas	19
4.1. Motivación	19
4.2. Coordinatización del espacio	19
4.3. Transformación de coordenadas	19
4.3.1. El jacobiano de la transformación	20
4.4. Vectores base	20
4.5. Componentes de un vector: tensores contravariantes	21
4.6. Vectores duales y tensores covariantes	22
4.7. La métrica	23
4.7.1. El elemento de línea	24
4.8. Invariantes: producto escalar, magnitud y ángulo	25
4.9. La métrica inversa	26
4.10. Los tres símbolos delta	27

5. Análisis Tensorial	28
5.1. Convención de suma de Einstein	28
5.2. Subir y bajar índices	28
5.3. El producto tensorial	29
5.3.1. Motivación: producto tensorial de matrices columna	29
5.3.2. Producto tensorial de espacios vectoriales genéricos	30
5.3.3. Generalización a tensores de orden $(p, 0)$	30
5.3.4. Generalización a tensores de orden $(0, q)$	31
5.3.5. Generalización a tensores de orden $(1, 1)$ y (p, q)	31
5.4. Subir y bajar índices en tensores generales	32
5.4.1. Los símbolos de Christoffel	32
5.5. Operaciones con tensores	33
5.6. Simetrías	34
5.6.1. El símbolo de Levi-Civita	35
5.7. Producto vectorial	36
5.8. Derivada covariante	37
5.9. El operador rotacional	38
5.10. Notación tensorial	39
5.11. Invariancia de la acción	39


Capítulo 1

Mapeos

1.1. Definición y ejemplos básicos

Definición 1.1.1 (Mapeo). Sean X e Y dos conjuntos. Un **mapeo** f es una regla por la que se asigna un $y \in Y$ a cada valor $x \in X$. El mapeo se escribe

$$f : X \rightarrow Y.$$



Cuando f está definido por alguna fórmula explícita, podemos escribir la correspondencia elemento a elemento como

$$x \mapsto f(x),$$

de modo que el mapeo completo se escribe

$$\begin{aligned} f : X &\longrightarrow Y \\ x &\longmapsto f(x). \end{aligned}$$

Ejemplo 1.1.2. Sean los conjuntos $X = \{a, b, c\}$ e $Y = \{2, 3\}$. Definimos el mapeo

$$f(a) = 2, \quad f(b) = 2, \quad f(c) = 3.$$

En este mapeo no hay una fórmula explícita de la aplicación; además, hay dos elementos de X que corresponden al mismo elemento de Y .

Ejemplo 1.1.3. Sea el mapeo

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto x^2. \end{aligned}$$

Es decir, la función le asocia a cada número real su cuadrado, $f(x) = x^2$.

Ejemplo 1.1.4. Sea el mapeo

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$$


$$(x, y) \mapsto x + 2y.$$

Este mapeo lleva un punto de $\mathbb{R}^2$ a un punto de $\mathbb{R}$, es decir, se mapea de dos dimensiones a una dimensión. Un ejemplo físico de este tipo de mapeo es la temperatura (un número en $\mathbb{R}$) de una lámina delgada (un objeto bidimensional).

1.2. Imagen inversa, dominio y rango

Definición 1.2.1 (Imagen inversa). Un subconjunto de X cuyos elementos se asignan a $y \in Y$ bajo f se denomina **imagen inversa** de y , y se denota por

$$f^{-1}(y) = \{x \in X \mid f(x) = y\}.$$



Ejemplo 1.2.2. Sea el mapeo

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto x^2.$$

La imagen inversa de $y = 1$ es $f^{-1}(1) = \{-1, 1\}$. La imagen inversa de $y = 3$ es $f^{-1}(3) = \{-\sqrt{3}, \sqrt{3}\}$. La imagen inversa de $y = -2$ es $f^{-1}(-2) = \emptyset$.

Ejemplo 1.2.3. Sea el mapeo

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto \sin x.$$

La imagen inversa de $y = 1$ es

$$f^{-1}(1) = \left\{ (4n + 1) \frac{\pi}{2} \mid n \in \mathbb{Z} \right\}.$$

La imagen inversa de $y = -1,5$ es $f^{-1}(-1,5) = \emptyset$.

Definición 1.2.4 (Dominio, rango e imagen). El conjunto X se denomina **dominio** del mapeo, mientras que Y se denomina **rango** del mapeo. Un mapeo no se puede definir sin especificar el dominio y el rango.

La **imagen** del mapeo es

$$f(X) = \{y \in Y \mid y = f(x) \text{ para algún } x \in X\} \subset Y.$$

La imagen $f(X)$ también se denota por $\text{im } f$.

Ejemplo 1.2.5. a) Sea el mapeo $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto f(x) = e^x$. En este ejemplo tanto el dominio como el rango son $\mathbb{R}$. La imagen del mapeo es $\text{im } f = f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}^+ \subset \mathbb{R}$. El valor $f(x) = -1$ no tiene imagen inversa, es decir $f^{-1}(-1) = \emptyset$. Si cambiamos el dominio y el rango de $\mathbb{R}$ al plano complejo $\mathbb{C}$, entonces $f^{-1}(-1) = \{(2n + 1)\pi i \mid n \in \mathbb{Z}\}$.

- b) Sea el mapeo $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto f(x) = \sin(x)$. El dominio y el rango son $\mathbb{R}$. La imagen del mapeo es $f(\mathbb{R}) = [-1, 1]$. La imagen inversa de 0 es $f^{-1}(0) = \{n\pi \mid n \in \mathbb{Z}\}$. Si cambiamos el dominio y el rango a $\mathbb{C}$, entonces $f(\mathbb{C}) = \mathbb{C}$.

1.3. Inyectividad, sobreyectividad y biyectividad

Definición 1.3.1. Si un mapeo satisface alguna condición adicional, entonces recibe un nombre especial:

- a) Un mapeo $f : X \rightarrow Y$ se dice **inyectivo** (o uno a uno) si $x \neq x'$ implica $f(x) \neq f(x')$.
- b) Un mapeo $f : X \rightarrow Y$ se dice **sobreyectivo** (o sobre) si para cada $y \in Y$ existe al menos un elemento $x \in X$ tal que $f(x) = y$.
- c) Un mapeo $f : X \rightarrow Y$ se dice **biyectivo** si es tanto inyectivo como sobreyectivo.

Ejemplo 1.3.2. Un mapeo definido por $f : x \mapsto ax$, con $a \in \mathbb{R} - \{0\}$, es biyectivo. El mapeo definido por $f : x \mapsto x^2$ no es inyectivo ni sobreyectivo. El mapeo dado por $f : x \mapsto e^x$ es inyectivo pero no sobreyectivo.

1.4. Mapeo constante, restricción y composición

Definición 1.4.1. Un **mapeo constante** $c : X \rightarrow Y$ está definido por $c(x) = y_0$, donde y_0 es un elemento fijo de Y y x es un elemento arbitrario de X .

Dado un mapeo $f : X \rightarrow Y$, podemos considerar su **restricción** a $A \subset X$, denotada por

$$f|_A : A \rightarrow Y.$$

Dados dos mapeos $f : X \rightarrow Y$ y $g : Y \rightarrow Z$, el **mapeo compuesto** de f y g es el mapa $g \circ f : X \rightarrow Z$ definido por $g \circ f(x) = g(f(x))$.

Diagramáticamente, la composición de dos funciones se representa como

$$X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z, \quad x \mapsto f(x) \mapsto g(f(x)).$$

1.5. Mapeo inclusión e identidad

Definición 1.5.1. Si $A \subset X$, un **mapeo inclusión** $i : A \rightarrow X$ está definido por $i(a) = a$ para cualquier $a \in A$. Un mapeo inclusión a menudo se escribe como $i : A \hookrightarrow X$.


El **mapeo identidad** $\text{id}_X : X \rightarrow X$ es un caso especial de mapeo inclusión, para el que $A = X$.

1.6. Mapeo inverso

Proposición 1.6.1. Si $f : X \rightarrow Y$, definido por $f : x \mapsto f(x)$, es biyectivo, entonces existe un mapeo inverso $f^{-1} : Y \rightarrow X$ tal que $f^{-1} : f(x) \mapsto x$, que también es biyectivo. Los mapeos f y f^{-1} satisfacen

$$f \circ f^{-1} = \text{id}_Y, \quad f^{-1} \circ f = \text{id}_X.$$

Observación 1.6.2. Si graficamos los mapeos f y f^{-1} , estos son simétricos con respecto a la recta $y = x$, es decir, los puntos de f y f^{-1} son equidistantes con respecto al mapeo identidad $y = x$. Si $(a, b = f(a))$ es un punto en la gráfica de f , entonces el punto $(b = f(a), a)$ debe ser un punto en la gráfica de la función inversa f^{-1} .



Existe una definición alternativa de inversa:

Definición 1.6.3. Si $f : X \rightarrow Y$ y $g : Y \rightarrow X$ satisfacen $f \circ g = \text{id}_Y$ y $g \circ f = \text{id}_X$, entonces f y g son biyecciones. El mapeo g se dice que es la **inversa derecha** de f , y el mapeo f se dice que es la **inversa izquierda** de g .

Proposición 1.6.4. Si $f : X \rightarrow Y$ y $g : Y \rightarrow X$ satisfacen $g \circ f = \text{id}_X$, entonces f es inyectiva y g es sobreyectiva. Si además se cumple $f \circ g = \text{id}_Y$, se obtiene que f y g son ambas biyecciones.

Capítulo 2

Producto Cartesiano

2.1. Definición y ejemplos


El producto cartesiano entre dos conjuntos es una operación que produce un nuevo conjunto cuyos elementos son todos los pares ordenados que pueden formarse, tal que el primer elemento pertenece al primer conjunto y el segundo elemento pertenece al segundo conjunto.

Definición 2.1.1 (Par ordenado). Un par ordenado se compone de dos elementos x e y , y se escribe (x, y) , donde x es el primer elemento e y es el segundo elemento. Se concluye que dos pares ordenados (x, y) y (z, w) son iguales si $x = z$ e $y = w$.

Definición 2.1.2 (Producto cartesiano). El **producto cartesiano** de dos conjuntos A y B es el conjunto, denotado por $A \times B$, de todos los pares ordenados de la forma

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A \wedge b \in B\}.$$

Ejemplo 2.1.3. Sean los conjuntos $A = \{1, 2, 3, 4\}$ y $B = \{2, 4\}$. El producto cartesiano $A \times B$ se obtiene colocando al conjunto A como la abscisa y al conjunto B como la ordenada de un sistema coordenado bidimensional.



lo que resulta en

$$A \times B = \{(1, 2), (1, 4), (2, 2), (2, 4), (3, 2), (3, 4), (4, 2), (4, 4)\}.$$

Ahora efectuamos el producto cartesiano $B \times A$, colocando esta vez a B como abscisa y a A como ordenada:

$$B \times A = \{(2, 1), (2, 2), (2, 3), (2, 4), (4, 1), (4, 2), (4, 3), (4, 4)\}.$$

Es claro que $A \times B \neq B \times A$, por lo tanto el producto cartesiano, en general, **no conmuta**.

2.2. Cardinalidad del producto cartesiano

Una pregunta natural es: ¿cuántos elementos posee el conjunto $A \times B$? En otras palabras, ¿cuál es la cardinalidad de $A \times B$? Sea $\#(A \times B)$ el número de elementos que contiene $A \times B$.

Sea A un conjunto con N_A elementos, $\#(A) = N_A$, y sea B un conjunto con N_B elementos, $\#(B) = N_B$. Para encontrar la cardinalidad de $A \times B$ contamos los elementos que contiene, asumiendo que cada elemento aparece una sola vez. Tomando el primer elemento de A y formando todos los pares ordenados posibles con los elementos de B , se obtienen N_B pares ordenados. Tomando el segundo elemento de A se obtienen otros N_B pares ordenados, y así sucesivamente hasta agotar los N_A elementos de A . Por lo tanto,

$$\#(A \times B) = \underbrace{N_B + N_B + \cdots + N_B}_{N_A} = N_A \cdot N_B.$$

Proposición 2.2.1.

$$\#(A \times B) = N_A \cdot N_B = \#(A) \cdot \#(B).$$

Ejemplo 2.2.2. Para los conjuntos $A = \{1, 2, 3, 4\}$ y $B = \{2, 4\}$ se tiene $\#(A) = 4$ y $\#(B) = 2$, luego $\#(A \times B) = 4 \cdot 2 = 8$.

Proposición 2.2.3. En general $A \times B \neq B \times A$. Sin embargo, ambos conjuntos poseen el mismo número de elementos:

$$\#(A \times B) = N_A \cdot N_B = N_B \cdot N_A = \#(B \times A).$$

2.2.1. Casos particulares

Un caso extremo aparece cuando uno de los conjuntos es el conjunto vacío, $\emptyset$, con $\#(\emptyset) = 0$, por lo que

$$\#(A \times \emptyset) = N_A \cdot 0 = 0.$$

El conjunto vacío actúa como el “cero” del producto cartesiano. Sin embargo, si A es un conjunto continuo, entonces $\#(A) = \infty$, y

$$\#(A \times \emptyset) = \infty \cdot 0 = ?$$

el producto no está determinado por conteo directo. Geométricamente, el conjunto $A \times \emptyset$ se visualiza como un rectángulo de base A y altura $\emptyset$, es decir, una altura sin elementos; por ello es razonable que el rectángulo no contenga elementos.

Definición 2.2.4. El producto cartesiano de un conjunto A con el conjunto vacío es vacío:

$$A \times \emptyset = \emptyset.$$

Si uno de los conjuntos posee un solo elemento, por ejemplo $\#(A) = 1$, entonces

$$\#(A \times B) = 1 \cdot N_B = N_B = \#(B),$$

por lo tanto, un conjunto con un solo elemento actúa como la **identidad** del producto cartesiano.

Axioma 2.2.5. Sean A y B dos conjuntos, entonces existe un único conjunto $A \times B$.

Proposición 2.2.6. Sean $A \neq \emptyset$ y $B \neq \emptyset$, tales que $A \neq B \Rightarrow A \times B \neq B \times A$.

Proposición 2.2.7. Sean $A \neq \emptyset$ y $B \neq \emptyset$. Si $A = B \Leftrightarrow A \times B = B \times A$.

Proposición 2.2.8. Si A , B y C son conjuntos, entonces

$$(A - B) \times C = (A \times C) - (B \times C).$$

Proposición 2.2.9. Si $A \subseteq A'$ y $B \subseteq B'$, entonces $A \times B \subseteq A' \times B'$.


2.3. Producto cartesiano de conjuntos continuos

Los casos interesantes aparecen cuando los conjuntos son continuos, de modo que $\#(A \times B) = \infty$. El producto cartesiano entre conjuntos continuos genera espacios geométricos interesantes.

Ejemplo 2.3.1. Sean los intervalos cerrados $A = [1, 3]$ y $B = [2, 4]$, subconjuntos de $\mathbb{R}$. El producto cartesiano $A \times B$ es

$$A \times B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 1 \leq x \leq 3 \wedge 2 \leq y \leq 4\},$$

que corresponde a un cuadrado compacto en $\mathbb{R}^2$.



Si en cambio se toma $A = [1, 3[$ (semiabierto), el conjunto A no contiene a $x = 3$, y esto se refleja en que $A \times B$ no es compacto: el lado $\{3\} \times [2, 4]$ queda excluido de $A \times B$.

Ejemplo 2.3.2. Consideremos el producto cartesiano entre un intervalo $A = [a, b] \subset \mathbb{R}$ y un punto $B = \{c\} \subset \mathbb{R}$:

$$A \times B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid a \leq x \leq b \wedge y = c\} = \{(x, c) \in \mathbb{R}^2 \mid a \leq x \leq b\},$$

que es un segmento de recta horizontal a la altura $y = c$. Análogamente, $B \times A = \{(c, y) \in \mathbb{R}^2 \mid a \leq y \leq b\}$ es un segmento vertical. En general, el producto cartesiano entre un segmento de $\mathbb{R}$ y un punto genera un segmento de recta en $\mathbb{R}^2$.

Observación 2.3.3. El producto cartesiano entre dos subconjuntos de $\mathbb{R}$ siempre genera una región rectangular en $\mathbb{R}^2$; por lo tanto, una región de $\mathbb{R}^2$ que no sea un rectángulo (por ejemplo, el disco unitario $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$) no puede escribirse en la forma $A \times B$.

2.4. Producto cartesiano de conjuntos unidimensionales curvos

El producto cartesiano entre subconjuntos unidimensionales curvos también da origen a conjuntos en dimensiones mayores. Sea la circunferencia unitaria


$$S^1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 1\}$$

y sea $I = [0, 1]$ (usaremos la notación I para un intervalo cerrado de $\mathbb{R}$ de aquí en adelante).

Ejemplo 2.4.1. Para encontrar $S^1 \times I$ colocamos S^1 como base, horizontalmente en el plano Oxy de un sistema tridimensional, y en cada punto de S^1 colocamos el segmento I en la dirección z :

$$S^1 \times I = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 = 1 \wedge 0 \leq z \leq 1\}.$$

El resultado es el manto de un cilindro, sin las tapas.



También se puede calcular $I \times S^1$, obteniendo


$$I \times S^1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 0 \leq x \leq 1 \wedge y^2 + z^2 = 1\},$$

nuevamente el manto de un cilindro, pero rotado 90° respecto a $S^1 \times I$.

Ejemplo 2.4.2 (El toro). El producto cartesiano entre dos circunferencias S^1 genera el llamado **toro**, denotado

$$T^2 = S^1 \times S^1.$$

Se construye colocando una circunferencia S^1 (por ejemplo horizontal) y, en cada punto de ella, otra circunferencia S^1 , generando la superficie de una cámara de bicicleta. Equivalentemente, se puede colocar primero S^1 en forma vertical y en cada punto ubicar otra circunferencia S^1 ; el resultado es también un toro.



2.5. Producto cartesiano en dimensiones mayores

El producto cartesiano $A \times B$ estudiado hasta ahora se ha realizado con conjuntos unidimensionales, generando conjuntos bidimensionales. Sin embargo, también se pueden realizar productos cartesianos entre conjuntos de mayor dimensión.

Ejemplo 2.5.1. Sea $A \subset \mathbb{R}^2$ y sea $I = [a, b] \subset \mathbb{R}$. El producto cartesiano $A \times I$ es

$$A \times I = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid (x, y) \in A \wedge a \leq z \leq b\},$$

que genera un cilindro macizo en $\mathbb{R}^3$, es decir, un volumen.

Observación 2.5.2. En el producto $A \times B$, si uno (o ambos) de los conjuntos no es compacto, entonces $A \times B$ tampoco es compacto.

2.6. Integración y producto cartesiano

Dada una función $F(x, y)$ definida en $D \subset \mathbb{R}^2$, el cálculo de la integral de F sobre D está dado por

$$I = \int_D F(x, y) d^2x, \quad d^2x = dx dy,$$

donde D se denomina **región de integración**.

Una región general D se puede escribir en la forma

$$D := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x_i \leq x \leq x_f \wedge f_1(x) \leq y \leq f_2(x)\},$$

de modo que la integral doble se escribe

$$I = \int_D F(x, y) d^2x = \int_{x_i}^{x_f} \int_{f_1(x)}^{f_2(x)} F(x, y) dy dx.$$

La integral se evalúa en dos iteraciones: primero se evalúa la integral interna (en y) y luego la integral externa (en x). El proceso no es en general conmutativo:

$$\int_{x_i}^{x_f} \int_{f_1(x)}^{f_2(x)} F(x, y) dy dx \neq \int_{f_1(x)}^{f_2(x)} \int_{x_i}^{x_f} F(x, y) dx dy.$$

Para que el proceso sea conmutativo debemos despejar y en función de x y reescribir la región D como

$$D := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y_i \leq y \leq y_f \wedge g_1(y) \leq x \leq g_2(y)\},$$

de modo que

$$I = \int_D F(x, y) d^2x = \int_{y_i}^{y_f} \int_{g_1(y)}^{g_2(y)} F(x, y) dx dy.$$

Ambas formas de la integral deben coincidir:

$$\int_{x_i}^{x_f} \int_{f_1(x)}^{f_2(x)} F(x, y) dy dx = \int_{y_i}^{y_f} \int_{g_1(y)}^{g_2(y)} F(x, y) dx dy.$$

Ejemplo 2.6.1 (Área del disco compacto). Sea el disco compacto $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq r^2\}$. Calculemos su área,

$$A = \int_D dx dy.$$

Reescribiendo D en la forma

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid -r \leq x \leq r \wedge -\sqrt{r^2 - x^2} \leq y \leq \sqrt{r^2 - x^2}\},$$

la integral queda

$$A = \int_{-r}^r \int_{-\sqrt{r^2 - x^2}}^{\sqrt{r^2 - x^2}} dy dx = \int_{-r}^r y \Big|_{-\sqrt{r^2 - x^2}}^{\sqrt{r^2 - x^2}} dx = 2 \int_{-r}^r \sqrt{r^2 - x^2} dx.$$

Con el cambio de variable $x(\alpha) = r \sin \alpha$,

$$A = 2r^2 \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^2 \alpha d\alpha = r^2 \left(\alpha + \frac{1}{2} \sin(2\alpha) \right) \Big|_{-\pi/2}^{\pi/2} \implies A = \pi r^2.$$

2.6.1. El caso rectangular $D = I_1 \times I_2$

El caso de mayor interés es cuando $D = I_1 \times I_2$ es un rectángulo en $\mathbb{R}^2$,

$$D = I_1 \times I_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x_i \leq x \leq x_f \wedge y_i \leq y \leq y_f\},$$

de modo que la integral I toma la forma

$$I = \int_D F(x, y) d^2x = \int_{I_1 \times I_2} F(x, y) d^2x = \int_{I_1} \int_{I_2} F(x, y) dy dx = \int_{x_i}^{x_f} \int_{y_i}^{y_f} F(x, y) dy dx.$$

En este caso particular sí se cumple

$$\int_{I_1 \times I_2} F(x, y) d^2x = \int_{I_1} \int_{I_2} F(x, y) dy dx = \int_{I_2} \int_{I_1} F(x, y) dy dx = \int_{I_2 \times I_1} F(x, y) d^2x,$$

aun cuando, en general, $I_1 \times I_2 \neq I_2 \times I_1$ como conjuntos ordenados.

Observación 2.6.2. La integración sobre una región $D = I_1 \times I_2$ es distinta de una integración sobre una región $D = D_1 \cup D_2$, puesto que

$$I = \int_{I_1 \times I_2} F(x, y) d^2x = \int_{I_1} \int_{I_2} F(x, y) dy dx,$$

$$I' = \int_{D_1 \cup D_2} F(x, y) d^2x = \int_{D_1} F(x, y) d^2x + \int_{D_2} F(x, y) d^2x,$$

donde $I_i \subset \mathbb{R}$ y $D_i \subset \mathbb{R}^2$, con $i = 1, 2$.

2.6.2. Integrales de una derivada parcial y el borde del rectángulo


Consideremos el caso $F(x, y) = \frac{\partial g(x, y)}{\partial y}$. Entonces

$$I = \int_D F(x, y) d^2x = \int_{I_1 \times I_2} F(x, y) dy dx = \int_{x_i}^{x_f} \int_{y_i}^{y_f} \frac{\partial g(x, y)}{\partial y} dy dx = \int_{x_i}^{x_f} g(x, y) \Big|_{y=y_i}^{y=y_f} dx,$$

es decir,

$$I = \int_{x_i}^{x_f} g(x, y_f) dx - \int_{x_i}^{x_f} g(x, y_i) dx.$$

La primera integral está realizada sobre la región $I_1 \times \{y_f\}$, que es uno de los bordes del rectángulo $M = I_1 \times I_2$. La segunda integral está realizada sobre $I_1 \times \{y_i\}$, el borde opuesto.



Ambas integrales se pueden reescribir en la forma

$$I = \int_{x_i}^{x_f} g(x, y_f) dx - \int_{x_i}^{x_f} g(x, y_i) dx = \int_{I_1} g(x, y_f) dx - \int_{I_1} g(x, y_i) dx = \int_{I_1 \times \{y_f\}} g(x, y) dx - \int_{I_1 \times \{y_i\}} g(x, y) dx,$$

donde los puntos $\{y_i\}$ e $\{y_f\}$ actúan aquí como una “integral interior”. Esta observación anticipa la relación entre integrales de derivadas y la frontera de la región de integración, que se desarrolla en el capítulo siguiente.

Capítulo 3

Frontera

3.1. Espacios topológicos

Definición 3.1.1 (Espacio topológico). Sea X un conjunto y sea $T = \{U_i \mid i \in I\}$, donde I es un conjunto de índices, una colección de subconjuntos de X , es decir $U_i \subset X$. El par (X, T) se dice un **espacio topológico** si T satisface los siguientes axiomas:

- I) $\emptyset, X \in T$.
- II) La unión arbitraria de elementos de T es un elemento de T :

$$\bigcup_{i \in I} U_i \in T.$$

- III) La intersección finita de elementos de T es un elemento de T :

$$\bigcap_{\text{finita}} U_i \in T.$$

Los elementos U_i de T se llaman **conjuntos abiertos**.

Observación 3.1.2. El conjunto T es un conjunto de conjuntos: los elementos de T son, a su vez, conjuntos (los subconjuntos abiertos de X).

Ejemplo 3.1.3. Sea $X = \{a, b, c, d, e\}$.

- $T_1 = \{\emptyset, X, \{a\}, \{c, d\}, \{a, c, d\}, \{b, c, d, e\}\}$ es una topología sobre X .
- $T_2 = \{\emptyset, X, \{a\}, \{c, d\}, \{a, c, d\}, \{a, b, c, d\}\}$ es una topología sobre X .
- $T_3 = \{\emptyset, X, \{a\}, \{e\}, \{a, e\}, \{a, c, e\}, \{b, c, d, e\}\}$ **no es** una topología sobre X , puesto que

$$\{a, c, e\} \cap \{b, c, d, e\} = \{c, e\} \notin T_3.$$

Ejemplo 3.1.4. Sea $X = \mathbb{R}$.

- T_1 , compuesta por $\mathbb{R}$, $\emptyset$ y todos los intervalos $(-n, n)$ con $n \in \mathbb{N}$, es una topología sobre $\mathbb{R}$.
- T_2 , compuesta por $\mathbb{R}$, $\emptyset$ y todos los intervalos $[-n, n]$ con $n \in \mathbb{N}$, es una topología sobre $\mathbb{R}$.
- T_3 , compuesta por $\mathbb{R}$, $\emptyset$ y todos los intervalos $[n, \infty)$ con $n \in \mathbb{N}$, es una topología sobre $\mathbb{R}$.
- T_4 , compuesta por $\mathbb{R}$, $\emptyset$ y todos los intervalos (a, b) , $\forall a, b \in \mathbb{R}$ con $a < b$, junto con todas sus uniones

arbitrarias e intersecciones finitas, es una topología sobre $\mathbb{R}$ llamada **topología usual** o **canónica**.

Definición 3.1.5 (Topología discreta y trivial). Si X es un conjunto y T es la colección de *todos* los subconjuntos de X , entonces T es una topología de X llamada **topología discreta**. Si $T = \{\emptyset, X\}$, entonces T es una topología de X llamada **topología trivial**.

3.2. Espacios de Hausdorff

Definición 3.2.1 (Separabilidad / Hausdorff). Un espacio topológico (X, T) se dice **separable** o de **Hausdorff** si para $x_1, x_2 \in X$, con $x_1 \neq x_2$, existen dos abiertos $x_1 \in U_1$ y $x_2 \in U_2$ tales que

$$U_1 \cap U_2 = \emptyset.$$

Ejemplo 3.2.2. Sea $X = \mathbb{R}^2$ y consideremos dos topologías:

a) T_1 , compuesta por $\mathbb{R}^2$, $\emptyset$ y todos los conjuntos



$$D_r := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 < r^2\}, \quad r > 0,$$

es una topología de $X = \mathbb{R}^2$ (discos centrados en el origen).

b) T_2 , compuesta por $\mathbb{R}^2$, $\emptyset$ y todos los conjuntos

$$D_r(a, b) := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid (x - a)^2 + (y - b)^2 < r^2\}, \quad r > 0, (a, b) \in \mathbb{R}^2,$$

junto con todas sus uniones arbitrarias e intersecciones finitas, es la **topología usual** de $X = \mathbb{R}^2$ (discos centrados en cualquier punto).



Veamos cuál de los dos espacios topológicos, $(\mathbb{R}^2, T_1)$ o $(\mathbb{R}^2, T_2)$, es de Hausdorff.

Caso $(\mathbb{R}^2, T_1)$: sean $x_1 = (1, 0)$, $x_2 = (0, 2) \in \mathbb{R}^2$, y escojamos los abiertos

$$D_{1,1} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 < (1,1)^2\}, \quad D_{2,1} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 < (2,1)^2\},$$

con $x_1 \in D_{1,1}$ y $x_2 \in D_{2,1}$. Como $D_{1,1} \subset D_{2,1}$, se tiene $D_{1,1} \cap D_{2,1} = D_{1,1} \neq \emptyset$. Como cualquier par de abiertos centrados en el origen que contengan a x_1 y x_2 se intersectan de la misma forma, se concluye que $(\mathbb{R}^2, T_1)$ **no** es un espacio de Hausdorff.

Caso $(\mathbb{R}^2, T_2)$: con los mismos puntos, escojamos

$$D_1(1, 0) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid (x - 1)^2 + y^2 < 1\}, \quad D_1(0, 2) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + (y - 2)^2 < 1\},$$

con $x_1 \in D_1(1, 0)$ y $x_2 \in D_1(0, 2)$. Se verifica que $D_1(1, 0) \cap D_1(0, 2) = \emptyset$, por lo tanto $(\mathbb{R}^2, T_2)$ **sí** es un espacio de Hausdorff.

3.3. Entornos

Antes de continuar necesitaremos una definición elemental de teoría de conjuntos.

Definición 3.3.1. Sean los conjuntos A y B . Se define el conjunto $A - B$ como

$$A - B = \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}.$$

Definición 3.3.2 (Entorno). Sea X un espacio topológico y sea $S \subseteq X$. Si $x \in S$, se dice que $V_x \subset X$ es un **entorno** del punto x si contiene un conjunto abierto U_x que a su vez contiene a x :

$$x \in U_x \subseteq V_x.$$

Ejemplo 3.3.3. Sea $S = [0, 1] \subset \mathbb{R}$ con la topología usual. Entonces $[0, 1)$ es un entorno de $x = 1/2$, pues contiene al abierto $(1/4, 3/4)$. También $(1/4, 3/4)$ es en sí mismo un entorno de $x = 1/2$ (y además es abierto). Sea $X = \mathbb{R}^2$ con la topología usual. Un entorno del punto $x = (0, 1)$ es

$$V_x = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid -1 \leq x \leq 1 \wedge -2 \leq y \leq 2\},$$

puesto que contiene al abierto

$$U_x = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + (y - 1)^2 < 1\}.$$

Observación 3.3.4. El entorno V_x no necesariamente es un conjunto abierto. Si V_x es abierto se le llama **entorno abierto**. Algunos autores exigen que los entornos sean siempre abiertos, por lo que conviene prestar atención a la convención de cada texto.

3.4. Un teorema auxiliar: la propiedad de Arquímedes

Proposición 3.4.1 (Arquímedes). Sean dos puntos $x, y \in \mathbb{R}$ con $x < y$. Siempre existe al menos un punto $z \in \mathbb{R}$ tal que $x < z < y$.

Damos una demostración artesanal, no rigurosa pero ilustrativa. Sean $x < y$; un punto entre ambos es el punto medio $z = \frac{x+y}{2}$. En efecto,

$$x < y \quad / \quad +x \Rightarrow 2x < x+y \Rightarrow x < \frac{x+y}{2},$$

$$x < y \quad / \quad +y \Rightarrow x+y < 2y \Rightarrow \frac{x+y}{2} < y,$$

por lo tanto

$$x < \frac{x+y}{2} < y.$$

Este argumento se puede iterar: el punto medio entre x y $\frac{x+y}{2}$ es

$$\frac{x + \frac{x+y}{2}}{2} = \frac{3x+y}{4}, \quad \text{y se cumple} \quad x < \frac{3x+y}{4} < \frac{x+y}{2},$$

generando una sucesión de puntos intermedios cada vez más cercanos a x .

Definición 3.4.2. Se define $\min\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ como la menor de las cantidades $x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R}$.

Ejemplo 3.4.3. $\min\{1, 3\} = 1$. $\min\{1, -3\} = -3$.

3.5. Puntos de acumulación

Definición 3.5.1 (Punto de acumulación). Sea (X, T) un espacio topológico y S un subconjunto de X . Diremos que $x \in X$ es un **punto de acumulación** (o **punto límite**) de S si y solo si para cualquier abierto U_x que sea entorno de x se cumple

$$S \cap (U_x - \{x\}) \neq \emptyset.$$

Ejemplo 3.5.2. Sea $S = [0, 1] \subset \mathbb{R}$ con la topología usual.

Puntos interiores. Sea $x \in S$ con $0 < x < 1$, y sea el entorno abierto $U_x = (x - \epsilon, x + \epsilon)$ con

$$0 < \epsilon < \min \left\{ \frac{x}{2}, \frac{1-x}{2} \right\}$$

(por la propiedad de Arquímedes). Entonces

$$S \cap (U_x - \{x\}) = [0, 1] \cap ((x - \epsilon, x) \cup (x, x + \epsilon)) = (x - \epsilon, x) \cup (x, x + \epsilon) \neq \emptyset,$$

por lo tanto, todos los puntos $0 < x < 1$ de S son puntos de acumulación de S .

El punto $x = 0$. Tomando el abierto $(-\epsilon, \epsilon)$ con ϵ pequeño (por ejemplo $\epsilon = 10^{-5}$):

$$S \cap (U_x - \{0\}) = [0, 1] \cap ((-\epsilon, 0) \cup (0, \epsilon)) = (0, \epsilon) \neq \emptyset,$$

de modo que $x = 0$ es punto de acumulación de S . Análogamente, $x = 1$ es punto de acumulación de S .



Puntos fuera de S . Sea $x = 1 + \epsilon \notin S$, con $\epsilon > 0$ muy pequeño. Consideremos el abierto

$$U_x = \left(1 + \frac{\epsilon}{2}, 1 + \frac{3\epsilon}{2} \right),$$

centrado en $x = 1 + \epsilon$. Se concluye que

$$S \cap (U_x - \{1 + \epsilon\}) = [0, 1] \cap \left(\left(1 + \frac{\epsilon}{2}, 1 + \epsilon \right) \cup \left(1 + \epsilon, 1 + \frac{3\epsilon}{2} \right) \right) = \emptyset,$$

por lo que $x = 1 + \epsilon$ **no** es punto de acumulación de S . Lo mismo ocurre para $x = -\epsilon < 0$. En general, los puntos $x < 0$ y $x > 1$ no son puntos de acumulación de S .

Ejemplo 3.5.3. Sea ahora $S = (0, 1) \subset \mathbb{R}$ con la topología usual. Cada punto interior $0 < x < 1$ es punto de acumulación (mismo argumento que antes). El punto $x = 0$ también es punto de acumulación, pues para el abierto $(-\epsilon, \epsilon)$,

$$S \cap (U_x - \{0\}) = (0, 1) \cap ((-\epsilon, 0) \cup (0, \epsilon)) = (0, \epsilon) \neq \emptyset.$$


Lo mismo ocurre para $x = 1$. Es decir, $x = 0$ y $x = 1$ son puntos de acumulación de S **aunque no pertenecen a S** . Los puntos $x < 0$ y $x > 1$ no son puntos de acumulación.

Observación 3.5.4. Los conjuntos $S_1 = [0, 1]$ y $S_2 = (0, 1)$ poseen los *mismos* puntos de acumulación, aun cuando $S_2 \subsetneq S_1$.

Ejemplo 3.5.5. Sea $S = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq x \leq 1 \wedge 0 \leq y \leq 1\} \subset \mathbb{R}^2$, con la topología usual de $\mathbb{R}^2$. El conjunto S se puede escribir como

$$S = [0, 1] \times [0, 1] = I \times I = I^2,$$

una región cuadrada en $\mathbb{R}^2$.



Puntos interiores. Sea $x = (a, b) \in S$ con $0 < a < 1$ y $0 < b < 1$; es un punto de acumulación de S . Basta tomar el entorno abierto

$$U_x = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid (x - a)^2 + (y - b)^2 < r^2\}, \quad r < \min\{1 - a, a, 1 - b, b\},$$

de modo que $U_x - \{(a, b)\} \subset S$, y por lo tanto $S \cap (U_x - \{(a, b)\}) \neq \emptyset$.

Puntos del borde. Sea $x = (a, 0)$ con $0 \leq a \leq 1$. Tomando el abierto


$$U_x = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid (x - a)^2 + y^2 < r^2\}, \quad r < \min\{a, 1 - a\},$$

se tiene $S \cap (U_x - \{(a, 0)\}) \neq \emptyset$, de modo que todo el segmento

$$L_1 = \{(a, 0) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq a \leq 1\}$$

está formado por puntos de acumulación de S . Del mismo modo son puntos de acumulación de S los segmentos

$$L_2 = \{(1, b) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq b \leq 1\}, \quad L_3 = \{(a, 1) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq a \leq 1\}, \quad L_4 = \{(0, b) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq b \leq 1\}.$$



3.6. Interior de un conjunto

Definición 3.6.1 (Interior). Sea $S \subseteq X$. Se define el **conjunto interior** de S , denotado $\text{int}(S)$ o $\mathring{S}$, como la unión de todos los abiertos contenidos en S .

Ejemplo 3.6.2. Sea $S = [0, 1] \subset \mathbb{R}$ con la topología usual. El conjunto $\{x \in \mathbb{R} \mid 0 < x < 1\}$ es el interior de S :

$$\mathring{S} = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 < x < 1\}.$$

En efecto, sea x con $0 < x < 1$ y sea el abierto $U_x = (x - \epsilon, x + \epsilon)$ con $\epsilon < \min\{x, 1 - x\}$, tal que $S \cap U_x = U_x$, luego $U_x \subset S$.

Sin embargo, el punto $x = 0$ está contenido solo en abiertos que *no* están enteramente contenidos en S : tomando $U_x = (-\epsilon, \epsilon)$,

$$S \cap U_x = (0, \epsilon),$$

que si bien es abierto, no contiene al punto $x = 0$; por lo tanto $0 \notin \mathring{S}$. Lo mismo ocurre con $x = 1 \in S$, así que $1 \notin \mathring{S}$.

Notar que para $S = (0, 1)$ se tiene igualmente $\mathring{S} = (0, 1) = S$.

Proposición 3.6.3. Sea $S \subseteq X$, entonces $\mathring{S} \subseteq S$.

3.7. Conjuntos compactos

Definición 3.7.1 (Compacidad). Un conjunto $S \subseteq X$ se dice **compacto** si contiene a todos sus puntos de acumulación.

Ejemplo 3.7.2. ■ $S = [0, 1]$ es compacto, pues contiene a todos sus puntos de acumulación.

- $S = (0, 1)$ **no** es compacto: no contiene a los puntos de acumulación $x = 0$ y $x = 1$.
- $S = [0, 1)$ **no** es compacto: no contiene al punto de acumulación $x = 1$.
- $S = \mathbb{R}$ **no** es compacto: no contiene a los puntos de acumulación $x = -\infty$ y $x = +\infty$.

3.8. Clausura de un conjunto

Definición 3.8.1 (Clausura). Sea $S \subseteq X$. Se llama **clausura** o **cierre** de S al conjunto de todos los puntos de acumulación de S , y se denota $\bar{S}$.

Ejemplo 3.8.2. ■ $S = [0, 1] \subset \mathbb{R}$: $\bar{S} = S$.

- $S = (0, 1)$: $\bar{S} = S \cup \{0\} \cup \{1\} = [0, 1]$.
- $S = [0, 1)$: $\bar{S} = S \cup \{1\} = [0, 1]$.
- $S = [a, b]$, con $a < b$: $\bar{S} = S$.
- $S = (a, b]$, con $a < b$: $\bar{S} = \{a\} \cup S$.
- $S = \mathbb{R}$: $\bar{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup (\{-\infty\} \cup \{\infty\}) = [-\infty, \infty] = \{x \mid -\infty \leq x \leq \infty\}$.

Proposición 3.8.3. Sea X un espacio topológico y $S \subset X$, entonces $S \subseteq \bar{S}$.

3.9. Frontera de un conjunto

Definición 3.9.1 (Frontera). Sea X un espacio topológico y $S \subseteq X$. Se define el conjunto **frontera** de S , denotado ∂S , como

$$\partial S = \bar{S} \cap \overline{(X - S)}.$$

La frontera también se denomina **borde**.

Ejemplo 3.9.2. Sea $S = [0, 1] \subset \mathbb{R}$ con la topología usual. La clausura de S es $\bar{S} = [0, 1] = S$. El conjunto $\mathbb{R} - S$ es

$$\mathbb{R} - S = (-\infty, 0) \cup (1, +\infty),$$

cuya clausura es

$$\overline{(\mathbb{R} - S)} = (\mathbb{R} - S) \cup \{-\infty\} \cup \{0\} \cup \{1\} \cup \{+\infty\} = [-\infty, 0] \cup [1, +\infty].$$

Entonces la frontera es

$$\partial S = \bar{S} \cap \overline{(\mathbb{R} - S)} = [0, 1] \cap ([-\infty, 0] \cup [1, +\infty]) = \{0\} \cup \{1\}.$$

Ejemplo 3.9.3. En general, sea $S = [a, b]$ con $a < b$. Análogamente al ejemplo anterior,

$$\mathbb{R} - S = (-\infty, a) \cup (b, +\infty), \quad \overline{(\mathbb{R} - S)} = [-\infty, a] \cup [b, +\infty],$$

por lo que

$$\partial S = [a, b] \cap ([-\infty, a] \cup [b, +\infty]) = \{a\} \cup \{b\}.$$

Ejemplo 3.9.4. ■ $S = (0, 1)$: $\partial S = \{0\} \cup \{1\}$.

■ $S = [0, 1)$: $\partial S = \{0\} \cup \{1\}$.

■ $S = X = \mathbb{R}$: $\partial S = \{-\infty\} \cup \{+\infty\}$.

Ejemplo 3.9.5. Sea la circunferencia $S_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 1\}$; entonces $\partial S_1 = \emptyset$. Sea la esfera $S_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$; entonces $\partial S_2 = \emptyset$. En general, para la n -esfera

$$S^n = \{(x_1, \dots, x_{n+1}) \in \mathbb{R}^{n+1} \mid x_1^2 + \dots + x_{n+1}^2 = 1\},$$

se tiene $\partial S^n = \emptyset$.

Definición 3.9.6 (Conjunto sin frontera). Un conjunto $S \subseteq X$, donde X es un espacio topológico, se dice **sin frontera** o **sin borde** si $\partial S = \emptyset$.

Proposición 3.9.7. Sea X un espacio topológico continuo y sea $S \subseteq X$. Si S es un conjunto continuo (sin frontera), entonces


$$\partial^2 S = \partial(\partial S) = \emptyset.$$

Proposición 3.9.8. Sea X un espacio topológico y sean $S_1, S_2 \subseteq X$. Entonces


$$\partial(S_1 \cup S_2) = \partial S_1 \cup \partial S_2, \quad \partial(S_1 \times S_2) = (\partial S_1 \times S_2) \cup (S_1 \times \partial S_2).$$

3.10. La frontera de un rectángulo

Ejemplo 3.10.1. Sea $S = I_1 \times I_2 = [a, b] \times [c, d]$ con $a < b$ y $c < d$.



La frontera de S es $\partial S = L_1 \cup L_2 \cup L_3 \cup L_4$:



donde

$$\begin{aligned}
 L_1 &= \{(x, c) \in \mathbb{R}^2 \mid a < x < b\} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid a < x < b \wedge y = c\} = [a, b] \times \{c\} = I_1 \times \{c\}, \\
 L_2 &= \{(b, y) \in \mathbb{R}^2 \mid c < y < d\} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = b \wedge c < y < d\} = \{b\} \times [c, d] = \{b\} \times I_2, \\
 L_3 &= \{(x, d) \in \mathbb{R}^2 \mid a < x < b\} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid a < x < b \wedge y = d\} = [a, b] \times \{d\} = I_1 \times \{d\}, \\
 L_4 &= \{(a, y) \in \mathbb{R}^2 \mid c < y < d\} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = a \wedge c < y < d\} = \{a\} \times [c, d] = \{a\} \times I_2.
 \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned}
 \partial S &= I_1 \times \{c\} \cup \{b\} \times I_2 \cup I_1 \times \{d\} \cup \{a\} \times I_2 \\
 &= I_1 \times (\{c\} \cup \{d\}) \cup (\{a\} \cup \{b\}) \times I_2 \\
 &= (I_1 \times \partial I_2) \cup (\partial I_1 \times I_2) \\
 &= \partial(I_1 \times I_2).
 \end{aligned}$$

Observación 3.10.2. El resultado del Ejemplo 3.10.1,

$$\partial(I_1 \times I_2) = (\partial I_1 \times I_2) \cup (I_1 \times \partial I_2),$$

es particularmente importante: será usado más adelante para el formalismo lagrangiano de objetos extendidos, donde la frontera de un dominio producto determina las condiciones de borde del sistema físico.

Capítulo 4

Transformación de Coordenadas

4.1. Motivación

Al estudiar un sistema mecánico, la elección del sistema de coordenadas no es única: un mismo punto del espacio se puede describir en coordenadas cartesianas, cilíndricas, esféricas, o en cualquier otro sistema conveniente para el problema. Un problema con simetría esférica (como una fuerza central) resulta mucho más simple en coordenadas esféricas que en cartesianas. El objetivo de este capítulo es formalizar qué significa “cambiar de coordenadas” y cómo transforman, bajo dicho cambio, los distintos objetos geométricos asociados a un vector: sus componentes, la base coordenada, la base dual y la métrica.

4.2. Coordinatización del espacio

Definición 4.2.1 (Coordinatización). Sea M el espacio físico (por ejemplo $\mathbb{R}^3$). Una **coordinatización** de M es un mapeo biyectivo

$$x : M \longrightarrow \mathbb{R}^3, \quad p \longmapsto x(p) = (x^1, x^2, x^3),$$

que asigna a cada punto $p \in M$ una terna ordenada de números reales, llamados las **coordenadas** de p .

Ejemplo 4.2.2. Las coordenadas cartesianas, cilíndricas y esféricas son tres coordinatizaciones distintas de un mismo punto $p \in \mathbb{R}^3$:

$$x_{\text{cart}}(p) = (x, y, z), \quad x_{\text{cil}}(p) = (\rho, \varphi, z), \quad x_{\text{esf}}(p) = (r, \varphi, \theta).$$

4.3. Transformación de coordenadas

Definición 4.3.1 (Transformación de coordenadas). Sean x^i y x'^i ($i = 1, 2, 3$) dos coordinatizaciones distintas de un mismo punto p . Una **transformación de coordenadas** es un par de mapeos biyectivos e inversos entre sí,

$$x'^i = x'^i(x^j), \quad x^i = x^i(x'^j),$$

que relacionan ambas coordinatizaciones.

Ejemplo 4.3.2 (Cartesianas a esféricas). La transformación de coordenadas cartesianas (x, y, z) a esféricas (r, φ, θ) está dada por

$$x = r \sin \theta \cos \varphi, \quad y = r \sin \theta \sin \varphi, \quad z = r \cos \theta,$$

con transformación inversa

$$r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}, \quad \varphi = \arctan\left(\frac{y}{x}\right), \quad \theta = \arccos\left(\frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}\right).$$

4.3.1. El jacobiano de la transformación

Definición 4.3.3 (Matriz jacobiana). Dada una transformación de coordenadas $x'^i = x'^i(x^j)$, se define la **matriz jacobiana** de la transformación como la matriz de 3×3

$$J = \left[\frac{\partial x'^i}{\partial x^j} \right]_{i,j=1,2,3} = \begin{pmatrix} \frac{\partial x'^1}{\partial x^1} & \frac{\partial x'^1}{\partial x^2} & \frac{\partial x'^1}{\partial x^3} \\ \frac{\partial x'^2}{\partial x^1} & \frac{\partial x'^2}{\partial x^2} & \frac{\partial x'^2}{\partial x^3} \\ \frac{\partial x'^3}{\partial x^1} & \frac{\partial x'^3}{\partial x^2} & \frac{\partial x'^3}{\partial x^3} \end{pmatrix},$$

y el **jacobiano** de la transformación es su determinante, $J = \det[\partial x'^i / \partial x^j]$.

Observación 4.3.4. Para que la transformación sea invertible en un entorno de un punto se requiere $J \neq 0$ en dicho punto (teorema de la función inversa). Los puntos donde $J = 0$ son puntos singulares de la coordinatización; por ejemplo, el origen $r = 0$ en coordenadas esféricas, o el eje z ($\rho = 0$) en coordenadas cilíndricas.

Ejemplo 4.3.5. Para la transformación de cartesianas a esféricas, el jacobiano es

$$J = \det \left[\frac{\partial x'^i}{\partial x^j} \right] = r^2 \sin \theta.$$

El jacobiano se anula en $r = 0$ y en $\theta = 0, \pi$ (el eje z), que son precisamente los puntos donde la coordinatización esférica es singular: en el origen φ y θ no están definidos, y sobre el eje z , φ no está definido.

4.4. Vectores base

Definición 4.4.1 (Base coordenada). Dada una coordinatización x^i de $\mathbb{R}^3$, la **base coordenada** asociada es el conjunto de vectores

$$\vec{e}_i = \frac{\partial \vec{r}}{\partial x^i}, \quad i = 1, 2, 3,$$

donde $\vec{r} = \vec{r}(x^1, x^2, x^3)$ es el vector posición.

Proposición 4.4.2. Bajo una transformación de coordenadas $x^i = x^i(x'^j)$, la base coordenada $\{\vec{e}_i\}_{i=1}^3$ transforma como

$$\vec{e}'_i = \sum_{j=1}^3 \frac{\partial x^j}{\partial x'^i} \vec{e}_j.$$

Demostración. Por regla de la cadena,

$$\vec{e}'_i = \frac{\partial \vec{r}}{\partial x'^i} = \sum_{j=1}^3 \frac{\partial x^j}{\partial x'^i} \frac{\partial \vec{r}}{\partial x^j} = \sum_{j=1}^3 \frac{\partial x^j}{\partial x'^i} \vec{e}_j. \quad \square$$

De manera análoga, contrayendo la expresión anterior con $\sum_i \partial x'^k / \partial x^i$ y usando $\sum_i (\partial x'^k / \partial x^i) (\partial x^i / \partial x'^j) = \delta_j^k$, se obtiene la relación inversa:

Proposición 4.4.3. Bajo la transformación inversa $x'^i = x'^i(x^j)$,

$$\vec{e}_i = \sum_{j=1}^3 \frac{\partial x'^j}{\partial x^i} \vec{e}'_j.$$

Ejemplo 4.4.4 (Base esférica a partir de la cartesiana). Sea $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3\} = \{\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}\}$ la base cartesiana, y sea $\{\vec{e}'_1, \vec{e}'_2, \vec{e}'_3\} = \{\vec{e}_r, \vec{e}_\varphi, \vec{e}_\theta\}$ la base coordenada esférica. Usando $x^j = x^j(x'^i) = x^j(r, \varphi, \theta)$,

$$\vec{e}'_1 = \vec{e}_r = \sum_{j=1}^3 \frac{\partial x^j}{\partial r} \vec{e}_j = \frac{\partial x}{\partial r} \hat{i} + \frac{\partial y}{\partial r} \hat{j} + \frac{\partial z}{\partial r} \hat{k},$$

lo que da

$$\vec{e}_r = \sin \theta \cos \varphi \hat{i} + \sin \theta \sin \varphi \hat{j} + \cos \theta \hat{k}.$$

Análogamente, derivando respecto de φ y de θ ,

$$\vec{e}_\varphi = r \sin \theta (-\sin \varphi \hat{i} + \cos \varphi \hat{j}), \quad \vec{e}_\theta = r (\cos \varphi \cos \theta \hat{i} + \sin \varphi \cos \theta \hat{j} - \sin \theta \hat{k}).$$

Notar que $\vec{e}_r$ es unitario, pero $\vec{e}_\varphi$ y $\vec{e}_\theta$ no lo son: $\|\vec{e}_\varphi\| = r \sin \theta$ y $\|\vec{e}_\theta\| = r$. La base coordenada $\{\vec{e}_r, \vec{e}_\varphi, \vec{e}_\theta\}$ es ortogonal pero **no ortonormal**; ésta es la base “natural” asociada a las coordenadas esféricas, distinta de la base ortonormal $\{\hat{r}, \hat{\varphi}, \hat{\theta}\}$ usada habitualmente en física elemental.

Realizando el cálculo inverso, $x^i = x^i(x'^j)$, se obtienen los vectores cartesianos en términos de la base esférica:

$$\hat{i} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \vec{e}_r - \frac{y}{x^2 + y^2} \vec{e}_\varphi + \frac{xz}{\sqrt{x^2 + y^2} (x^2 + y^2 + z^2)} \vec{e}_\theta,$$

y expresiones análogas para $\hat{j}$ y $\hat{k}$; reescritas en coordenadas esféricas por estética,

$$\begin{aligned} \hat{i} &= \cos \varphi \sin \theta \vec{e}_r - \frac{\sin \varphi}{r \sin \theta} \vec{e}_\varphi + \frac{\cos \varphi \cos \theta}{r} \vec{e}_\theta, & \hat{j} &= \sin \varphi \sin \theta \vec{e}_r + \frac{\cos \varphi}{r \sin \theta} \vec{e}_\varphi + \frac{\sin \varphi \cos \theta}{r} \vec{e}_\theta, \\ \hat{k} &= \cos \theta \vec{e}_r - \frac{\sin \theta}{r} \vec{e}_\theta. \end{aligned}$$

4.5. Componentes de un vector: tensores contravariantes

Proposición 4.5.1. Sea $\vec{A}$ un vector con componentes A^i en la base $\{\vec{e}_i\}$. Bajo la transformación de coordenadas $x^i = x^i(x'^j)$, las componentes de $\vec{A}$ transforman como

$$A'^i = \sum_{j=1}^3 \frac{\partial x'^i}{\partial x^j} A^j.$$

Demostración. Como $\vec{A}$ no depende del sistema coordenado, $\vec{A}|_{O'} = \vec{A}|_O$, es decir

$$\sum_{i=1}^3 A'^i \vec{e}'_i = \sum_{j=1}^3 A^j \vec{e}_j = \sum_{j=1}^3 A^j \sum_{i=1}^3 \frac{\partial x'^i}{\partial x^j} \vec{e}'_i = \sum_{i=1}^3 \left(\sum_{j=1}^3 \frac{\partial x'^i}{\partial x^j} A^j \right) \vec{e}'_i.$$

Como la base $\{\vec{e}'_i\}$ es linealmente independiente, se concluye

$$A'^i = \sum_{j=1}^3 \frac{\partial x'^i}{\partial x^j} A^j. \quad \square$$

Contrayendo con $\sum_i \partial x^k / \partial x'^i$ y usando la regla de la cadena se obtiene la relación inversa:

Proposición 4.5.2.

$$A^k = \sum_{i=1}^3 \frac{\partial x^k}{\partial x'^i} A'^i.$$

Ejemplo 4.5.3. Sea $\vec{A} = A_x \hat{i} + A_y \hat{j} + A_z \hat{k} = A_r \vec{e}_r + A_\varphi \vec{e}_\varphi + A_\theta \vec{e}_\theta$. Usando la Proposición 4.5.1 con la transformación a esféricas se obtiene, tras simplificar,

$$A_r = \cos \varphi \sin \theta A_x + \sin \varphi \sin \theta A_y + \cos \theta A_z = \vec{e}_r \cdot \vec{A},$$

$$A_\varphi = -\frac{\sin \varphi}{r \sin \theta} A_x + \frac{\cos \varphi}{r \sin \theta} A_y = \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \vec{e}_\varphi \cdot \vec{A}, \quad A_\theta = \frac{\cos \varphi \cos \theta}{r} A_x + \frac{\sin \varphi \cos \theta}{r} A_y - \frac{\sin \theta}{r} A_z = \frac{1}{r^2} \vec{e}_\theta \cdot \vec{A}.$$

Notar que A_φ y A_θ **no** son simplemente $\vec{e}_\varphi \cdot \vec{A}$ ni $\vec{e}_\theta \cdot \vec{A}$, sino que llevan un factor de normalización: esto ocurre porque $\{\vec{e}_r, \vec{e}_\varphi, \vec{e}_\theta\}$ no es una base ortonormal (véase la sección sobre la base dual, más adelante).

La transformación inversa da

$$A_x = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} A_r - y A_\varphi + \frac{xz}{\sqrt{x^2 + y^2}} A_\theta, \quad A_y = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} A_r + x A_\varphi + \frac{yz}{\sqrt{x^2 + y^2}} A_\theta,$$

$$A_z = \frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} A_r - \sqrt{x^2 + y^2} A_\theta.$$

Observación 4.5.4. De la discusión anterior se concluye que:

- Las cantidades con el índice **arriba** transforman con la matriz $\partial x'^i / \partial x^j$.
- Las cantidades con el índice **abajo** transforman con la matriz $\partial x^i / \partial x'^j$.

En la construcción de un vector $\vec{A} = \sum_i A^i \vec{e}_i$ se necesitan las cantidades $\{\vec{e}_i\}$ (índice abajo) y $\{A^i\}$ (índice arriba): se contrae un índice arriba con uno abajo. Esta es la razón estructural por la que los vectores no dependen del sistema coordenado: las dos leyes de transformación (una y su inversa) se cancelan exactamente.

Definición 4.5.5 (Índices contraídos). Un índice arriba y un índice abajo se dicen **contraídos** si están bajo una suma sobre dicho índice.

Definición 4.5.6 (Tensor contravariante de orden uno). La cantidad T^i se dice un **tensor contravariante de orden uno**, o **tensor de orden** $(1, 0)$, si bajo una transformación de coordenadas $x^i = x'^i(x'^j)$ transforma como

$$T'^i = \sum_{j=1}^3 \frac{\partial x'^i}{\partial x^j} T^j.$$

Las componentes A^i de un vector arbitrario $\vec{A}$ son, por lo tanto, un tensor de orden $(1, 0)$.

4.6. Vectores duales y tensores covariantes

Definición 4.6.1 (Base dual). La **base dual** $\{\vec{E}^i\}_{i=1}^3$ asociada a la base coordenada $\{\vec{e}_i\}_{i=1}^3$ es el conjunto de (co)vectores definido por la relación invariante

$$E^i(\vec{e}_j) = \delta_j^i,$$

que se cumple en cualquier sistema de coordenadas: $E^i(e_j)|_O = E^i(e_j)|_{O'} = \delta_j^i$.

Observación 4.6.2. Los vectores duales pertenecen al espacio dual $V^*(n, K)$; un vector dual arbitrario se escribe $\vec{f} = \sum_i f_i \vec{E}^i$, con componentes con el índice abajo. Como $\vec{f}$ tampoco depende del sistema coordenado ($\vec{f}|_{O'} = \vec{f}|_O$), la base dual debe poseer su propia ley de transformación, distinta de la de la base coordenada, ya que $\vec{E}^i$ lleva el índice arriba.

Proposición 4.6.3. Bajo la transformación de coordenadas $x^i = x^i(x'^j)$, la base dual transforma como

$$E'^i = \sum_{j=1}^3 \frac{\partial x'^i}{\partial x^j} E^j.$$

Demostración. Partimos de la relación invariante $E^i(e_j)|_{O'} = \delta_j^i$ y usamos la ley de transformación de $\vec{e}_j$ (transformación inversa $x^j = x^j(x'^k)$):

$$E'^i(e'_j) = \left(\sum_{k=1}^3 \frac{\partial x'^i}{\partial x^k} E^k \right) \left(\sum_{l=1}^3 \frac{\partial x^l}{\partial x'^j} e_l \right) = \sum_{k=1}^3 \sum_{l=1}^3 \frac{\partial x'^i}{\partial x^k} \frac{\partial x^l}{\partial x'^j} E^k(e_l) = \sum_{k=1}^3 \frac{\partial x'^i}{\partial x^k} \frac{\partial x^k}{\partial x'^j} = \delta_j^i, \quad \square$$

lo cual confirma que la ley propuesta es consistente con la definición invariante de la base dual.

Contrayendo con $\sum_i \partial x^k / \partial x'^i$ se obtiene la transformación inversa:

$$E^k = \sum_{i=1}^3 \frac{\partial x^k}{\partial x'^i} E'^i.$$

Proposición 4.6.4. La componente f_i de un vector dual $\vec{f}$ transforma, bajo $x'^i = x'^i(x^j)$, como

$$f'_i = \sum_{j=1}^3 \frac{\partial x^j}{\partial x'^i} f_j.$$

Demostración. Como $\vec{f}|_O = \vec{f}|_{O'}$,

$$\sum_{j=1}^3 f_j E^j = \sum_{i=1}^3 f'_i E'^i = \sum_{i=1}^3 f'_i \sum_{j=1}^3 \frac{\partial x^j}{\partial x'^i} E^j,$$

y por independencia lineal de $\{\vec{E}^j\}$,

$$f'_i = \sum_{j=1}^3 \frac{\partial x^j}{\partial x'^i} f_j. \quad \square$$

Definición 4.6.5 (Tensor covariante de orden uno). La cantidad T_i se dice un **tensor covariante de orden uno**, o **tensor de orden** $(0, 1)$, si bajo la transformación de coordenadas $x^i = x^i(x'^j)$ transforma como

$$T'_i = \sum_{j=1}^3 \frac{\partial x^j}{\partial x'^i} T_j.$$

Observación 4.6.6. El término **covarianza** (invariancia de forma) de un vector significa que el vector no cambia de forma bajo una transformación de coordenadas: no cambia su dirección, sentido ni magnitud. Sin embargo, bajo un cambio de coordenadas cambian las bases coordenadas, por lo que el valor numérico de sus componentes sí cambia.

4.7. La métrica

Definición 4.7.1 (Métrica). La **métrica** asociada a una base coordenada $\{\vec{e}_i\}_{i=1}^3$ es

$$g_{ij} = \vec{e}_i \cdot \vec{e}_j.$$

Ejemplo 4.7.2. En coordenadas cartesianas, $g_{ij} = \delta_{ij}$ (la **métrica de Euclides**). En coordenadas esféricas,

$$g_{ij} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & r^2 \sin^2 \theta & 0 \\ 0 & 0 & r^2 \end{pmatrix},$$

consistente con $\|\vec{e}_r\|^2 = 1$, $\|\vec{e}_\varphi\|^2 = r^2 \sin^2 \theta$, $\|\vec{e}_\theta\|^2 = r^2$ obtenidas anteriormente.

Proposición 4.7.3. La métrica $g_{ij}(x^k)$ bajo una transformación de coordenadas $x^i = x^i(x'^j)$ transforma como

$$g'_{ij} = \sum_{k=1}^3 \sum_{l=1}^3 \frac{\partial x^k}{\partial x'^i} \frac{\partial x^l}{\partial x'^j} g_{kl}.$$

Demostración. Usando la ley de transformación de la base coordenada,

$$g'_{ij} = \vec{e}'_i \cdot \vec{e}'_j = \left(\sum_{k=1}^3 \frac{\partial x^k}{\partial x'^i} \vec{e}_k \right) \cdot \left(\sum_{l=1}^3 \frac{\partial x^l}{\partial x'^j} \vec{e}_l \right) = \sum_{k=1}^3 \sum_{l=1}^3 \frac{\partial x^k}{\partial x'^i} \frac{\partial x^l}{\partial x'^j} \vec{e}_k \cdot \vec{e}_l = \sum_{k=1}^3 \sum_{l=1}^3 \frac{\partial x^k}{\partial x'^i} \frac{\partial x^l}{\partial x'^j} g_{kl}. \quad \square$$

Definición 4.7.4 (Tensor covariante de orden dos). La cantidad T_{ij} se dice un tensor covariante de orden 2, o tensor de orden $(0, 2)$, si transforma como

$$T'_{ij} = \sum_{k=1}^3 \sum_{l=1}^3 \frac{\partial x^k}{\partial x'^i} \frac{\partial x^l}{\partial x'^j} T_{kl}.$$

Por lo tanto, la métrica g_{ij} es un tensor de orden $(0, 2)$.

Ejemplo 4.7.5. Recuperemos la métrica esférica a partir de la métrica cartesiana $g_{ij} = \delta_{ij}$ usando la Proposición 4.7.3:

$$g'_{ij} = \sum_{k=1}^3 \frac{\partial x^k}{\partial x'^i} \frac{\partial x^k}{\partial x'^j} = \frac{\partial x}{\partial x'^i} \frac{\partial x}{\partial x'^j} + \frac{\partial y}{\partial x'^i} \frac{\partial y}{\partial x'^j} + \frac{\partial z}{\partial x'^i} \frac{\partial z}{\partial x'^j}.$$

Sustituyendo $x = r \sin \theta \cos \varphi$, etc., se recupera

$$g'_{ij} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & r^2 \sin^2 \theta & 0 \\ 0 & 0 & r^2 \end{pmatrix}.$$

4.7.1. El elemento de línea

Proposición 4.7.6. El elemento de línea ds , definido por $ds^2 = \sum_{i,j} g_{ij} dx^i dx^j$, es un invariante bajo transformaciones de coordenadas: $ds' = ds$.

Demostración. En el sistema $O'x'^i$,

$$ds'^2 = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 g'_{ij} dx'^i dx'^j.$$

Bajo $x'^i = x'^i(x^j)$, el diferencial dx'^i transforma como $dx'^i = \sum_j (\partial x'^i / \partial x^j) dx^j$, es decir, dx^i es un tensor de orden $(1, 0)$. Sustituyendo esto y la ley de transformación de g'_{ij} (Proposición 4.7.3),

$$ds'^2 = \sum_{i,j,k,l} \frac{\partial x^k}{\partial x'^i} \frac{\partial x^l}{\partial x'^j} g_{kl} \sum_n \frac{\partial x'^i}{\partial x^n} dx^n \sum_m \frac{\partial x'^j}{\partial x^m} dx^m = \sum_{k,l,n,m} \left(\sum_i \frac{\partial x^k}{\partial x'^i} \frac{\partial x'^i}{\partial x^n} \right) \left(\sum_j \frac{\partial x^l}{\partial x'^j} \frac{\partial x'^j}{\partial x^m} \right) g_{kl} dx^n dx^m.$$

Ambos paréntesis son deltas de Kronecker, δ_n^k y δ_m^l , de modo que

$$ds'^2 = \sum_{k,l} g_{kl} dx^k dx^l = ds^2 \implies ds' = ds. \quad \square$$

Observación 4.7.7. El elemento de línea no es un vector sino un *escalar*: un número (con dimensión) cuyo valor no cambia bajo un cambio de coordenadas. En particular, el largo de una trayectoria tiene el mismo valor en todos los sistemas coordenados.

4.8. Invariantes: producto escalar, magnitud y ángulo

Proposición 4.8.1. El producto escalar $\vec{A} \cdot \vec{B} = \sum_{i,j} g_{ij} A^i B^j$ entre dos vectores cualesquiera es invariante bajo transformación de coordenadas.

Demostración. Análogo a la demostración de la invariancia del elemento de línea, reemplazando dx^i por A^i y dx^j por B^j (ambos tensores de orden $(1,0)$):

$$\vec{A} \cdot \vec{B}|_{O'} = \sum_{i,j} g'_{ij} A'^i B'^j = \sum_{n,m} g_{nm} A^n B^m = \vec{A} \cdot \vec{B}|_O. \quad \square$$

El producto escalar es un número real, no un vector; por lo tanto su valor numérico no cambia bajo una transformación de coordenadas. De este resultado se derivan dos corolarios inmediatos.

Corolario 4.8.2. La magnitud $\|\vec{A}\| = \sqrt{\vec{A} \cdot \vec{A}}$ de un vector es invariante bajo transformaciones de coordenadas.

Demostración. Tomando $\vec{B} = \vec{A}$ en la proposición anterior, $\vec{A} \cdot \vec{A}|_{O'} = \vec{A} \cdot \vec{A}|_O$, es decir $\|\vec{A}\|^2|_{O'} = \|\vec{A}\|^2|_O$, luego $\|\vec{A}\|_{O'} = \|\vec{A}\|_O$. $\square$

Corolario 4.8.3. El ángulo entre dos vectores es invariante bajo transformación de coordenadas.

Demostración. El ángulo θ entre $\vec{A}$ y $\vec{B}$ está dado por $\cos \theta = (\vec{A} \cdot \vec{B})/(\|\vec{A}\| \|\vec{B}\|)$. Como el numerador y ambos factores del denominador son invariantes, $\cos \theta|_{O'} = \cos \theta|_O$, y por lo tanto $\theta|_{O'} = \theta|_O$. $\square$

Observación 4.8.4 (Definición formal vía el espacio dual). Formalmente, el producto escalar entre un vector dual $\vec{f} = \sum_i f_i \vec{E}^i \in V^*(n, K)$ y un vector $\vec{v} = \sum_i v^i \vec{e}_i \in V(n, K)$ se define como el emparejamiento natural

$$f(v) = \sum_{i=1}^3 f_i v^i.$$

Proposición 4.8.5. El emparejamiento $f(v) = \sum_i f_i v^i$ es invariante bajo la transformación de coordenadas $x'^i = x'^i(x^j)$.

Demostración. Las cantidades v^i y f_i son tensores de orden $(1,0)$ y $(0,1)$ respectivamente, es decir $v'^i = \sum_j (\partial x'^i / \partial x^j) v^j$ y $f'_i = \sum_j (\partial x^j / \partial x'^i) f_j$. Entonces

$$f'(v') = \sum_{i=1}^3 f'_i v'^i = \sum_{i,j,k} \frac{\partial x^j}{\partial x'^i} f_j \frac{\partial x'^i}{\partial x^k} v^k = \sum_{j,k} \left(\sum_i \frac{\partial x^j}{\partial x'^i} \frac{\partial x'^i}{\partial x^k} \right) f_j v^k = \sum_{j,k} \delta_k^j f_j v^k = \sum_j f_j v^j = f(v). \quad \square$$

4.9. La métrica inversa

Proposición 4.9.1. La métrica inversa g^{ij} está dada en términos de la base dual $\{\vec{E}^i\}_{i=1}^3$ por

$$g^{ij} = \vec{E}^i \cdot \vec{E}^j.$$

Demostración. La base dual se relaciona con la base coordinada a través de la métrica inversa, $\vec{E}^i = \sum_j g^{ij} \vec{e}_j$, de modo que se cumpla la definición $E^i(e_j) = \vec{E}^i \cdot \vec{e}_j = \sum_k g^{ik} \vec{e}_k \cdot \vec{e}_j = \sum_k g^{ik} g_{kj} = \delta_j^i$. Entonces

$$\vec{E}^i \cdot \vec{E}^j = \sum_k g^{ik} \vec{e}_k \cdot \sum_l g^{jl} \vec{e}_l = \sum_{k,l} g^{ik} g^{jl} g_{kl} = \sum_k g^{ik} \left(\sum_l g^{jl} g_{kl} \right) = \sum_k g^{ik} \delta_k^j = g^{ij}. \quad \square$$

Ejemplo 4.9.2. En coordenadas esféricas, usando $\vec{E}^1 = \vec{e}_r$, $\vec{E}^2 = \vec{e}_\varphi / (r^2 \sin^2 \theta)$, $\vec{E}^3 = \vec{e}_\theta / r^2$ (obtenidos de $\vec{E}^i = \sum_j g^{ij} \vec{e}_j$ con $g^{ij} = \text{diag}(1, 1/(r^2 \sin^2 \theta), 1/r^2)$), se verifica directamente

$$g^{11} = \vec{E}^1 \cdot \vec{E}^1 = \vec{e}_r \cdot \vec{e}_r = 1, \quad g^{22} = \vec{E}^2 \cdot \vec{E}^2 = \frac{\vec{e}_\varphi \cdot \vec{e}_\varphi}{r^4 \sin^4 \theta} = \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta}, \quad g^{33} = \vec{E}^3 \cdot \vec{E}^3 = \frac{\vec{e}_\theta \cdot \vec{e}_\theta}{r^4} = \frac{1}{r^2},$$

y los términos cruzados $g^{12} = g^{13} = g^{23} = 0$ por ortogonalidad de la base esférica. Es decir,

$$g^{ij} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{r^2} \end{pmatrix},$$

el resultado conocido.

Proposición 4.9.3. La métrica inversa g^{ij} bajo una transformación de coordenadas $x'^i = x'^i(x^j)$ transforma como

$$g'^{ij} = \sum_{k=1}^3 \sum_{l=1}^3 \frac{\partial x'^i}{\partial x^k} \frac{\partial x'^j}{\partial x^l} g^{kl}.$$

Demostración. Escribiendo $g'^{ij} = \vec{E}'^i \cdot \vec{E}'^j$ y usando la ley de transformación de la base dual (Proposición 4.6.3),

$$g'^{ij} = \left(\sum_k \frac{\partial x'^i}{\partial x^k} \vec{E}^k \right) \cdot \left(\sum_l \frac{\partial x'^j}{\partial x^l} \vec{E}^l \right) = \sum_{k,l} \frac{\partial x'^i}{\partial x^k} \frac{\partial x'^j}{\partial x^l} \vec{E}^k \cdot \vec{E}^l = \sum_{k,l} \frac{\partial x'^i}{\partial x^k} \frac{\partial x'^j}{\partial x^l} g^{kl}. \quad \square$$

Ejemplo 4.9.4. Verifiquemos la componente g'^{11} de la métrica esférica a partir de $g^{kl} = \delta^{kl}$ (cartesiana) usando la Proposición 4.9.3:

$$g'^{11} = \left(\frac{\partial r}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial r}{\partial y} \right)^2 + \left(\frac{\partial r}{\partial z} \right)^2 = \frac{x^2}{r^2} + \frac{y^2}{r^2} + \frac{z^2}{r^2} = 1,$$

consistente con el resultado directo. Repitiendo el cálculo para las demás componentes se recupera $g^{ij} = \text{diag}(1, 1/(r^2 \sin^2 \theta), 1/r^2)$.

Definición 4.9.5 (Tensor contravariante de orden dos). La cantidad T^{ij} se dice un tensor contravariante de orden 2, o tensor de orden $(2,0)$, si bajo $x'^i = x'^i(x^j)$ transforma como

$$T'^{ij} = \sum_{k=1}^3 \sum_{l=1}^3 \frac{\partial x'^i}{\partial x^k} \frac{\partial x'^j}{\partial x^l} T^{kl}.$$

Por lo tanto, la métrica inversa g^{ij} es un tensor de orden $(2,0)$.

4.10. Los tres símbolos delta

Conviene distinguir con cuidado tres cantidades que, a primera vista, parecen representar todas a la matriz identidad: δ_{ij} , δ^{ij} y δ_j^i .

Proposición 4.10.1. *De las tres cantidades δ_{ij} , δ^{ij} y δ_j^i , solo δ_j^i es invariante bajo transformaciones de coordenadas.*

Demostración. Como δ_l^k es un tensor de orden $(1,1)$ (transforma con un índice arriba y uno abajo, cada uno con su matriz correspondiente),

$$\delta_j^{i'} = \sum_{k=1}^3 \sum_{l=1}^3 \frac{\partial x^{i'}}{\partial x^k} \frac{\partial x^l}{\partial x^{j'}} \delta_l^k = \sum_{k=1}^3 \frac{\partial x^{i'}}{\partial x^k} \frac{\partial x^k}{\partial x^{j'}} = \frac{\partial x^{i'}}{\partial x^{j'}} = \delta_j^i. \quad \square$$

En cambio, δ_{ij} y δ^{ij} transforman como tensores de orden $(0,2)$ y $(2,0)$ respectivamente, y por lo tanto **no** son invariantes: cambian su forma funcional bajo un cambio de coordenadas (por ejemplo, al pasar a esféricas dejan de ser la matriz identidad).

Observación 4.10.2. En resumen:

- δ_j^i es la matriz identidad (invariante, tensor de orden $(1,1)$).
- δ_{ij} es la métrica asociada a las coordenadas cartesianas, llamada **métrica de Euclides** (tensor de orden $(0,2)$).
- δ^{ij} es la métrica inversa de la métrica de Euclides (tensor de orden $(2,0)$).

Capítulo 5

Análisis Tensorial

5.1. Convención de suma de Einstein

Sea el espacio vectorial $V(n, K)$, generalización a n dimensiones sobre un campo K del espacio vectorial estudiado en el capítulo anterior, con base $\{\vec{e}_i\}_{i=1}^n$. Si $\vec{v} \in V(n, K)$, se escribe como combinación lineal de la base elegida,

$$\vec{v} = \sum_{i=1}^n v^i \vec{e}_i,$$

donde v^i es la componente del vector respecto de la base.

Definición 5.1.1 (Convención de Einstein). Debido a que al trabajar con muchos índices aparecen muchas sumas, adoptamos la **convención de suma de Einstein**: eliminaremos el símbolo de suma $\sum$ y asumiremos que **índices repetidos significan suma**, a menos que se diga explícitamente lo contrario.

Con esta convención, la ecuación anterior se simplifica a

$$\vec{v} = v^i \vec{e}_i.$$

Del mismo modo, si $\vec{f} \in V^*(n, K)$ es un vector dual escrito en la base dual $\{\vec{E}^i\}_{i=1}^n$,

$$\vec{f} = f_i \vec{E}^i.$$

Los vectores del espacio dual son mapeos lineales que actúan sobre los vectores del espacio vectorial y los llevan a K ,

$$f(v) = f_i v^i \in K,$$

donde recordamos que los vectores duales se definen mediante $E^i(e_j) = \delta_j^i$. A partir de aquí, salvo que se indique lo contrario, se usará siempre la convención de Einstein.

5.2. Subir y bajar índices

Como se estudió en el capítulo anterior, la métrica g_{ij} permite definir el producto escalar y, además, permite pasar del espacio vectorial al espacio vectorial dual,

$$g_{ij} : V(n, K) \longrightarrow V^*(n, K), \quad v_i = g_{ij} v^j.$$

Como $\det(g_{ij}) \neq 0$, existe la métrica inversa g^{ij} , tal que $g^{ik} g_{kj} = \delta_j^i$, la cual permite pasar del espacio vectorial dual al espacio vectorial,

$$g^{ij} : V^*(n, K) \longrightarrow V(n, K), \quad f^i = g^{ij} f_j.$$

Observación 5.2.1. Decimos que la métrica **baja índices**: convierte índices contravariantes en covariantes. La métrica inversa **sube índices**: convierte índices covariantes en contravariantes.

Proposición 5.2.2. La cantidad $v_i = g_{ij}v^j$, construida a partir del tensor v^i de orden $(1,0)$, es un tensor de orden $(0,1)$.

Demostración. Sea la transformación de coordenadas $x'^i = x'^i(x^j)$. Usando la definición $v_i = g_{ij}v^j$ en el sistema $O'x'^i$ y las leyes de transformación de g_{ij} y v^j ,

$$v'_i = g'_{ij}v'^j = \frac{\partial x^k}{\partial x'^i} \frac{\partial x^l}{\partial x'^j} g_{kl} \frac{\partial x^j}{\partial x^n} v^n = \frac{\partial x^k}{\partial x'^i} \left(\frac{\partial x^l}{\partial x'^j} \frac{\partial x^j}{\partial x^n} \right) g_{kl} v^n = \frac{\partial x^k}{\partial x'^i} \delta_n^l g_{kl} v^n = \frac{\partial x^k}{\partial x'^i} g_{kl} v^l = \frac{\partial x^k}{\partial x'^i} v_k,$$

donde en el último paso se usó nuevamente $v_k = g_{kl}v^l$. Por lo tanto

$$v'_i = \frac{\partial x^k}{\partial x'^i} v_k,$$

que es precisamente la ley de transformación de un tensor de orden $(0,1)$. $\square$

Proposición 5.2.3. La cantidad $f^i = g^{ij}f_j$, construida a partir del tensor f_i de orden $(0,1)$, es un tensor de orden $(1,0)$.

Demostración. Análogamente,

$$f'^i = g'^{ij}f'_j = \frac{\partial x'^i}{\partial x^k} \frac{\partial x'^j}{\partial x^l} g^{kl} \frac{\partial x^n}{\partial x'^j} f_n = \frac{\partial x'^i}{\partial x^k} \left(\frac{\partial x'^j}{\partial x^l} \frac{\partial x^n}{\partial x'^j} \right) g^{kl} f_n = \frac{\partial x'^i}{\partial x^k} \delta_l^n g^{kl} f_n = \frac{\partial x'^i}{\partial x^k} g^{kl} f_l = \frac{\partial x'^i}{\partial x^k} f^k, \quad \square$$

que es la ley de transformación de un tensor de orden $(1,0)$.

5.3. El producto tensorial

5.3.1. Motivación: producto tensorial de matrices columna

Comencemos con $n = 3$ y el espacio vectorial $\mathbb{R}^3$, escribiendo los vectores como matrices columna.

Definición 5.3.1 (Producto tensorial de matrices columna). Sean los vectores $v = (v^1, v^2, v^3)^T$ y $w = (w^1, w^2, w^3)^T$. Se define el **producto tensorial** entre v y w , denotado $\otimes$, como la matriz

$$M = v \otimes w = \begin{pmatrix} v^1 \\ v^2 \\ v^3 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} w^1 \\ w^2 \\ w^3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v^1 w^1 & v^1 w^2 & v^1 w^3 \\ v^2 w^1 & v^2 w^2 & v^2 w^3 \\ v^3 w^1 & v^3 w^2 & v^3 w^3 \end{pmatrix}.$$

Ejemplo 5.3.2. Sean $v = (1, -2, 3)^T$ y $w = (1, 1, 2)^T$; entonces

$$M = v \otimes w = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ -2 & -2 & -4 \\ 3 & 3 & 6 \end{pmatrix}.$$

El producto tensorial entre dos matrices de 3×1 genera una matriz de 3×3 ; como las matrices de 3×3 forman un espacio vectorial de dimensión $3 \times 3 = 9$, su base canónica debe contener 9 matrices linealmente independientes, dadas por

$$e_{ij} = (\text{matriz con un 1 en la fila } i, \text{ columna } j, \text{ y 0 en el resto}), \quad i, j = 1, 2, 3.$$

Cualquier matriz M de 3×3 se escribe entonces como combinación lineal de estas 9 matrices base. Reescribiendo el producto tensorial (11) en esta base:

$$M = v \otimes w = v^1 w^1 e_{11} + v^1 w^2 e_{12} + \cdots + v^3 w^3 e_{33} = v^i w^j e_{ij} \quad (\text{convención de Einstein}).$$

Por otro lado, M se escribe en términos de la misma base como $M = M^{ij} e_{ij}$, donde M^{ij} es la componente de M en la base $\{e_{ij}\}$. Comparando ambas expresiones,

$$M^{ij} = v^i w^j.$$

Observación 5.3.3. No todas las matrices de 3×3 se pueden escribir en la forma $M^{ij} = v^i w^j$: por ejemplo, la matriz $\begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ no admite vectores v, w tales que $M = v \otimes w$. Sin embargo, **todas** las matrices de 3×3 , deriven o no de un producto tensorial, se pueden escribir en la base $\{e_{ij}\}$; esta forma general es la que se generaliza a continuación.

5.3.2. Producto tensorial de espacios vectoriales genéricos

El producto tensorial es un producto lineal:

$$v \otimes (w + u) = v \otimes w + v \otimes u, \quad (w + u) \otimes v = w \otimes v + u \otimes v.$$

Para $v, w \in V(n, K)$, el producto tensorial se escribe entonces

$$M = v \otimes w = v^i \vec{e}_i \otimes w^j \vec{e}_j = v^i w^j \vec{e}_i \otimes \vec{e}_j = M^{ij} \vec{e}_i \otimes \vec{e}_j, \quad M^{ij} = v^i w^j,$$

y, comparando con el caso de matrices columna, se concluye que

$$e_{ij} = \vec{e}_i \otimes \vec{e}_j, \quad i, j = 1, \dots, n.$$

Definición 5.3.4 (Componente irreducible). La componente M^{ij} de la matriz M se dice **irreducible** si *no* se puede escribir en la forma $M^{ij} = v^i w^j$, es decir, si $M \neq v \otimes w$.

Definición 5.3.5 (Espacio $V(n, K) \otimes V(n, K)$). Se define el espacio vectorial $V(n, K) \otimes V(n, K)$, con base $\{\vec{e}_i \otimes \vec{e}_j\}_{i,j=1}^n$, tal que un vector T de este espacio se escribe como

$$T = T^{ij} \vec{e}_i \otimes \vec{e}_j,$$

con T^{ij} la componente de T en la base elegida.

Bajo una transformación de coordenadas $x'^i = x'^i(x^j)$, la base $\{\vec{e}_i\}$ transforma como $\vec{e}'_i = (\partial x^j / \partial x'^i) \vec{e}_j$. Un vector $T \in V(n, K) \otimes V(n, K)$ escrito en los sistemas Ox^i y $O'x'^i$ debe satisfacer el **principio de covariancia**, $T|_{O'} = T|_O$:

Proposición 5.3.6. Bajo la transformación de coordenadas $x'^i = x'^i(x^j)$, la componente de un vector $T \in V(n, K) \otimes V(n, K)$ transforma como

$$T'^{ij} = \frac{\partial x'^i}{\partial x^k} \frac{\partial x^j}{\partial x'^l} T^{kl}.$$

Es decir, T'^{ij} es un tensor de orden $(2, 0)$.

Demostración. De $T^{ij} \vec{e}_i \otimes \vec{e}_j = T'^{kl} \vec{e}'_k \otimes \vec{e}'_l = T'^{kl} \frac{\partial x^i}{\partial x'^k} \frac{\partial x^j}{\partial x'^l} \vec{e}_i \otimes \vec{e}_j$ y la independencia lineal de la base $\{\vec{e}_i \otimes \vec{e}_j\}$, se obtiene

$$T^{ij} = \frac{\partial x^i}{\partial x'^k} \frac{\partial x^j}{\partial x'^l} T'^{kl},$$

de donde, despejando T'^{ij} (transformación inversa), se sigue el resultado. $\square$

5.3.3. Generalización a tensores de orden $(p, 0)$

Definición 5.3.7. Se define el espacio vectorial $\underbrace{V(n, K) \otimes \dots \otimes V(n, K)}_{p \text{ veces}}$, con base $\{\vec{e}_{i_1} \otimes \dots \otimes \vec{e}_{i_p}\}_{i_1, \dots, i_p=1}^n$, tal que un vector T de este espacio se escribe

$$T = T^{i_1 i_2 \dots i_p} \vec{e}_{i_1} \otimes \vec{e}_{i_2} \otimes \dots \otimes \vec{e}_{i_p}.$$

Proposición 5.3.8. Bajo $x'^i = x'^i(x^j)$, la componente $T^{i_1 \dots i_p}$ transforma como

$$T'^{i_1 i_2 \dots i_p} = \frac{\partial x'^{i_1}}{\partial x^{j_1}} \frac{\partial x'^{i_2}}{\partial x^{j_2}} \dots \frac{\partial x'^{i_p}}{\partial x^{j_p}} T^{j_1 j_2 \dots j_p}.$$

Definición 5.3.9 (Tensor contravariante de orden p). La cantidad $T^{i_1 \dots i_p}$ se dice un **tensor contravariante de orden p** , o tensor de orden $(p, 0)$, si bajo una transformación de coordenadas transforma como en la proposición anterior. Su ley de transformación contiene p matrices $\partial x'^i / \partial x^j$ de forma homogénea (todas del mismo tipo).

5.3.4. Generalización a tensores de orden $(0, q)$

De manera análoga, usando el espacio vectorial dual $V^*(n, K)$: para $V, W \in V^*(n, K)$,

$$T = V \otimes W = V_i E^i \otimes W_j E^j = V_i W_j E^i \otimes E^j =: T_{ij} E^i \otimes E^j, \quad T_{ij} = V_i W_j.$$

Nótese que $T \notin V^*(n, K)$, sino que pertenece a un nuevo espacio vectorial dual, y en general $T_{ij} \neq V_i W_j$ para un tensor arbitrario.

Definición 5.3.10. Se define el espacio vectorial $\underbrace{V^*(n, K) \otimes \dots \otimes V^*(n, K)}_{q \text{ veces}}$, con base $\{E^{i_1} \otimes \dots \otimes E^{i_q}\}_{i_1, \dots, i_q=1}^n$, tal que T en este espacio se escribe

$$T = T_{i_1 i_2 \dots i_q} E^{i_1} \otimes E^{i_2} \otimes \dots \otimes E^{i_q}.$$

Proposición 5.3.11. Bajo $x'^i = x'^i(x^j)$, la componente $T_{i_1 \dots i_q}$ transforma como

$$T'_{i_1 i_2 \dots i_q} = \frac{\partial x^{j_1}}{\partial x'^{i_1}} \frac{\partial x^{j_2}}{\partial x'^{i_2}} \dots \frac{\partial x^{j_q}}{\partial x'^{i_q}} T_{j_1 j_2 \dots j_q}.$$

Definición 5.3.12 (Tensor covariante de orden q). La cantidad $T_{i_1 \dots i_q}$ se dice un **tensor covariante de orden q** , o tensor de orden $(0, q)$, si transforma como en la proposición anterior; su ley de transformación contiene q matrices $\partial x^j / \partial x'^i$ de forma homogénea.

Puesto que $V^*(n, K) \otimes \dots \otimes V^*(n, K)$ (con q factores) es un espacio vectorial dual, actúa sobre $V(n, K) \otimes \dots \otimes V(n, K)$ (p factores, con $p = q$, sin índices libres): si $V \in V(n, K)^{\otimes q}$ y $T \in V^*(n, K)^{\otimes q}$,

$$T(V) = T_{i_1 \dots i_q} V^{i_1 \dots i_q} \in K.$$

5.3.5. Generalización a tensores de orden $(1, 1)$ y (p, q)

Para $V \in V(n, K)$ y $W \in V^*(n, K)$,

$$T = V \otimes W = V^i \vec{e}_i \otimes W_j E^j = V^i W_j \vec{e}_i \otimes E^j =: T^i_j \vec{e}_i \otimes E^j, \quad T^i_j = V^i W_j,$$

donde T pertenece a un nuevo **espacio vectorial mixto** $V(n, K) \otimes V^*(n, K)$ (en general $T^i_j \neq V^i W_j$).

Proposición 5.3.13. Si $T \in V(n, K) \otimes V^*(n, K)$, entonces bajo $x'^i = x'^i(x^j)$ la componente T^i_j transforma como

$$T'^i_j = \frac{\partial x'^i}{\partial x^k} \frac{\partial x^l}{\partial x'^j} T^k_l.$$

Definición 5.3.14 (Tensor de orden $(1, 1)$). La cantidad T^i_j se dice un tensor de orden $(1, 1)$ (contravariante de orden uno y covariante de orden uno) si transforma como en la proposición anterior.

Observación 5.3.15. El espacio mixto se escribe convencionalmente $V(n, K) \otimes V^*(n, K)$ y no al revés: como $V^*(n, K)$ es un espacio de funcionales lineales que actúan sobre $V(n, K)$, escribir $V^*(n, K) \otimes V(n, K)$ podría sugerir erróneamente que el dual actúa sobre el factor $V(n, K)$. (Alguna literatura usa el orden opuesto; no debe generar confusión.) En la ley de transformación de un tensor $(1, 1)$ aparecen ambos tipos de matrices, $\partial x'^i / \partial x^j$ y $\partial x^j / \partial x'^i$, pero *no* contraídas entre sí, pues actúan sobre índices distintos.

La generalización a un tensor de orden (p, q) arbitrario es directa:

Definición 5.3.16 (Tensor de orden (p, q)). Se define el espacio vectorial

$$\underbrace{V(n, K) \otimes \cdots \otimes V(n, K)}_{p \text{ veces}} \otimes \underbrace{V^*(n, K) \otimes \cdots \otimes V^*(n, K)}_{q \text{ veces}},$$

con base $\{\vec{e}_{i_1} \otimes \cdots \otimes \vec{e}_{i_p} \otimes E^{j_1} \otimes \cdots \otimes E^{j_q}\}$, tal que T en este espacio se escribe

$$T = T^{i_1 \dots i_p}_{j_1 \dots j_q} \vec{e}_{i_1} \otimes \cdots \otimes \vec{e}_{i_p} \otimes E^{j_1} \otimes \cdots \otimes E^{j_q}.$$

La cantidad $T^{i_1 \dots i_p}_{j_1 \dots j_q}$ se dice un **tensor de orden** (p, q) (contravariante de orden p y covariante de orden q) si bajo $x'^i = x'^i(x^j)$ transforma como

$$T^{i_1 \dots i_p}_{j_1 \dots j_q} = \frac{\partial x'^{i_1}}{\partial x^{k_1}} \cdots \frac{\partial x'^{i_p}}{\partial x^{k_p}} \frac{\partial x^{l_1}}{\partial x'^{j_1}} \cdots \frac{\partial x^{l_q}}{\partial x'^{j_q}} T^{k_1 \dots k_p}_{l_1 \dots l_q},$$

con p matrices $\partial x'^i / \partial x^j$ y q matrices $\partial x^j / \partial x'^i$.

Observación 5.3.17 (Definición cualitativa). Un tensor es una entidad algebraica de varias componentes que generaliza los conceptos de escalar, vector y matriz de forma independiente del sistema de coordenadas elegido: es **invariante en forma** ante un cambio de coordenadas, $T|_O = T|_{O'}$.

5.4. Subir y bajar índices en tensores generales

La métrica, al actuar sobre un tensor de orden $(0, p)$ (o, en general, sobre cualquier índice contravariante de un tensor de orden (p, q)), genera la cantidad

$$T^{i_1 \dots i_{s-1}}_{i_{s+1} \dots i_p j} = g_{jk} T^{i_1 \dots i_{s-1} k i_{s+1} \dots i_p},$$

que es un tensor de orden $(p-1, 1)$ (se “bajó” un índice). En general se pueden bajar r índices con r métricas:

$$T^{i_1 \dots i_s}_{i_{s+r+1} \dots i_p k_1 \dots k_r} = g_{k_1 j_1} \cdots g_{k_r j_r} T^{i_1 \dots i_s j_1 \dots j_r i_{s+r+1} \dots i_p},$$

que es un tensor de orden $(p-r, r)$. De modo análogo, la métrica inversa permite **subir** r índices covariantes de un tensor de orden $(0, q)$, obteniendo un tensor de orden $(r, q-r)$.

5.4.1. Los símbolos de Christoffel

Definición 5.4.1 (Símbolos de Christoffel). Los **símbolos de Christoffel** Γ^k_{ij} se definen a través de la derivada de la base coordenada,

$$\frac{\partial \vec{e}_i}{\partial x^j} = \Gamma^k_{ij} \vec{e}_k.$$

Miden el cambio de dirección (y de magnitud) de los vectores base al ser trasladados a lo largo de curvas del espacio.

Proposición 5.4.2. Bajo la transformación de coordenadas $x'^i = x'^i(x^j)$, los símbolos de Christoffel transfor-

man como

$$\Gamma'_{ij}{}^k = \frac{\partial x'^k}{\partial x^m} \frac{\partial x^l}{\partial x'^i} \frac{\partial x^n}{\partial x'^j} \Gamma_{ln}^m + \frac{\partial x'^k}{\partial x^m} \frac{\partial^2 x^m}{\partial x'^i \partial x'^j}.$$

Observación 5.4.3. Los símbolos de Christoffel **no son un tensor**: su ley de transformación contiene el término inhomogéneo $(\partial x'^k / \partial x^m)(\partial^2 x^m / \partial x'^i \partial x'^j)$, que depende del sistema de coordenadas, mientras que los tensores, al ser covariantes, no dependen de él. Si los símbolos de Christoffel fueran un tensor, transformarían únicamente con el primer término (homogéneo), $\Gamma'_{ij}{}^k = (\partial x'^k / \partial x^m)(\partial x^l / \partial x'^i)(\partial x^n / \partial x'^j)\Gamma_{ln}^m$. El primer término (homogéneo) mide el cambio *covariante* de los vectores base al ser trasladados, lo cual no depende del sistema coordenado sino del tipo de espacio (curvo o plano) en el que se trasladan. El segundo término (inhomogéneo) mide el cambio de los vectores base al ser trasladados sobre líneas coordenadas curvas, y sí depende del sistema coordenado elegido.

5.5. Operaciones con tensores

Los tensores viven en espacios vectoriales, por lo que satisfacen las operaciones propias de un espacio vectorial.

Definición 5.5.1 (Suma). Sean $V_{j_1 \dots j_q}^{i_1 \dots i_p}$ y $W_{j_1 \dots j_q}^{i_1 \dots i_p}$ dos tensores del mismo orden (p, q) (por homogeneidad, deben serlo). Se define la suma

$$T_{j_1 \dots j_q}^{i_1 \dots i_p} = \alpha V_{j_1 \dots j_q}^{i_1 \dots i_p} + \beta W_{j_1 \dots j_q}^{i_1 \dots i_p}, \quad \alpha, \beta \in K.$$

Definición 5.5.2 (Producto tensorial). El producto tensorial entre un tensor $V_{j_1 \dots j_q}^{i_1 \dots i_p}$ de orden (p, q) y un tensor $W_{j_1 \dots j_{q'}}^{i_1 \dots i_{p'}}$ de orden (p', q') se define como

$$M_{j_1 \dots j_{q+q'}}^{i_1 \dots i_{p+p'}} = V_{j_1 \dots j_q}^{i_1 \dots i_p} W_{j_{q+1} \dots j_{q+q'}}^{i_{p+1} \dots i_{p+p'}}.$$

Proposición 5.5.3. El producto tensorial de un tensor de orden (p, q) con uno de orden (p', q') es un tensor de orden $(p + p', q + q')$.

Por lo tanto, el producto tensorial permite **construir tensores de mayor orden**. La operación complementaria, llamada **contracción**, permite construir tensores de **menor orden**.

Ejemplo 5.5.4. Sea el tensor K_{jl}^i . Sumando (contrayendo) los índices i y l ,

$$K_{jl}^l \quad (\text{convención de Einstein: suma sobre } l),$$

se obtiene una cantidad con un solo índice libre, j .

Proposición 5.5.5. Sea el tensor K_{jl}^i de orden $(1, 2)$; la contracción K_{jl}^l es un tensor de orden $(0, 1)$.

Definición 5.5.6 (Contracción). La **contracción** consiste en poner bajo la operación de suma la misma cantidad de índices contravariantes y covariantes.

Proposición 5.5.7. Sea $V_{j_1 \dots j_q}^{i_1 \dots i_p}$ un tensor de orden (p, q) . Efectuando una contracción de r índices contravariantes con r índices covariantes ($r < \min\{p, q\}$),

$$V_{j_1 \dots j_s k_1 \dots k_r j_{s+r+1} \dots j_q}^{i_1 \dots i_s k_1 \dots k_r i_{s+r+1} \dots i_p},$$

se obtiene un tensor de orden $(p - r, q - r)$.

Observación 5.5.8. Si se desea contraer dos índices de la misma naturaleza (por ejemplo, dos índices covariantes j, k del tensor T_{ijk}), esto no cumple la definición de contracción directamente. La solución es subir uno de los dos índices con la métrica inversa antes de contraer:

$$T_i{}^k = g^{kl} T_{ijl} \delta_{(.)}^j \longrightarrow \text{primero } T_{ij}{}^k = g^{kl} T_{ijl}, \text{ luego se contrae } i \text{ con } k.$$

5.6. Simetrías

Definición 5.6.1 (Tensor simétrico). Un tensor se dice **simétrico** si bajo el intercambio de dos índices el tensor no cambia:

$$T^{\dots i \dots j \dots} = +T^{\dots j \dots i \dots}, \quad T_{\dots i \dots j \dots} = +T_{\dots j \dots i \dots}.$$

Ejemplo 5.6.2. La métrica y la métrica inversa son simétricas: $g_{ij} = g_{ji}$, $g^{ij} = g^{ji}$.

Observación 5.6.3. La simetría de un tensor afecta el número de componentes independientes. Por ejemplo, la métrica g_{ij} posee, en principio, $n \times n = n^2$ componentes, pero al ser simétrica solo tiene $n(n+1)/2$ componentes independientes.

Proposición 5.6.4. Un tensor de orden $(p, 0)$, $T^{i_1 \dots i_p}$, posee en principio n^p componentes independientes. Si dos de sus índices son simétricos,

$$T^{i_1 \dots j \dots k \dots i_p} = +T^{i_1 \dots k \dots j \dots i_p},$$

el número de componentes independientes se reduce a

$$n^{p-2} \times \frac{n(n+1)}{2} = \frac{1}{2} n^{p-1} (n+1).$$

La misma conclusión se obtiene para tensores de orden $(0, q)$.

Definición 5.6.5 (Tensor antisimétrico). Un tensor se dice **antisimétrico** si bajo el intercambio de dos índices el tensor cambia de signo:

$$T^{\dots i \dots j \dots} = -T^{\dots j \dots i \dots}, \quad T_{\dots i \dots j \dots} = -T_{\dots j \dots i \dots}.$$

Proposición 5.6.6. Un tensor de orden $(2, 0)$ antisimétrico, $T^{ij} = -T^{ji}$, en un espacio plano de n dimensiones posee $n(n-1)/2$ componentes independientes (en vez de n^2). En general, para un tensor de orden $(p, 0)$ con dos índices antisimétricos,

$$n^{p-2} \times \frac{n(n-1)}{2} = \frac{1}{2} n^{p-1} (n-1).$$

La misma conclusión se obtiene para tensores de orden $(0, q)$.

Proposición 5.6.7. Un tensor antisimétrico posee ceros en los índices que se repiten: $T^{\dots i \dots i \dots} = 0$ (sin suma).

Demostración. Haciendo $i = j$ en la definición de antisimetría (sin sumar sobre i), $T^{\dots i \dots i \dots} = -T^{\dots i \dots i \dots}$, de donde $T^{\dots i \dots i \dots} = 0$. $\square$

Definición 5.6.8 (Descomposición simétrica-antisimétrica). Dado un tensor T^{ij} , siempre es posible construir su parte simétrica y antisimétrica:

$$T^{(ij)} := \frac{1}{2} (T^{ij} + T^{ji}) = T^{(ji)}, \quad T^{[ij]} := \frac{1}{2} (T^{ij} - T^{ji}) = -T^{[ji]}.$$

El factor $1/2$ evita contar dos veces. Lo mismo se aplica a T_{ij} .

Proposición 5.6.9. Todo tensor T^{ij} (o T_{ij}) se descompone como

$$T^{ij} = T^{(ij)} + T^{[ij]}.$$

Proposición 5.6.10. Si A^{ij} es simétrico y B_{ij} es antisimétrico, entonces $A^{ij}B_{ij} = 0$.

Proposición 5.6.11. Si A^{ij} es antisimétrico y B_{ij} es un tensor cualquiera, entonces $A^{ij}B_{ij} = A^{ij}B_{[ij]}$.

Ejemplo 5.6.12. Sea T^{jkl}_i ; formemos sus partes simétrica y antisimétrica en los índices i, k . Como i es covariante y k contravariante, son de distinta naturaleza y deben igualarse antes de (anti)simetrizar. Subiendo i con la métrica inversa, $T^{ijkl} = g^{in}T^{jkl}_n$:

$$\begin{aligned} T^{(i|j|k)l} &= \frac{1}{2} (T^{ijkl} + T^{kjil}) = \frac{1}{2} (g^{in}T^{jkl}_n + g^{kn}T^{jil}_n) = g^{n(i|}T^{j|k)l}_n, \\ T^{[i|j|k]l} &= \frac{1}{2} (T^{ijkl} - T^{kjil}) = g^{n[i|}T^{j|k]l}_n, \end{aligned}$$

donde las barras verticales indican que el índice j queda excluido de la (anti)simetrización. Alternativamente, bajando el índice k con la métrica g_{ij} se obtiene la descomposición equivalente $T^{j \quad l}_{(i \quad k)}, T^{j \quad l}_{[i \quad k]}$.

Definición 5.6.13 (Tensor completamente antisimétrico). Un tensor se dice **completamente antisimétrico** si cambia de signo bajo cualquier permutación de un par de índices.

El caso completamente antisimétrico es de particular interés (más que el completamente simétrico). Para un tensor de orden $(0, q)$ completamente antisimétrico, $T_{i_1 i_2 \dots i_q}$, el número de componentes independientes es

$$\binom{n}{q} = \frac{n!}{q!(n-q)!}.$$

Observación 5.6.14. Si $q > n$ (más índices que dimensiones), entonces $\binom{n}{q} = 0$: el tensor es idénticamente nulo, pues los índices deben repetirse obligatoriamente y, como vimos, los índices repetidos anulan un tensor completamente antisimétrico.

Si $q = n$, el tensor completamente antisimétrico posee $\binom{n}{n} = 1$ componente independiente.

5.6.1. El símbolo de Levi-Civita

Ejemplo 5.6.15 (Caso $n = 2$). El tensor T_{ij} completamente antisimétrico en 2 dimensiones, $T_{ij} = -T_{ji}$, se escribe

$$T_{ij} = \begin{pmatrix} 0 & T_{12} \\ -T_{12} & 0 \end{pmatrix} = T_{12} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = T_{12} \epsilon_{ij},$$

posee una sola componente independiente T_{12} . Se define

$$\epsilon_{ij} = \begin{cases} +1, & (ij) = (12) \\ -1, & (ij) = (21) \\ 0, & i = j \end{cases}$$

llamado **símbolo de Levi-Civita** en dos dimensiones.

Observación 5.6.16. El símbolo de Levi-Civita **no** es un tensor de orden $(0, 2)$, sino una *densidad tensorial* de orden $(0, 2)$ y peso -1 .

Ejemplo 5.6.17 (Caso $n = 3$). El tensor totalmente antisimétrico T_{ijk} en tres dimensiones posee una única componente independiente T_{123} , tal que

$$T_{ijk} = T_{123} \epsilon_{ijk},$$

donde ϵ_{ijk} es el símbolo de Levi-Civita en tres dimensiones,

$$\epsilon_{ijk} = \begin{cases} +1, & (ijk) \text{ permutación par de } (123) \\ -1, & (ijk) \text{ permutación impar de } (123) \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Por ejemplo, $\epsilon_{213} = -\epsilon_{123} = -1$, $\epsilon_{132} = -\epsilon_{123} = -1$, $\epsilon_{312} = -\epsilon_{132} = +1$. Los signos, usando índices simbólicos ijk en vez de 123, se obtienen por **permutación cíclica**: por ejemplo, $\epsilon_{jik} = -\epsilon_{ijk}$, $\epsilon_{ikj} = -\epsilon_{ijk}$, $\epsilon_{kji} = -\epsilon_{ijk}$, $\epsilon_{jki} = \epsilon_{ijk}$, $\epsilon_{ikj} = \epsilon_{ijk}$.

Las propiedades siguientes se establecen en un sistema coordenado cartesiano de un espacio plano, donde $g_{ij} = \delta_{ij}$.

Proposición 5.6.18. El símbolo de Levi-Civita ϵ_{ijk} se puede escribir como

$$\epsilon_{ijk} = \det \begin{pmatrix} \delta_{i1} & \delta_{i2} & \delta_{i3} \\ \delta_{j1} & \delta_{j2} & \delta_{j3} \\ \delta_{k1} & \delta_{k2} & \delta_{k3} \end{pmatrix},$$

y satisface

$$\epsilon_{ijk}\epsilon_{lmn} = \det \begin{pmatrix} \delta_{il} & \delta_{im} & \delta_{in} \\ \delta_{jl} & \delta_{jm} & \delta_{jn} \\ \delta_{kl} & \delta_{km} & \delta_{kn} \end{pmatrix}, \quad \epsilon_{ijk}\epsilon_{lmk} = \delta_{il}\delta_{jm} - \delta_{im}\delta_{jl}, \quad \epsilon_{ijk}\epsilon_{ljk} = 2\delta_{il}.$$

Proposición 5.6.19. El determinante de un tensor A^{ij} se puede escribir como

$$\det(A^{ij}) = \epsilon_{ijk} A^{i1} A^{j2} A^{k3} = \frac{1}{3!} \epsilon_{ijk}\epsilon_{lmn} A^{il} A^{jm} A^{kn}.$$

5.7. Producto vectorial

La base canónica $\{\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}\}$ de $\mathbb{R}^3$ satisface $\hat{i} \times \hat{j} = \hat{k}$, $\hat{i} \times \hat{k} = -\hat{j}$, $\hat{j} \times \hat{k} = \hat{i}$. Escribiendo $\vec{e}_1 = \hat{i}$, $\vec{e}_2 = \hat{j}$, $\vec{e}_3 = \hat{k}$, esta álgebra se resume como

$$\vec{e}_i \times \vec{e}_j = \epsilon_{ijk} \vec{e}_k.$$

Proposición 5.7.1. El producto cruz entre $\vec{A}$ y $\vec{B}$, $\vec{C} = \vec{A} \times \vec{B}$, se escribe en notación de índices como

$$C^i = \epsilon^{ijk} A_j B_k.$$

Demostración.

$$\vec{C} = \vec{A} \times \vec{B} = A^i \vec{e}_i \times B^j \vec{e}_j = A^i B^j \vec{e}_i \times \vec{e}_j = A^i B^j \epsilon_{ijk} \vec{e}_k = \epsilon_{jki} A^j B^k \vec{e}_i = \epsilon_{ijk} A^j B^k \vec{e}_i,$$

usando la simetría cíclica $\epsilon_{jki} = \epsilon_{ijk}$. Comparando con $\vec{C} = C^i \vec{e}_i$, se concluye $C^i = \epsilon^{ijk} A_j B_k$ (en cartesianas, $\epsilon^{ijk} = \epsilon_{ijk}$ e índices arriba/abajo son intercambiables). $\square$

Ejemplo 5.7.2. Desarrollando explícitamente para $i = 1, 2, 3$ (usando $\epsilon_{1jk}, \epsilon_{2jk}, \epsilon_{3jk}$ y anulando los términos con índices repetidos) se recupera la fórmula usual del producto cruz:

$$C^1 = A^2 B^3 - A^3 B^2, \quad C^2 = A^3 B^1 - A^1 B^3, \quad C^3 = A^1 B^2 - A^2 B^1.$$

Proposición 5.7.3. El vector $\vec{C} = \vec{A} \times \vec{B}$ es perpendicular a $\vec{A}$ y a $\vec{B}$.

Demostración. Calculemos $\vec{C} \cdot \vec{A} = C^i A_i = \epsilon^{ijk} A_j B_k A_i = \epsilon^{ijk} A_i A_j B_k$. Definiendo el tensor simétrico $T^{ij} = A^i A^j = A^j A^i = T^{ji}$,

$$\vec{C} \cdot \vec{A} = \epsilon^{ijk} T^{ij} B_k.$$

Por ser T^{ij} simétrico y ϵ^{ijk} antisimétrico en (i, j) , esta contracción se anula (Proposición sobre $A^{ij} B_{ij} = 0$ para A simétrico y B antisimétrico):

$$\epsilon^{ijk} T^{ij} B_k = -\epsilon^{jik} T^{ij} B_k = -\epsilon^{ijk} T^{ji} B_k = -\epsilon^{ijk} T^{ij} B_k \Rightarrow \vec{C} \cdot \vec{A} = 0.$$

La misma conclusión se obtiene para $\vec{C} \cdot \vec{B} = 0$. □

Se sigue que $\vec{A} \times \vec{B}$ es perpendicular al plano que contienen $\vec{A}$ y $\vec{B}$, y por lo tanto todo vector contenido en dicho plano es perpendicular a $\vec{A} \times \vec{B}$: en efecto, todo vector $\vec{D}$ del plano generado por $\vec{A}$ y $\vec{B}$ se escribe

$$\vec{D} = \frac{D}{\sin(\theta_1 + \theta_2)} (\sin \theta_2 \hat{A} + \sin \theta_1 \hat{B}),$$

con $D = \|\vec{D}\|$, $\hat{A} = \vec{A}/A$, $\hat{B} = \vec{B}/B$, de donde $\vec{D} \cdot \vec{C} = 0$ directamente.

Proposición 5.7.4. Si $\vec{A}, \vec{B}, \vec{C}$ están contenidos en un plano, entonces $\epsilon_{ijk} A^i B^j C^k = 0$. Si son no coplanares, el volumen que forman es

$$V = \epsilon_{ijk} A^i B^j C^k.$$

Proposición 5.7.5. La norma de $\vec{C} = \vec{A} \times \vec{B}$ es

$$\|\vec{C}\| = \|\vec{A}\| \|\vec{B}\| \sin \theta,$$

donde θ es el ángulo entre $\vec{A}$ y $\vec{B}$.

Demostración.

$$\begin{aligned} \|\vec{C}\|^2 &= C^i C_i = \epsilon^{ijk} A_j B_k \epsilon_{inm} A^n B^m \\ &= (\delta_n^j \delta_m^k - \delta_m^j \delta_n^k) A_j B_k A^n B^m \\ &= A_j A^j B_k B^k - A_j B^j A^k B_k \\ &= \|\vec{A}\|^2 \|\vec{B}\|^2 - (\vec{A} \cdot \vec{B})^2, \end{aligned}$$

usando la identidad $\epsilon^{ijk} \epsilon_{inm} = \delta_n^j \delta_m^k - \delta_m^j \delta_n^k$. Como $\vec{A} \cdot \vec{B} = \|\vec{A}\| \|\vec{B}\| \cos \theta$,

$$\|\vec{C}\|^2 = \|\vec{A}\|^2 \|\vec{B}\|^2 (1 - \cos^2 \theta) = \|\vec{A}\|^2 \|\vec{B}\|^2 \sin^2 \theta \Rightarrow \|\vec{C}\| = \|\vec{A}\| \|\vec{B}\| \sin \theta. \quad \square$$

5.8. Derivada covariante

Sea $\vec{A}$ un vector escrito en la base coordenada Ox^i . Calculemos su derivada parcial $\partial_i := \partial/\partial x^i$:

$$\partial_i \vec{A} = \partial_i (A^j \vec{e}_j) = (\partial_i A^j) \vec{e}_j + A^j (\partial_i \vec{e}_j) = (\partial_i A^j) \vec{e}_j + A^j \Gamma_{ij}^k \vec{e}_k = \left(\partial_i A^j + \Gamma_{ik}^j A^k \right) \vec{e}_j,$$

donde se usó la definición de los símbolos de Christoffel y se renombraron índices mudos.

Definición 5.8.1 (Derivada covariante de un vector). Sea A^i un tensor de orden $(1, 0)$. Se define su **derivada covariante** como

$$\nabla_i A^j := \partial_i A^j + \Gamma_{ik}^j A^k.$$

Con esta definición, $\partial_i \vec{A} = \nabla_i A^j \vec{e}_j$: la derivada covariante $\nabla_i A^j$ reemplaza, en notación tensorial, a la derivada parcial $\partial_i A^j$.

Proposición 5.8.2. Si A^i es un tensor de orden $(1, 0)$, entonces $\nabla_i A^j$ es un tensor de orden $(1, 1)$.

Análogamente, para un vector dual $\vec{f} \in V^*(n, K)$,

$$\partial_i \vec{f} = \partial_i (f_j E^j) = (\partial_i f_j) E^j + f_j \partial_i E^j = (\partial_i f_j) E^j - f_k \Gamma_{ij}^k E^j = (\partial_i f_j - \Gamma_{ij}^k f_k) E^j,$$

donde se usó $\partial_i E^j = -\Gamma_{ik}^j E^k$ (consecuencia de derivar $E^i(e_j) = \delta_j^i$).

Definición 5.8.3 (Derivada covariante de un covector). Sea A_i un tensor de orden $(0, 1)$. Se define

$$\nabla_i A_j := \partial_i A_j - \Gamma_{ij}^k A_k.$$

Proposición 5.8.4. Si A_i es un tensor de orden $(0, 1)$, entonces $\nabla_i A_j$ es un tensor de orden $(0, 2)$.

Observación 5.8.5. Resumiendo: $\nabla_i A^j = \partial_i A^j + \Gamma_{ik}^j A^k$ (el índice arriba aparece con $+\Gamma$); $\nabla_i A_j = \partial_i A_j - \Gamma_{ij}^k A_k$ (el índice abajo aparece con $-\Gamma$).

Para un tensor mixto $A \in V(n, \mathbb{R}) \otimes V^*(n, \mathbb{R})$, un cálculo análogo (derivando $A = A^j_k \vec{e}_j \otimes E^k$ y usando las leyes de derivación de ambas bases) da

$$\partial_i A = \left(\partial_i A^j_k + \Gamma_{il}^j A^l_k - \Gamma_{ik}^l A^j_l \right) \vec{e}_j \otimes E^k.$$

Definición 5.8.6 (Derivada covariante de un tensor $(1, 1)$). Sea A^i_j un tensor de orden $(1, 1)$. Se define

$$\nabla_i A^j_k = \partial_i A^j_k + \Gamma_{il}^j A^l_k - \Gamma_{ik}^l A^j_l.$$

Proposición 5.8.7. Si A^i_j es un tensor de orden $(1, 1)$, entonces $\nabla_i A^j_k$ es un tensor de orden $(1, 2)$.

La generalización a tensores de orden (p, q) arbitrario es directa:

Definición 5.8.8 (Derivada covariante general). Sea $A^{i_1 \dots i_p}_{j_1 \dots j_q}$ un tensor de orden (p, q) . Se define su derivada covariante como

$$\nabla_i A^{j_1 \dots j_p}_{k_1 \dots k_q} = \partial_i A^{j_1 \dots j_p}_{k_1 \dots k_q} + \Gamma_{il}^{j_1} A^{l j_2 \dots j_p}_{k_1 \dots k_q} + \dots + \Gamma_{il}^{j_p} A^{j_1 \dots j_{p-1} l}_{k_1 \dots k_q} - \Gamma_{ik_1}^l A^{j_1 \dots j_p}_{l k_2 \dots k_q} - \dots - \Gamma_{ik_q}^l A^{j_1 \dots j_p}_{k_1 \dots k_{q-1} l}.$$

Proposición 5.8.9. Si $A^{i_1 \dots i_p}_{j_1 \dots j_q}$ es un tensor de orden (p, q) , entonces $\nabla_i A^{j_1 \dots j_p}_{k_1 \dots k_q}$ es un tensor de orden $(p, q+1)$.

Proposición 5.8.10 (Compatibilidad de la métrica). La métrica satisface

$$\nabla_i g_{jk} = 0.$$

5.9. El operador rotacional

Trabajando en coordenadas cartesianas y usando notación de índices, el operador rotacional se define como

$$\begin{aligned} \vec{B} &= \vec{\nabla} \times \vec{A} = E^i \partial_i \times (A^j \vec{e}_j) \\ &= \delta^{ik} \vec{e}_k \times [(\partial_i A^j) \vec{e}_j + A^j \partial_i \vec{e}_j] \\ &= \vec{e}_k \times (\partial_i A^j) \vec{e}_j = \partial_i A^j \vec{e}_i \times \vec{e}_j = \partial_i A^j \epsilon_{ijk} \vec{e}_k, \end{aligned}$$

donde el término $\partial_i \vec{e}_j$ se anula por trabajar en coordenadas cartesianas ($\Gamma_{ij}^k = 0$). Renombrando índices, $\partial_j A^k \epsilon_{kij} \vec{e}_i = \epsilon_{ijk} \partial_j A^k \vec{e}_i$, de donde, comparando con $\vec{B} = B^i \vec{e}_i$:

Proposición 5.9.1. En coordenadas cartesianas, el rotacional de $\vec{A}$ se escribe en notación de índices como

$$B^i = \epsilon^{ijk} \partial_j A^k.$$

5.10. Notación tensorial

A partir de aquí adoptamos la **notación tensorial**: se usan los tensores directamente, obviando los vectores base. La correspondencia es

Notación vectorial		Notación tensorial
$\vec{x}(x^i)$	$\longrightarrow$	x^i
$\vec{A}(x^i)$	$\longrightarrow$	$A^i(x^j)$
$\vec{A} \cdot \vec{B}$	$\longrightarrow$	$g_{ij} A^i B^j$
$\vec{\nabla}$	$\longrightarrow$	$\partial/\partial x^i =: \partial_i$
$\partial_i A^{j_1 \dots j_p}_{k_1 \dots k_q}$	$\longrightarrow$	$\nabla_i A^{j_1 \dots j_p}_{k_1 \dots k_q}$

Observación 5.10.1. En coordenadas cartesianas se recupera el caso particular

$$\{\vec{e}_i\}_{i=1}^3 = \{\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}\}, \quad g_{ij} = \delta_{ij}, \quad \Gamma_{ij}^k = 0, \quad \nabla_i = \partial_i.$$

5.11. Invariancia de la acción

Un sistema físico de f grados de libertad tiene asociado un principio de acción

$$S = \int_{t_i}^{t_f} L(q^i, \dot{q}^i, t) dt,$$

del cual se deducen las ecuaciones de movimiento usando el operador variacional,

$$\frac{\delta L}{\delta q^i} = \frac{\partial L}{\partial q^i} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} \right).$$

El fundamento del principio de acción es que S es un número real: se mapea una trayectoria en el espacio de configuración a un número real. Las ecuaciones de movimiento se obtienen exigiendo que S tenga un extremo sobre la curva que describe el movimiento físico del sistema.

Al cambiar de coordenadas, $q'^i = q'^i(q^j)$, el Lagrangiano cambiaría, en principio, su forma funcional:

$$S' = \int_{t_i}^{t_f} L'(q'^i, \dot{q}'^i, t) dt.$$

Sin embargo, la curva que extremiza la acción no cambia su forma física; solo cambian las ecuaciones (por el cambio de coordenadas) que la describen. Por lo tanto, el valor numérico de la acción no cambia, $S = S'$:

$$\int_{t_i}^{t_f} L(q^i, \dot{q}^i, t) dt = \int_{t_i}^{t_f} L'(q'^i, \dot{q}'^i, t) dt \implies L'(q'^i, \dot{q}'^i, t) = L(q^i, \dot{q}^i, t),$$

que es la definición del nuevo Lagrangiano L' : el Lagrangiano es un **escalar** bajo transformaciones de coordenadas.

Ejemplo 5.11.1. Consideremos el problema de fuerzas centrales conservativas, con Lagrangiano en coordenadas cartesianas

$$L(x, y, \dot{x}, \dot{y}) = \frac{1}{2} m (\dot{x}^2 + \dot{y}^2) - U(\sqrt{x^2 + y^2}).$$

Cambiando a coordenadas cilíndricas (con $z = 0$), $x = r \cos \varphi$, $y = r \sin \varphi$, se obtiene

$$L'(r, \varphi, \dot{r}, \dot{\varphi}) = \frac{1}{2}m \left[\left(\frac{d}{dt}(r \cos \varphi) \right)^2 + \left(\frac{d}{dt}(r \sin \varphi) \right)^2 \right] - U(r) = \frac{1}{2}m (\dot{r}^2 + r^2 \dot{\varphi}^2) - U(r).$$

En una transformación de coordenadas no solo cambia la función Lagrangiana, sino también la forma funcional de las ecuaciones de movimiento.

Proposición 5.11.2. *Bajo una transformación de coordenadas $q'^i = q'^i(q^j)$, las ecuaciones de movimiento cambian como*

$$\frac{\delta L'}{\delta q'^i} = \frac{\partial q^j}{\partial q'^i} \frac{\delta L}{\delta q^j}.$$

Es decir, las ecuaciones de movimiento $\delta L / \delta q^i$ forman un tensor de orden $(0, 1)$.