

Apunte único: Algoritmos y estructura de datos

Nad Garraz y comunidad (ojalá)
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
UBA

Choose your destiny:

(dobclick en los ejercicio para saltar)

- [Notas teóricas](#)

- Ejercicios de la guía:

- | | | |
|--------------------|--------------------|---------------------|
| 1. | 5. | 9. |
| 2. | 6. | 10. |
| 3. | 7. | 11. |
| 4. | 8. | 12. |

El repo en [github](#)  para descargar las guías con los últimos updates.



<https://github.com/nad-garraz/algo2>

La Guía 1 se actualizó por última vez: 25/08/24 @ 22:25

Guía 1



<https://github.com/nad-garraz/algo2/blob/main/1-guia/1-sol.pdf>

Si querés mandar un ejercicio o avisar de algún error, lo más fácil es por

[Telegram](#) .



<https://t.me/+aUVX41kTHlg1MGmX>

Notas teóricas:

Ejercicios de la guía:

Ejercicio 1 🤖... hay que hacerlo! 🤖

Si querés mandarlo: Telegram → 📧, o mejor aún si querés subirlo en L^AT_EX → 🐙.

Ejercicio 2 🤖... hay que hacerlo! 🤖

Si querés mandarlo: Telegram → 📧, o mejor aún si querés subirlo en L^AT_EX → 🐙.

Ejercicio 3 🤖... hay que hacerlo! 🤖

Si querés mandarlo: Telegram → 📧, o mejor aún si querés subirlo en L^AT_EX → 🐙.

Ejercicio 4 🤖... hay que hacerlo! 🤖

Si querés mandarlo: Telegram → 📧, o mejor aún si querés subirlo en L^AT_EX → 🐙.

Ejercicio 5 🤖... hay que hacerlo! 🤖

Si querés mandarlo: Telegram → 📧, o mejor aún si querés subirlo en L^AT_EX → 🐙.

Ejercicio 6 Asumiendo que el valor de b y c es verdadero, el de a es *falso* y el de x e y es indefinido, indicar cuáles de los operadores deben ser operadores "luego" para que la expresión no se indefina nunca:

- a) $(\neg x \vee b)$
- b) $((c \vee (y \wedge a)) \vee b)$
- c)
- d)
- e)
- f) $((c \vee y) \wedge (a \vee b)) \leftrightarrow (c \vee (y \wedge a) \vee b)$
- g)

-
- a) $(\neg x \vee b)$.

Tengo que evaluar de *izquierda a derecha* y se cortocircuita si el resultado de la fórmula es independiente de lo que resta leer. Cuando hay un disyunción con tener $x = F$, de manera que $\neg x = T$ ya puedo parar de evaluar. Pero si x está indefinida, no hay nada que pueda hacer.

- b) $((c \vee (y \wedge a)) \vee b)$
- c)
- d)

e)

f) Para que la disyunción seguro no se indefina, necesito que el primer predicado sea *verdadero* y la conjunción eso sucede si el primer predicado es *falso*.

$$\underbrace{((c \vee y) \wedge \overbrace{(a \vee b)}^T))}_{c \rightarrow T. \text{ No se indefina}} \leftrightarrow \overbrace{(c \vee \underbrace{(y \wedge a)}_{\perp} \vee b)}^{\text{¡necesito } \vee_L!}$$

g)

Ejercicio 7 Sean p, q y r tres variables de las que se sabe que:

- p y q nunca están indefinidas
- r se indefine sii q es *verdadera*

Proponer una fórmula que nunca se indefina, utilizando siempre las tres variables y que sea verdadera si y solo si se cumple que:

- | | |
|--|---|
| a) Al menos una es verdadera. | d) Solo p y q son verdaderas. |
| b) Ninguna es verdadera. | e) No todas al mismo tiempo son verdaderas. |
| c) Exactamente una de las tres es verdadera. | f) r es verdadera. |

- a) Al menos una es verdadera.

$$(p \vee q) \vee_L r$$

Preguntar por solución del apunte, pqr=100?

- b) Ninguna es verdadera. En este caso r no se indefine.

$$\neg(p \wedge q \wedge r)$$

Preguntar por solución del apunte, pqr=100?

- c) Exactamente una de las tres es verdadera.

$$(p \vee q) \vee_L r$$

- d) Solo p y q son verdaderas. r debe ser 0 cuando $q = 0$

$$(p \vee q) \vee_L \neg r$$

solo p y q ?

- e) No todas al mismo tiempo son verdaderas.

- f) r es verdadera. Preguntar por solución del apunte, pqr=100?

Ejercicio 8 Determinar, para cada aparición de variables, si dicha aparición se encuentra libre o ligada. En caso de estar ligada, aclarar a qué cuantificador lo está. En los casos en que sea posible, porponer valores para las variables libres de modo tal que las expresiones sean verdaderas.

a) $(\forall x : \mathbb{Z})(0 \leq x < n \rightarrow x + y = z)$

b) 😏... hay que hacerlo! 🤖

Si querés mandarlo: Telegram → 📧, o mejor aún si querés subirlo en L^AT_EX → 🐙.

c) 😏... hay que hacerlo! 🤖

Si querés mandarlo: Telegram → 📧, o mejor aún si querés subirlo en L^AT_EX → 🐙.

d) $(\forall j : \mathbb{Z})(j \leq 0 \rightarrow P(j)) \wedge P(j)$

a) $(\forall x : \mathbb{Z})(0 \leq x < n \rightarrow x + y = z)$

b) 😏... hay que hacerlo! 🤖

Si querés mandarlo: Telegram → 📧, o mejor aún si querés subirlo en L^AT_EX → 🐙.

c) 😏... hay que hacerlo! 🤖

Si querés mandarlo: Telegram → 📧, o mejor aún si querés subirlo en L^AT_EX → 🐙.

d) $(\forall j : \mathbb{Z})(j \leq 0 \rightarrow P(j)) \wedge P(j).$

Las **jotas** están ligadas al cuantificador universal, pero la **j** está libre.

Ejercicio 9 Sea $P(x : \mathbb{Z})$ y $Q(x : \mathbb{Z})$ dos predicados cualquiera. Explicar cuál es el error de traducción a fórmulas de los siguientes enunciados. Dar un ejemplo en el cuál sucede el problema y luego corregirlo.

a) "Todos los naturales menores a 10 cumplen P ":

$$(\forall i : \mathbb{Z})((0 \leq i < 10) \wedge P(i))$$

b) "Algún natural menor a 10 cumple P ":

$$(\exists i : \mathbb{Z})((0 \leq i < 10) \rightarrow P(i))$$

c) "Todos los naturales menores a 10 que cumplen P y Q ":

$$(\forall x : \mathbb{Z})((0 \leq x < 10) \rightarrow (P(x) \wedge Q(x)))$$

d) "No hay ningún natural menor a 10 que cumpla P y Q ":

$$(\forall x : \mathbb{Z})((0 \leq x < 10) \rightarrow (P(x) \wedge Q(x)))$$

a) "Todos los naturales menores a 10 cumplen P ":

$$(\forall i : \mathbb{Z}) \underbrace{((0 \leq i < 10) \wedge P(i))}_{R(i)} \leftrightarrow (\forall i : \mathbb{Z}) (R(i))$$

Como el cuantificador \forall generaliza la conjunción. Suponiendo que $P(i)$ **no se define**:

$$(\forall i : \mathbb{Z}) (R(i)) \leftrightarrow R(-N) \wedge R(-N+1) \wedge \dots \wedge R(0) \wedge \dots \wedge R(9) \wedge R(10) \wedge \dots \wedge R(N)$$

Obtengo un resultado donde sé que los $R(0), \dots, R(9)$ van a tener un valor *verdadero*, pero el resto de los $R(i)$ van a tener un valor de *falso*, ya que no cumplen $f(i)$.

Por lo tanto busco una solución para que esos $R(i)$ no sean moscas en mi sopa, con " \rightarrow " dado que:

$$\underbrace{\text{falso} \rightarrow}_{\text{verdadero}}$$

Entonces cambio ese \wedge por un \rightarrow_L , donde me aseguro de lidiar con potenciales indefiniciones de $P(i)$ que harían que todo explote:

$$(\forall i : \mathbb{Z}) \underbrace{((0 \leq i < 10) \rightarrow_L P(i))}_{S(i)} \leftrightarrow (\forall i : \mathbb{Z}) (S(i))$$

Ahora la situación es más feliz:

$$(\forall i : \mathbb{Z}) (S(i)) \leftrightarrow S(-N) \wedge S(-N+1) \wedge \dots \wedge S(0) \wedge \dots \wedge S(9) \wedge S(10) \wedge \dots \wedge S(N)$$

Todos los $S(i)$ son verdaderos y no se indefinen por el \rightarrow_L

b) "Algún natural menor a 10 cumple P ":

$$(\exists i : \mathbb{Z}) ((0 \leq i < 10) \rightarrow P(i))$$

c) "Todos los naturales menores a 10 que cumplen P y Q ":

$$(\forall x : \mathbb{Z}) ((0 \leq x < 10) \rightarrow (P(x) \wedge Q(x)))$$

d) "No hay ningún natural menor a 10 que cumpla P y Q ":

$$(\forall x : \mathbb{Z}) ((0 \leq x < 10) \rightarrow (P(x) \wedge Q(x)))$$

Propongo

$$(\forall x : \mathbb{Z}) \underbrace{((0 \leq x < 10))}_{f(x)} \rightarrow_L \underbrace{\neg(P(x) \wedge_L Q(x))}_{g(x)}$$

Con el \rightarrow_L mato los casos que no cumplen $f(x)$. Luego $g(x)$ solo toma valor *falso* cuando $P(x)$ y $Q(x)$ son ambas *verdadero*.

Ejercicio 10 Sean $P(x : \mathbb{Z})$ y $Q(x : \mathbb{Z})$ dos predicados que nunca se indefinen. Escribir al predicado asociado a cada uno de los siguientes enunciados:

- ☉₁ "Existe un único natural menor a 10 que cumple P "
- ☉₂ "Existen al menos dos números naturales menores a 10 que cumplen P "
- ☉₃ "Existen exactamente dos números naturales menores a 10 que cumplen P "
- ☉₄ "Todos los enteros pares que cumplen P , no cumplen Q "
- ☉₅ "Si un entero cumple P y es impar, no cumple Q "
- ☉₆ "Todos los enteros pares cumplen P , y todos los enteros impares que no cumplen P cumplen Q "
- ☉₇ "Si hay un número natural menor a 10 que no cumple P entonces ningún natural menor a 10 cumple Q ; y si todos los naturales menores a 10 cumplen P entonces hay al menos dos naturales menores a 10 que cumplen Q "

- ☉₁ "Existe un único natural menor a 10 que cumple P "

$$(\exists n : \mathbb{Z}) \left((0 \leq n < 10 \wedge P(n)) \wedge (\forall m : \mathbb{Z}) (0 \leq m < 10 \rightarrow (m = n \rightarrow P(m))) \right)$$

- ☉₂ "Existen al menos dos números naturales menores a 10 que cumplen P "

$$[\exists n : \mathbb{Z}] \underbrace{[0 \leq n < 10 \wedge P(n)]}_{f_1(n)} \wedge \overbrace{[\exists m : \mathbb{Z}] [0 \leq m < 10 \wedge P(m) \wedge m \neq n]}^{f_3} \underbrace{f_2(n, m)}$$

- ☉ El cuantificador existencial me generaliza la disyunción:

$$\dots \vee f_1(-N) \vee f_1(-N+1) \vee \dots \vee f_1(0) \vee \dots \vee f_1(9) \vee \dots \vee f_1(N-1) \vee f_1(N) \vee \dots$$

Los $f_1(n)$ azules, tienen valores de verdadero, para la primera condición de f_1 , los demás son falsos. Como tengo concatenación de disyunciones, con que una de las azules cumpla también $P(n)$, listo tengo un f_1 verdadero para algún n .

$$f_1(0) \vee \dots \vee f_1(9)$$

Esos valores son los que me sirven para calcular los valores de verdad que hay en $f_1 \wedge f_2$.

- ☉ Muy parecido ahora con f_2

$$\dots \vee f_2(-N, n) \vee f_2(-N+1, n) \vee \dots \vee f_2(0, n) \vee \dots \vee f_2(9, n) \vee \dots \vee f_2(N-1, n) \vee f_2(N, n) \vee \dots$$

Nuevamente alguno de los m , van a cumplir las condiciones $f_1(m, n)$

- ☉ Por lo tanto obtengo siempre valores verdaderos en la expresión final f_3 .

- ☉₃ "Existen exactamente dos números naturales menores a 10 que cumplen P "

- ☉₄ "Todos los enteros pares que cumplen P , no cumplen Q "

•₅ "Si un entero cumple P y es impar, no cumple Q "

$$(\forall n : \mathbb{Z}) ((P(n) \wedge n \bmod 2 \neq 0) \rightarrow \neg Q(n))$$

•₆ "Todos los enteros pares cumplen P , y todos los enteros impares que no cumplen P cumplen Q "

•₇ "Si hay un número natural menor a 10 que no cumple P entonces ningún natural menor a 10 cumple Q ; y si todos los naturales menores a 10 cumplen P entonces hay al menos dos naturales menores a 10 que cumplen Q "

Ejercicio 11 🙄... hay que hacerlo! 🤖

Si querés mandarlo: Telegram → 📧, o mejor aún si querés subirlo en L^AT_EX → 🐙.

Ejercicio 12 🙄... hay que hacerlo! 🤖

Si querés mandarlo: Telegram → 📧, o mejor aún si querés subirlo en L^AT_EX → 🐙.
