

المادة الفعالة والمجموعة الكيميائية	الأسماء التجارية	التوصيات والمعدلات	ملاحظات
فلوفينوكسورون م.ك: بنزويل يوريا	كليجرون (أجروكيم) $\frac{10\%}{DC}$ نوفو (سوليتز) $\frac{10\%}{DC}$ فلوكسيت (مصر للتنمية) $\frac{10\%}{DC}$ سيجرون (أجروكيم) $\frac{10\%}{EC}$ + كفا سبيرمثرين	يرقات حرشفية الأجنحة / بيض و يرقات وحوريات الأكاروسات بمعدل 80 سم ³ / 100 لتر	- ملامسة ومعدي. - حشري أكاروسي. - له نفس التأثير السابق. PHI: 3 - 10 أيام
بوبروفيزين م.ك: ثياديازين	أبلود (شوري) $\frac{25\%}{SC}$ بيبرولورد (UPL) $\frac{25\%}{SC}$	الذبابة البيضاء / الحشرة القشرية / البق النقي / المن / التربس / العنكبوت الأحمر بمعدل 100 - 150 سم ³ / 100 لتر	- ملامسة ومعدي. - له مفعول بخاري قوي. - يثبط تخليق الكيتين، فيمنع الانسلاخ بطريقة مختلفة عن المبيدات من مجموعة بنزويل يوريا. PHI: 3 أيام في الخضار 14 يوم في الفاكهة
سيرومازين م.ك: تريازين	تريجارد (سنجناتا) $\frac{75\%}{WP}$ تريجارد (سنجناتا) $\frac{10\%}{SL}$ تريغاب (فابكو) $\frac{75\%}{WP}$	مبيد متخصص في رتبة ثنائية الأجنحة (الذباب الحقيقي) صانعات انغلق (LIRIOMYZA SP.) بمعدل (تركيز 75%) رشاً 30 - 50 جم / 100 لتر حقناً 200 جم / فدان	- جهاز ينفث لأعلى فقط بالخشب. - يخترق الورقة للسطح السفلي رشاً. - منظم نمو حشري يحدث خلل في التوازن الهرموني للانسلاخ. PHI: 7 أيام
كروما فينوزايد م.ك: داي أسيل هيدرازين	فيرتو (أريستا) $\frac{5\%}{SC}$	يرقات حرشفية الأجنحة بمعدل 60 سم ³ / 100 لتر	- ملامسة ومعدي. - منظم نمو حشري يعمل على الارتباط بمستقبل هرمون الانسلاخ مما يؤدي لانسلاخ مبكر للحشرة. PHI: 7 أيام
ميثوكسي فينوزايد م.ك: داي أسيل هيدرازين	رانر (داو) $\frac{24\%}{SC}$ رانو (كاتزا) $\frac{24\%}{SC}$ أيهولد (داو) $\frac{36\%}{SC}$ 30% + 6% سبينتورام	يرقات حرشفية الأجنحة بمعدل 400 سم ³ / فدان	- ملامسة ومعدي. - له نفس التأثير السابق. PHI: 7 أيام

المادة الفعالة والمجموعة الكيميائية	الأسماء التجارية	التوصيات والمعدلات	ملاحظات
ميثافلوميرون م.ك: سيميكاربازون	ألفيردي (باسف) $\frac{24\%}{SC}$	يرقات حرشفية الأجنحة بمعدل 100 سم ³ / 100 لتر	- ملامسة ومعدي. - له نفس التأثير السابق. ولكن لوحظ عدم عبور صفة المقاومة مع الإندوكسكارب. PHI: 7 أيام
فيبرونيل م.ك: فينيل بيرازول	كوتش (شورى) $\frac{20\%}{SC}$ أشيليس (كيما) $\frac{5\%}{EC}$	المن / التبرس / نطاطات الأوراق / يرقات حرشفية الأجنحة / الخنافس / النمل الأبيض / سوسة النخيل الحمراء بمعدل (تركيز 20%) 25 سم ³ / 100 لتر	- ملامسة ومعدي. - له خواص جهازية ضعيفة. - يرتبط بمستقبل جابا في قنوات الكلوريد، ويغلقها. PHI: 10 أيام
كلورانترانيليبيرول م.ك: أنترانيليك داي أميد	كوراجين (نوبون) $\frac{20\%}{SC}$ فوليام فليكسي (سجنجتا) $\frac{40\%}{WG}$ 20% + 20% ثياميثوكسام فوليوم فليكسي (سجنجتا) $\frac{30\%}{SC}$ 10% + 20% ثياميثوكسام	الحشرات الثاقبة الماصة / يرقات حرشفية الأجنحة / خنافس غمدية الأجنحة بمعدل 60 سم ³ / فدان	- جهازية، ينتقل للأعلى فقط بالخشب. - يرتبط بمستقبل الريانودين في العضلات، مما يؤدي لانقباض العضلات والشلل والموت PHI: 3 - 14 يوم
سيانترانيليبيرول م.ك: أنترانيليك داي أميد	بنيفيا (دوبون) $\frac{10\%}{OD}$	الحشرات الثاقبة الماصة / يرقات حرشفية الأجنحة بمعدل 75 سم ³ / 100 لتر	- جهازية، ينتقل للأعلى فقط بالخشب. - له نفس التأثير السابق. PHI: 3 أيام
فلوبندياميد م.ك: بنزين داي كاربوكساميد	تاكومي (سامتريد) $\frac{20\%}{WG}$	يرقات حرشفية الأجنحة مثل (حفار ساق النزة ، دودة ورق القطن ، توتا أبسليوتا) بمعدل 40 - 50 جم / 100 لتر	- ملامسة ومعدي. - ينتقل خلال الورقة للسطح السفلي. - له نفس التأثير السابق. PHI: 7 أيام

المادة الفعالة والمجموعة الكيميائية	الأسماء التجارية	التوصيات والمعدلات	ملاحظات
بايفينثرين م.ك: البيرثرويدات	تليكام (كام) $\frac{25\%}{EC}$	المن / التريس / الذبابة البيضاء / البق الدقيقي / الحشرة القشرية / ديدان الثمار والأوراق / الأكاروسات بمعدل 50 سم ³ / 100 لتر الدودة القارضة طعم سام بمعدل 200 سم ³ / فدان	- ملامسة ومعدي. - حشري أكاروسي. - له نفس التأثير السابق. PHI: 7 أيام في الخضار 21 يوم في الفاكهة
اس فينفليرات م.ك: البيرثرويدات	سومي ألفا كزرد (كفر) الزيات $\frac{5\%}{EC}$ سومي جولد كزرد (كفر) الزيات $\frac{20\%}{EC}$	المن / التريس / الذبابة البيضاء / نطاطات الأوراق / الخنافس / ثقبات الذرة / صانعات الأنفاق / ديدان الثمار بمعدل (تركيز 5%) 20 - 40 سم ³ / 100 لتر	- ملامسة ومعدي. - له نفس التأثير السابق. PHI: 10 أيام في الخضار 21 يوم في الفاكهة
ميثوميل م.ك: الكاربامات	جولدين (شوري) $\frac{90\%}{SP}$ نيوميل (كفر الزيات) $\frac{90\%}{SP}$ ديراكوميل (كثرا) $\frac{90\%}{SP}$ لينتون (أجروكيم) $\frac{90\%}{SP}$	الحشرات الثاقبة الماصة / حشرية الأجنحة / الخنافس من غمدية الأجنحة / الذباب من ثنائية الأجنحة بمعدل 100 جم / 100 لتر	- جهازي، بالملامسة ومعدي. - ينشط إنزيم الأسيتيل كولين إستيراز مما يؤدي لتراكم الأسيتيل كولين. PHI: 7 أيام LD ₅₀ : 17 مجم / كجم
بريميكلرب م.ك: الكاربامات	أفوكس (سجننتا) $\frac{50\%}{DG}$ موتيف (شوري) $\frac{50\%}{WG}$ إيتوكس (افكو) $\frac{50\%}{WP}$	المن، خصوصاً المقاوم للمبيدات الفوسفورية بمعدل 50 جم / 100 لتر	- ملامسة ومعدي. - له خواص جهازية ضعيفة ويؤثر بإخترته عن طريق التنفس. - له نفس التأثير السابق. PHI: 14 يوم LD ₅₀ : 147 مجم / كجم
كاربوسلفان م.ك: الكاربامات	مارشال (دلتا) $\frac{25\%}{WP}$ مارشال (دلتا) $\frac{20\%}{EC}$	المن / الذبابة البيضاء / التريس بمعدل 75 - 125 جم / 100 لتر الحفار والدودة القارضة طعم سام (1 كجم + 15 كجم ردة + 1 كجم عسل أسود + ماء)	- جهازي، بالملامسة ومعدي. - يرجع تأثيره لتحول المركب الي كاربوفوران. - له نفس التأثير السابق. PHI: 14 يوم LD ₅₀ : 250 مجم / كجم

المادة الفعالة والمجموعة الكيميائية	الأسماء التجارية	التوصيات والمعدلات	ملاحظات
ديازينون م.ك: الفوسفور العضوي	ديازينوكس (كفر الزيات) $\frac{5\%}{G}$ ديازينوكس (كفر الزيات) $\frac{60\%}{EC}$ بولماك (كيما) $\frac{60\%}{EC}$	الحشرات الثاقبة الماصة / ذبابة الفاكهة / ديدان الأوراق والثمار بمعدل 150 سم ³ / 100 لتر الديدان الدموية في الأرز بمعدل 10 كجم / فدان	- ملامسة ومعدي. - له نفس التأثير السابق. PHI: 15 يوم في الخضار 21 يوم في الفاكهة 30 يوم في المحاصيل
بروفينوفوس م.ك: الفوسفور العضوي	كورد (الهلل) $\frac{72\%}{EC}$ تيليتون (أجروكيم) $\frac{72\%}{EC}$ سيليان (كفر الزيات) $\frac{72\%}{EC}$	الحشرات الثاقبة الماصة / ديدان الأوراق والثمار / الخنافس / الأكاروسات / سوسة النخيل الحمراء / ذبابة البصل بمعدل 200 سم ³ / 100 لتر	- ملامسة ومعدي. - حشري أكاروسي. - له قتل بخاري قوي. - له نفس التأثير السابق. PHI: 21 - 30 يوم
ديمثويت م.ك: الفوسفور العضوي	أجروثويت (أجروكيم) $\frac{40\%}{EC}$ سايدون (كفر الزيات) $\frac{40\%}{EC}$ دايمتوكس (الهلل) $\frac{40\%}{EC}$	الحشرات الثاقبة الماصة / ديدان الثمار والأوراق / ذبابة الفاكهة والموايح والبصل والزيتون بمعدل 100 - 150 سم ³ / 100 لتر	- جهازي يؤثر بالملامسة وكسب معدي وتنفس. - له نفس التأثير السابق. PHI: 14 - 21 يوم
فوسميت م.ك: الفوسفور العضوي	إميدان (سامتريد) $\frac{50\%}{WP}$	الحشرات الثاقبة الماصة / يرقات حشرية الأجنحة / خنافس غمدية الأجنحة / ذبابة الفاكهة والبصل بمعدل 140 جم / 100 لتر	- ملامسة ومعدي. - حشري أكاروسي. - له نفس التأثير السابق. PHI: 10 أيام
أبامكتين م.ك: الأفرمكتينات	بيرمكتين (كيما) $\frac{1.8\%}{EC}$ أبانتين (العز) $\frac{1.8\%}{EC}$ بيومكتين (شوري) $\frac{5\%}{EC}$ أجريميك جولد (سنجنتا) $\frac{8.4\%}{SC}$	صانعات الأنفاق / التريس / العنكبوت الأحمر / الحلم الدودي / نيماتودا تعقد الجذور بمعدل (تركيز 1.8%) 50 سم ³ / 100 لتر - لا يؤثر على بيض الأكاروس وله تأثير أقل على الحيوان الكامل	- ملامسة ومعدي. - حشري أكاروسي. - نيماتودي. - يخترق الورقة حتى السطح السفلي. - يرتبط بالمستقبل البروتيني للجلوتامات ويفتح قنوات الكلوريد. PHI: 7 - 10 أيام

المادة الفعالة والمجموعة الكيميائية	الأسماء التجارية	التوصيات والمعدلات	ملاحظات
بيبروكسيفين م.ك: بيريدين	أميرال (سوميتومو) $\frac{10\%}{EW}$ موليجان (العز) $\frac{10\%}{EC}$ أنتيفلاي (كام) $\frac{10\%}{EC}$ أدمافين (كانزا) $\frac{10\%}{EC}$	حشرات الصحة العامة / الذبابة البيضاء / الحشرة القشرية بمعدل 50 – 75 سم ³ / 100 لتر	- ملامسة ومعدي. - ينتقل خلال الورقة للسطح السفلي. - مشابه هرمون الشباب، يمنع تطور وانسلاخ الحشرة. PHI: 3 أيام
فينوكسي كارب م.ك: الكاربامات	لوفوكس (سنجنثا) $\frac{10.5\%}{EC}$ + لوفينورون	يرقات حرشفية الأجنحة بمعدل 100 سم ³ / 100 لتر	- ملامسة ومعدي. - له نفس التأثير السابق. PHI: 15 يوم
كلورفينابير م.ك: بيزول	شالنجرسوير (باسف) $\frac{24\%}{SC}$ فلانتي (شوري) $\frac{24\%}{SC}$ وندر (أجروسييف) $\frac{36\%}{SC}$ أكس مايت (كام) $\frac{24\%}{SC}$ كونكورد (إيجيت كيم) $\frac{24\%}{SC}$	يرقات وحوريات الأكاروسات / يرقات حرشفية الأجنحة / التريس / الحشرة القشرية بمعدل (تركيز 24%) 60 سم ³ / 100 لتر	- ملامسة ومعدي. - له خواص جهازية ضعيفة. - بادئ مبيد، يلزم تحوله بالأكسدة لـ CL303268. - يؤثر بمنع إنتاج الطاقة. PHI: 7 أيام
تولفينبيريد م.ك: بيرازول	هاتشي هاتشي (سامتريد) $\frac{15\%}{EC}$	الحشرات الثاقبة الماصة / يرقات حرشفية الأجنحة / الخنافس (خنفساء كلورادو ، ..) / البياض النقيقي / بعض الأكاروسات بمعدل 150 سم ³ / 100 لتر	- ملامسة ومعدي. - حشري أكاروسي فطري. - تثبيط نقل الطاقة في المعد الأول في ميتوكوندريا الخلية. PHI: 3 – 7 أيام
ثيوسيكلام هيدروجين أوكسالات م.ك: ملح الأوكسالات	أفيسكت اس (أريستا) $\frac{50\%}{SP}$	المن / التريس / الذبابة البيضاء / صانعات الانفاق بمعدل 500 جم / فدان	- ملامسة ومعدي. - يرتبط بالمستقبل النيكوتيني للأسيتيل كولين ويغلق القنوات مما يمنع مرور الأيونات. PHI: 5 أيام

المادة الفعالة والمجموعة الكيميائية	الأسماء التجارية	التوصيات والمعدلات	ملاحظات
فلوفينوكسورون م.ك: بنزويل يوريا	كليجرون (أجروكيم) $\frac{10\%}{DC}$ نوفو (سوليتز) $\frac{10\%}{DC}$ فلوكسيت (مصر للتنمية) $\frac{10\%}{DC}$ سيجرون (أجروكيم) $\frac{10\%}{EC}$ + ألفا سيفير مثرين	يرقات حرشفية الأجنحة / بيض و يرقات و حوريات الأكاروسات بمعدل 80 سم ³ / 100 لتر	- ملامسة ومعدي. - حشري أكاروسي. - له نفس التأثير السابق. PHI: 3 - 10 أيام
بوبروفيزين م.ك: ثياديازين	أبلود (شوري) $\frac{25\%}{SC}$ بيبرولورد (UPL) $\frac{25\%}{SC}$	الذبابة البيضاء / الحشرة القشرية / البق الدقيقي / المن / التربس / العنكبوت الأحمر بمعدل 100 - 150 سم ³ / 100 لتر	- ملامسة ومعدي. - له مفعول بخاري قوي. - يثبط تخليق الكيتين، فيمنع الانسلاخ بطريقة مختلفة عن المبيدات من مجموعة بنزويل يوريا. PHI: 3 أيام في الخضار 14 يوم في الفاكهة
سيرومازين م.ك: تريازين	تريجارد (سجنقا) $\frac{75\%}{WP}$ تريجارد (سجنقا) $\frac{10\%}{SL}$ تريغاب (فابكو) $\frac{75\%}{WP}$	مبيد متخصص في رتبة ثنائية الأجنحة (الذباب الحقيقي) صالحات انفاق (LIRIOMYZA SP.) بمعدل (تركيز 75%) رشاً 30 - 50 جم / 100 لتر حقناً 200 جم / فدان	- جهازي ينتقل لأعلى فقط بالخشب. - يخترق الورقة للسطح السفلى رشاً. - منظم نمو حشري يحدث خلل في التوازن الهرموني للانسلاخ. PHI: 7 أيام
كروما فينوزايد م.ك: داي أسيل هيدرازين	فيرتو (إريستا) $\frac{5\%}{SC}$	يرقات حرشفية الأجنحة بمعدل 60 سم ³ / 100 لتر	- ملامسة ومعدي. - منظم نمو حشري يعمل على الارتباط بمستقبل هرمون الانسلاخ مما يؤدي لإنسلاخ مبكر للحشرة. PHI: 7 أيام
ميثوكسي فينوزايد م.ك: داي أسيل هيدرازين	رانر (داو) $\frac{24\%}{SC}$ رانو (كافزا) $\frac{24\%}{SC}$ أبهولد (داو) $\frac{36\%}{SC}$ 30% + 6% مبيثورام	يرقات حرشفية الأجنحة بمعدل 400 سم ³ / فدان	- ملامسة ومعدي. - له نفس التأثير السابق. PHI: 7 أيام

المادة الفعالة والمجموعة الكيميائية	الأسماء التجارية	التوصيات والمعدلات	ملاحظات
إيمامكتين بنزوات م.ك: الأفزمكتينات	سييدو (شوري) $\frac{5.7\%}{WG}$ إليكتور (مصر للتنمية) $\frac{2\%}{EC}$ أمازون (كاثزا) $\frac{5.7\%}{SG}$ إكسلنت (كفر الزيادات) $\frac{1.9\%}{EC}$ بيني (شوري) $\frac{9\%}{SC}$ 1.5% + 7.5% إندوكسكارب	صانعات الأنفاق / ديدان الثمار والأوراق من رتبة حرشفية الأجنحة بمعدل (تركيز 5.7%) 80 - 150 جم / فدان	- ملامسة ومعدي. - يخترق الورقة للسطح السفلي. - له نفس التأثير السابق. PHI: 7 أيام
سبينوساد م.ك: السبينوسينات	تريسر (داو) $\frac{24\%}{SC}$ سبنتور (داو) $\frac{24\%}{SC}$ كونسرف (داو) $\frac{0.024\%}{CB}$	صانعات الأنفاق / ديدان الأوراق والثمار من رتبة حرشفية الأجنحة بمعدل (تركيز 24%) 30 سم ³ / 100 لتر	- ملامسة ومعدي. - يرتبط بالمستقل النيكوتيني للأسيتيل كولين، ولكن بمكان مخالف لمكان ارتباط الأسيتيل كولين. PHI: 10 - 15 يوم
سبينتورام م.ك: السبينوسينات	رادينت (داو) $\frac{12\%}{SC}$ ديليجيت (داو) $\frac{25\%}{WG}$ أبهولد (داو) $\frac{36\%}{SC}$ 6% + 30% ميتوكسي فينوزايد	التريس / ديدان الثمار والأوراق (دودة ورق القطن ، دودة ثمار العنكب ، توتا أبسليوتا) بمعدل (تركيز 12%) 20- 40 سم ³ / 100 لتر	- ملامسة ومعدي. - له نفس التأثير السابق. PHI: 3 أيام في الخضار 7 أيام في الفاكهة
لوفينورون م.ك: بنزويل يوريا	ماتش (سنجنتا) $\frac{5\%}{EC}$ كليفرن (أجروكيم) $\frac{5\%}{EC}$ سايمكس (شوري) $\frac{5\%}{EC}$ ماني (سامتريد) $\frac{5\%}{EC}$ سيجاتوب (كاثزا) $\frac{5\%}{EC}$	يرقات حرشفية الأجنحة / التريس / يرقات الخنافس / بعض أنواع الحلم والأكاروسات بمعدل 80 سم ³ / 100 لتر	- جهازي ومعدي . - منظم نمو حشري يثبط تخليق الكيتين ، فيمنع الانسلاخ. PHI: 7 أيام في الخضار 21 يوم في الفاكهة
كلورفلوازيورون م.ك: بنزويل يوريا	توبرون (أجروكيم) $\frac{5\%}{EC}$ كابريس (الهاب) $\frac{5\%}{EC}$	يرقات حرشفية الأجنحة بمعدل 100 - 150 سم ³ / 100 لتر	- ملامسة ومعدي. - له نفس التأثير السابق. PHI: 14 يوم

المادة الفعالة والمجموعة الكيميائية	الأسماء التجارية	التوصيات والمعدلات	ملاحظات
إيميداكلوبريد م.ك: نيونيكوتينويد	أفينيو (شورى) $\frac{70\%}{WG}$ شينوك (شورى) $\frac{35\%}{SC}$ إيميدور (كيما) $\frac{35\%}{SC}$ كونفيدور (باير) $\frac{20\%}{OD}$ بست (الهلل) $\frac{25\%}{WP}$	المن / التريس / الذبابة البيضاء / البق الدقيقي / الحشرة القشرية / الجاسيد / صانعات الأنفاق بمعدل (تركيز 35%) رشاً 100 سم ³ / 100 لتر حقناً 500 سم ³ / فدان	- جهازي، بالملامسة ومعدي. - يرتبط بالمستقبل النيكوتيني للأسيتيل كولين. PHI: 7 أيام في الخضار 21 يوم في الفاكهة والمحاصيل
أستيامبيريد م.ك: نيونيكوتينويد	موسيلان (شورى) $\frac{20\%}{SP}$ أستيامور (كيما) $\frac{20\%}{SP}$ أودكس (ماتش كيم) $\frac{70\%}{SP}$	المن / التريس / الذبابة البيضاء / البق الدقيقي / الحشرة القشرية / الجاسيد / صانعات الأنفاق بمعدل (تركيز 20%) 25 - 30 جم / 100 لتر	- جهازي، بالملامسة ومعدي. - له نفس التأثير السابق. PHI: 7 أيام في الخضار 14 يوم في الفاكهة
ثياميثوكسام م.ك: نيونيكوتينويد	أكتارا (سنجنتا) $\frac{25\%}{WG}$ ليكس (شورى) $\frac{25\%}{WG}$ بيليكسام (العز) $\frac{25\%}{WG}$ أجري فليكس (سنجنتا) $\frac{18.56\%}{SC}$ $15.24\% + 3.32\%$ أباسكتين	المن / التريس / الذبابة البيضاء / البق الدقيقي / الحشرة القشرية / الجاسيد / صانعات الأنفاق بمعدل رشاً 20 - 40 جم / 100 لتر حقناً 350 جم / فدان	- جهازي، بالملامسة ومعدي. - له نفس التأثير السابق. يوفر حماية طويلة عند استعماله حقناً، لذا فهو فعال ضد نقلات الأمراض الفيروسية. PHI: 7 أيام في الخضار 28 يوم في الموالح
ثياكلوبريد م.ك: نيونيكوتينويد	بلانش (شورى) $\frac{48\%}{SC}$ كاليبسو (باير) $\frac{48\%}{SC}$ تريو برد (كانزا) $\frac{48\%}{SC}$	المن / التريس / الذبابة البيضاء / البق الدقيقي / الحشرة القشرية / الجاسيد / صانعات الأنفاق / ذبابة الفاكهة / جعل الأزهار بمعدل 30 سم ³ / 100 لتر	- جهازي، بالملامسة ومعدي. - له نفس التأثير السابق. PHI: 7 أيام في الخضار 14 يوم في الفاكهة
دينوتيفوران م.ك: نيونيكوتينويد	أوشين (شورى) $\frac{20\%}{SG}$	المن / التريس / الذبابة البيضاء / البق الدقيقي / الحشرة القشرية / الجاسيد / صانعات الأنفاق بمعدل 50-125 جم / 100 لتر	- جهازي، بالملامسة ومعدي. - له نفس التأثير السابق. PHI: 2 يوم في الخضار 21 يوم في الفاكهة

المادة الفعالة والمجموعة الكيميائية	الأسماء التجارية	التوصيات والمعدلات	ملاحظات
ملاثيون م.ك: الفوسفور العضوي	ملاسون (كفر الزييات) $\frac{57\%}{EC}$ ملاثوكس (الهلب) $\frac{57\%}{EC}$	المن / التريس / الذبابة البيضاء / البق الحقيقي / الحشرة القشرية / ديدان الأوراق بمعدل 100 سم ³ / 100 لتر	- ملامسة ومعدي. - يعمل على تثبيط إنزيم الأسيتيل كولين إستيراز مما يؤدي لتراكم الأسيتيل كولين في المشابك العصبية. PHI: 15 - 21 يوم
فينيتروثيون م.ك: الفوسفور العضوي	أنكور (كيما) $\frac{50\%}{EC}$ سومثيون كزد (كفر الزييات) $\frac{50\%}{EC}$ فينثيون (أجروكيم) $\frac{50\%}{EC}$	الحشرات الثاقبة الماصة / ديدان الأوراق والثمار / ذبابة الفاكهة والبصل والموالح / الجراد بمعدل 100 - 150 سم ³ / 100 لتر	- ملامسة ومعدي. - له نفس التأثير السابق. - لا يستخدم على العائلة الصلبية والتفاح والوخ. PHI: 14 - 21 يوم
بريميغوس ميثيل م.ك: الفوسفور العضوي	سنتريك (كيما) $\frac{50\%}{EC}$ أكتيليك (سجننتا) $\frac{50\%}{EC}$	الحشرات الثاقبة الماصة / ديدان الثمار والأوراق / ذبابة الفاكهة والبصل بمعدل 300 سم ³ / 100 لتر	- ملامسة ومعدي. - له فعل بخاري قوي. - له نفس التأثير السابق. PHI: 14 - 21 يوم
كلوربيريفوس م.ك: الفوسفور العضوي	كلورزان (كفر الزييات) $\frac{48\%}{EC}$ تاك (شوري) $\frac{48\%}{EC}$ بستبان (أجروكيم) $\frac{48\%}{EC}$	الحشرات الثاقبة الماصة / ديدان الثمار / صانعات الأنفاق / النمل الأبيض / سوسة النخيل الحمراء بمعدل 150 سم ³ / 100 لتر	- ملامسة ومعدي. - له نفس التأثير السابق. PHI: 15 - 20 يوم
كلوربيريفوس ميثيل م.ك: الفوسفور العضوي	لميفوس (كيما) $\frac{50\%}{EC}$ + 0.5% لامدا سيهالوترين بيرودان (أجروكيم) $\frac{50\%}{EC}$ ريلدان (داو) $\frac{50\%}{EC}$	الحشرات الثاقبة الماصة / ديدان الثمار / صانعات الأنفاق بمعدل 1500 سم ³ / فدان	- ملامسة ومعدي. - له نفس التأثير السابق. PHI: 7 - 15 يوم

المادة الفعالة والمجموعة الكيميائية	الأسماء التجارية	التوصيات والمعدلات	ملاحظات
سبيروميثيفين م.ك: كيتو اينولز	أوبيرون (باير) $\frac{24\%}{SC}$	الذبابة البيضاء (البيض والحواريات) / الأكاروسات بمعدل 40 - 80 سم ³ / 100 لتر	- ملامسة ومعدي. - حشري أكاروسي. - يثبط الأنزيم المسؤول عن الخطوة الأولى في التخليق الحيوي للدهون. PHI: 3 أيام
سبيروتترامات م.ك: كيتو اينولز	موفينكو (باير) $\frac{10\%}{SC}$	المن / الذبابة البيضاء / التريس / البق النقي / الحشرة القشرية / بسبب الأجاص / فيلوكسرا العنب بمعدل 80 سم ³ / 100 لتر	- جهازي، بالملامسة ومعدي. - له نفس التأثير السابق. PHI: 3 أيام في الخضار 14 يوم في الموالح والعنب 21 يوم في الأشجار ذات النواة الحجرية
بيميترولين م.ك: بيريدين أزومينين	تينو (شوري) $\frac{50\%}{WG}$ تشميس (مجننا) $\frac{50\%}{WG}$ أوريون (كانزا) $\frac{50\%}{WG}$ كب أكسترا (شوري) $\frac{35\%}{WG}$ 20% + 15% ثيامينوكسم	المن بمعدل 40 جم / 100 لتر الذبابة البيضاء بمعدل 80 جم / 100 لتر	- جهازي، بالملامسة ومعدي. - مانع تغذية وذلك بتأثيره على العضو الحلي المسؤول عن الإحساس بالسمع والتوازن والجاذبية. PHI: 3 أيام في الخضار 14 يوم في الفاكهة
فلونيكاميد م.ك: بيريدين كاربوكساميد	تبيكي (سوميتومو/شوري) $\frac{50\%}{WG}$	المن / التريس / الذبابة البيضاء / البق النقي / الحشرة القشرية / الجاسيد بمعدل 20 - 40 جم / 100 لتر	- جهازي، بالملامسة ومعدي. - له نفس التأثير السابق. PHI: 1 يوم في الخضار 14 يوم في فاكهة النواة الحجرية 21 يوم في التفاح والكمثرى
إندوكسكارب م.ك: أوكسا ديازين	فلاكس (شوري) $\frac{15\%}{SC}$ أفانت (دوبون) $\frac{15\%}{EC}$ أفوست (كانزا) $\frac{30\%}{WG}$ ميتارو (سانتفالي) $\frac{30\%}{WG}$ فانتاج (العز) $\frac{14.5\%}{SC}$	يرقات حشرية الأجنحة مثل (دودة ثمار العنب ، دودة ورق القطن ، دودة الذرة ، فراشة درنات البطاطس...) بمعدل (تركيز 15%) 25 سم ³ / 100 لتر	- ملامسة ومعدي. - يغلق قنوات الصوديوم المعتمدة على الجهد، مما يمنع مرور الإشارة العصبية. PHI: 7 - 14 أيام

المادة الفعالة والمجموعة الكيميائية	الأسماء التجارية	التوصيات والمعدلات	ملاحظات
كلوثياتيدين م.ك: نيونيكوتينويد	سوبر توكس (شوري) كلوثيامكس (MAC-GmbH) $\frac{48\%}{SC}$ $\frac{50\%}{WG}$	المن / التريس / الذبابة البيضاء / البق الدقيقي / الحشرة القشرية / الجاناسيد / صانعات الأنفاق بمعدل رشاً 40 - 80 سم ³ / 100 لتر حقناً 250 سم ³ / فدان	- جهازى، بالملامسة ومعدى. - له نفس التأثير السابق. PHI: 7 أيام
سلفوكسافلور م.ك: سلفوكسيمين	ترانسفورم (داو) كلوزر (داو) $\frac{50\%}{WG}$ $\frac{24\%}{SC}$	المن / التريس / الذبابة البيضاء / البق الدقيقي / الحشرة القشرية / الجاناسيد بمعدل (تركيز 24%) 175 - 250 سم ³ / فدان	- جهازى، بالملامسة ومعدى. - له نفس التأثير السابق. PHI: 5 - 7 أيام
إيتوفينبروكس م.ك: البيرثرويدات	بريمو (شوري) تريبون (سوميتومو) إنفينيتي (أستراكيم إيجبت) $\frac{10\%}{SC}$ $\frac{30\%}{EC}$ $\frac{5\%}{EC}$	المن / التريس / الذبابة البيضاء / نطاطات الأوراق / صانعات الأنفاق / خنافس الأوراق بمعدل (تركيز 10%) 200 سم ³ / فدان	- ملامسة ومعدى. - يمنع غلق قنوات الصوديوم مما يؤدي لفرط إثارة المحور العصبي ومنع إرسال النبضات العصبية فالموت. PHI: 7 أيام
دلتا مثرين م.ك: البيرثرويدات	ديميس (باير) دومثرين (دوترا) كاوترين (كيما) $\frac{2.5\%}{EC}$ $\frac{2.5\%}{EC}$ $\frac{5\%}{EC}$	المن / التريس / الذبابة البيضاء / الحشرة القشرية / الخنافس / ديدان الأوراق / صانعات الأنفاق بمعدل (تركيز 2.5%) 50 سم ³ / 100 لتر	- ملامسة ومعدى. - له نفس التأثير السابق. PHI: 7 أيام
سايبير مثرين م.ك: البيرثرويدات	سباركيل (الغلب) سوبركيل (أجروفارم) $\frac{25\%}{EC}$ $\frac{25\%}{EC}$	المن / التريس / الذبابة البيضاء / البق الدقيقي / الحشرة القشرية / حشرات الساق / ديدان الثمار والأوراق بمعدل 30 سم ³ / 100 لتر	- ملامسة ومعدى. - له نفس التأثير السابق. PHI: 14 يوم

المادة الفعالة والمجموعة الكيميائية	الأسماء التجارية	التوصيات والمعدلات	ملاحظات
بيريداليل م.ك: غير مصنف	بيليو (شوري) $\frac{50\%}{EC}$	يرقات حرشية الأجنحة / هدية الأجنحة (التربس) بمعدل 50 سم ³ / 100 لتر	- ملامسة ومعدي. - لم تعرف أو تصنف طريقة تأثيره حتى الآن. PHI: 2 يوم
أزاديراكيتين مستخلص زيت النيم	أشوك (المصرية للتنمية) $\frac{0.15\%}{EC}$ أويكوس (لوتس) $\frac{3.2\%}{EC}$	المن / التربس / الذبابة البيضاء / صانعات الأنفاق بمعدل 750 سم ³ / فدان البياض الدقيقي بمعدل 250 سم ³ / 100 لتر نيماتودا تعقد الجذور بمعدل 400 سم ³ / فدان	- جهازري. - حشري فطري نيماتودي. - لم تصنف أو تعرف طريقة تأثيره حتى الآن، ويعتقد أنه يؤثر على التوازن الهرموني وعملية الانملاخ. PHI: 1 يوم
Bacillus Thuringiensis بكتيريا	دايل (ماي تريد) $\frac{6.4\%}{DF}$ أجيرين (أورجناك) $\frac{6.5\%}{WP}$ بيوتكت (أورجناك) $\frac{9.4\%}{WP}$	الفقس الحديث لحرشية الأجنحة مثل دودة ورق القطن وتوتا ايسليوتا بمعدل 200 – 400 جم / فدان	- معدي. - يعمل على تحلل جدار المعدة. PHI: 0 (zero)
lecanicillium muscarium فطريات	مايكوتال (بيواجيت) 10^{10} خلية جرثومية / جم WG	التربس / الذبابة البيضاء (داخل الصوب) بمعدل 250 جم / 100 لتر ماء	- ملامسة. - تلتصق الجراثيم الفطرية على السطح الخارجي للعائل وتنمو إلى الداخل وتغزو الجسم. PHI: 0 (zero)
Beauveria bassiana فطريات	بيوسكت (أورجناك) 32 مليون خلية / جم WP	المن / الذبابة البيضاء / ثاقبات الذرة / خنفساء البطاطس / الأكاروسات بمعدل 200 جم / 100 لتر	- ملامسة. - حشري أكاروسي. - تلتصق جراثيم الفطر بالجسم الخارجي وتقرز أنزيمات تهضم وتحلل الهيكل الخارجي والجسم الداخلي. PHI: 0 (zero)

المادة الفعالة والمجموعة الكيميائية	الأسماء التجارية	التوصيات والمعدلات	ملاحظات
هيكسافلومورون م.ك: بنزويل يوريا	ديميرون (أجروكيم) $\frac{10\%}{EC}$ كام يرون (كام) $\frac{10\%}{EC}$	يرقات حرشفية الأجنحة / يرقات خنافس غمدية الأجنحة بمعدل 200 سم ³ / فدان	- جهازى ومعدي. - له نفس التأثير السابق. - له تأثير قوي على البيض. PHI: 15 يوم
ترايفلومورون م.ك: بنزويل يوريا	السيستين (باير) $\frac{48\%}{SC}$ كان كون (شورى) $\frac{40\%}{SC}$	يرقات حرشفية الأجنحة بمعدل 30 سم ³ / 100 لتر	- ملامسة ومعدي. - له نفس التأثير السابق. PHI: 7 - 15 يوم
تيفلوبنزورون م.ك: بنزويل يوريا	نومولت (باسف) $\frac{15\%}{SC}$	يرقات حرشفية الأجنحة / يرقات خنافس غمدية الأجنحة / التربس بمعدل 50 سم ³ / 100 لتر	- ملامسة ومعدي. - له نفس التأثير السابق. PHI: 10 أيام
دايفلوبنزورون م.ك: بنزويل يوريا	ديفلوريت (مصر للتنمية) $\frac{25\%}{WP}$ ديملين (ايرستا) $\frac{48\%}{SC}$ دفلوكس (كانزا) $\frac{48\%}{SC}$ نيوبنزورون (كام) $\frac{48\%}{SC}$	يرقات حرشفية الأجنحة / الجراد / نطاطات الأوراق بمعدل (تركيز 48%) 125 سم ³ / فدان	- ملامسة ومعدي. - له نفس التأثير السابق. PHI: 7 أيام
نوفالورون م.ك: بنزويل يوريا	إكيو (لوتس) $\frac{10\%}{EC}$ روكسي (ماي تريد) $\frac{10\%}{EC}$	يرقات حرشفية الأجنحة / يرقات خنافس غمدية الأجنحة / يرقات ثنائية الأجنحة (الذباب) / الاطوار الأولى من متشابهة الأجنحة بمعدل 80 سم ³ / 100 لتر	- ملامسة ومعدي. - له نفس التأثير السابق. PHI: 3 - 7 أيام

المادة الفعالة والمجموعة الكيميائية	الأسماء التجارية	التوصيات والمعدلات	ملاحظات
ألفا سايبيرمثرين م.ك: البيرثرويدات	سوبر ألفا (الهلل) $\frac{10\%}{EC}$ ألفا سايبير (أجروكيم) $\frac{10\%}{EC}$	المن / التريس / الذبابة البيضاء / البق الدقيقي / الحشرة القشرية / حفارات الساق / ديدان الثمار والأوراق بمعدل 50 سم ³ / 100 لتر	- ملامسة ومعدي. - له نفس التأثير السابق. PHI: 14 يوم
زيثا سايبيرمثرين م.ك: البيرثرويدات	فيوري (FMC) $\frac{10\%}{EW}$	المن / التريس / الذبابة البيضاء / البق الدقيقي / الحشرة القشرية / ديدان الثمار والأوراق / ذبابة الفاكهة والبصل والفاصوليا بمعدل 50 سم ³ / 100 لتر الدودة القارضة طعم سام بمعدل 100 سم ³ / فدان	- ملامسة ومعدي. - له نفس التأثير السابق. PHI: 7 أيام في الخضار 14 يوم في الفاكهة والمحاصيل
لامدا سيهالوثرين م.ك: البيرثرويدات	فلاش (دوترا) $\frac{10\%}{EC}$ كونغ فو (دوترا) $\frac{5\%}{EC}$ لمبادا (كيما) $\frac{5\% + 10\%}{EC}$ دولف (شوري) $\frac{2.5\%}{EC}$	المن / التريس / الذبابة البيضاء / الحشرة القشرية / صانعات الأفئاق / ديدان الثمار / ذبابة الفاكهة والبصل / نطاطات الأوراق بمعدل (تركيز 5%) 50 سم ³ / 100 لتر	- ملامسة ومعدي. - له نفس التأثير السابق. PHI: 10 أيام في الخضار 21 يوم في المحاصيل 28 يوم في الفاكهة
غامما سيهالوثرين م.ك: البيرثرويدات	فانتكس (أجرينوفا) $\frac{6\%}{CS}$	المن / التريس / الذبابة البيضاء / البق الدقيقي / الحشرة القشرية / ديدان اللوز القرنفلية والشوكية / الدودة القارضة طعم سام بمعدل 100 سم ³ / فدان	- ملامسة ومعدي. - له نفس التأثير السابق. PHI: 7 أيام
بيتا سيفلوثرين م.ك: البيرثرويدات	بولوك (باير) $\frac{12.5\%}{EC}$ جوليكور (كيما) $\frac{10\%}{EC}$ فيلوكس (كيما) $\frac{5\%}{EC}$	المن / نطاطات الأوراق الخنافس / ديدان الثمار / ذبابة الفاكهة / بسيلا الإحاص بمعدل (تركيز 5%) 50 سم ³ / 100 لتر	- ملامسة ومعدي. - له نفس التأثير السابق. PHI: 7 أيام في الخضار 14 يوم في الفاكهة