Kemenkes



BUKU KIA

Kesehatan Ibu dan Anak

Panduan lengkap untuk mewujudkan ibu dan anak sehat

Bawa buku ini setiap kali mengunjungi Posyandu, fasilitas kesehatan, kelas ibu, BKB dan PAUD. Gunakan dari masa kehamilan sampai anak berumur 6 tahun.

Nama Ibu _____

Dikeluarkan oleh Fasilitas Kesehatan _____

Kab./Kota _____

Tanggal dikeluarkannya Buku _____

Provinsi _____

Katalog Dalam Terbitan. Kementerian Kesehatan RI

Indonesia. Kementerian Kesehatan RI
Buku Kesehatan Ibu dan Anak

1. MOTHER - CHILD RELATION
2. MATERNAL - CHILD NURSING
3. MATERNAL HEALTH SERVICES

Cetakan Tahun 2024

306.874.3
Ind.
b

ISBN 978-623-301-149-5

9 786233 011495

APBN DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT 2024

Identitas (Diisi oleh ibu)

	Ibu	Suami/Keluarga	Anak
Nama			
NIK			
No. JKN			
Fasilitas Kesehatan TK1			
Fasilitas Kesehatan Rujukan			
Tempat/Tanggal Lahir			
Pendidikan			
Pekerjaan			
Alamat Rumah			
Telepon			
Anak ke-			
Nomor Akta Kelahiran			
Golongan Darah			
Pembiayaan Lain			
Asuransi Lain			
Nomor			
Tanggal Berlaku			
Fasilitas Pelayanan Kesehatan			
Primer			
Puskesmas Domisili			
No. Reg. Kohort Ibu			
No. Reg. Kohort Bayi			
No. Reg. Kohort Balita dan anak Pra-Sekolah			
Sekunder			
No. Catatan Medik RS			

Riwayat Singkat Kesehatan Ibu

Diisi oleh Tenaga Kesehatan

Usia Ibu	
Kehamilan ke-	
Jumlah Anak Lahir Hidup	
Riwayat Keguguran	
Riwayat Penyakit Ibu	

Lihat selengkapnya di halaman 98.

Tentang Buku KIA

Buku KIA membantu Ibu memantau kondisi kehamilan dan kesehatan bayi dan balita. Setiap ibu mendapat 1 (satu) Buku KIA untuk kehamilan tunggal dan tambahan satu buku KIA lagi untuk anak yang lain pada kehamilan kembar. Selalu bawa Buku KIA ketika berkunjung ke Posyandu, Kelas ibu Hamil, Kelas Ibu Balita, Puskesmas, Rumah Sakit, dan fasilitas kesehatan lainnya.

Hal-hal yang perlu dilakukan ibu dan keluarga

- Baca dan pahami isi Buku KIA.
- Datang ke Posyandu dan Puskesmas/ Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk mendapat pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta pemantauan tumbuh kembang.
- Perhatikan dan isi pemantauan kesehatan secara mandiri pada bagian yang berwarna kuning.
- Ayah turut mendukung ibu dalam memahami dan melakukan hal-hal di dalam buku ini.

LEMBAR YANG HARUS DIISI UNTUK IBU

HALAMAN 1, 7, 10-13, 15, 18, 24, 28-31, 33, 86, 100.

LEMBAR YANG HARUS DIISI UNTUK ANAK

HALAMAN 40, 42-45, 46-47, 50, 52-55, 61-63, 66-69, 74-77, 79, 81-83, 111, 151-152.

Daftar Isi

PERJALANAN IBU

Perjalanan Menjadi Seorang Ibu 3
Kehamilan 4
Melahirkan 21
Setelah Melahirkan 26
Menyusui 34

PERJALANAN ANAK

0 - 6 Bulan 39
6 - 12 Bulan 56
12 - 24 Bulan 64
2 - 6 Tahun 71

INFORMASI UMUM 85

PENGUKURAN & PENCATATAN OLEH TENAGA KESEHATAN 95

Pencatatan Ibu 96
Pencatatan Anak 121

Hal-hal yang perlu dilakukan Kader dan Tenaga Kesehatan

Kader dan tenaga kesehatan membantu ibu untuk memahami isi dan cara penggunaan Buku KIA.



Perjalanan Menjadi Seorang Ibu

Selamat! Anda kini siap memasuki tahapan baru dalam kehidupan, menjadi Ibu.


Nikmati perjalanan menuju proses melahirkan dengan panduan dan tips yang diberikan di sini. Tak perlu ragu, tak perlu khawatir, karena kami senantiasa mendampingi Ibu selama kehamilan hingga siap menyambut kehadiran sang buah hati.

KIA 2024 Book 2.17.5 4 10/24/24 01:20

1000 Hari Pertama Kehidupan

Seribu hari pertama kehidupan (1000 HPK) adalah masa paling penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Masa ini terdiri dari 270 hari selama bayi berada dalam kandungan ibu, dan 730 hari atau dua tahun pertama kehidupan anak setelah dilahirkan.

Masa 1000 HPK sangat penting, karena anak akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat dan berdampak pada kualitas kesehatannya di masa akan datang. Saat bayi berada dalam kandungan adalah masa pembentukan dan perkembangan organ-organ tubuh penting, seperti otak, jantung, hati, ginjal, paru-paru, dan tulang. Perkembangan ini berlanjut setelah bayi dilahirkan hingga dua tahun setelah kelahiran.



Masa ini juga merupakan puncak perkembangan otak dan kemampuan berpikir anak.

PERKEMBANGAN OTAK ANAK



25% Saat Lahir

70% Di Usia 0 - 1 Tahun

85% Di Usia 1 - 3 Tahun

Kecukupan asupan gizi perlu diperhatikan, tidak hanya pada masa ini saja, tapi mulai dari calon pengantin, calon ibu, bayi dalam kandungan, hingga anak. Kekurangan asupan gizi dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak, seperti terkena penyakit tidak menular, terhambatnya kemampuan berpikir, sehingga anak kurang cerdas dan kompetitif, serta memiliki tubuh pendek atau stunting. Oleh karenanya, penting menjaga kesehatan sejak hamil untuk mencegah stunting.

KEHAMILAN

Kehamilan

Masa keemasan seorang ibu.



Periksa paling sedikit 6 kali oleh dokter atau bidan.

Kehamilan adalah masa menyenangkan dalam kehidupan seorang ibu yang menantikan kehadiran buah hatinya.

YANG AKAN DIALAMI

Selama masa kehamilan 9 bulan, Ibu akan naik berat badannya sebanyak 5 – 18 kg sesuai dengan status gizi ibu sebelum hamil (lihat halaman 108).

Bayi dalam kandungan juga akan berkembang, yaitu

- Usia kehamilan 1-3 bulan: Kira-kira sebesar jeruk nipis di akhir bulan ke-3.
- Usia kehamilan 4-6 bulan: Kira-kira sebesar jagung di akhir bulan ke-6.
- Usia kehamilan 7-9 bulan: Kira-kira sebesar buah semangka di akhir bulan ke-9.

YANG HARUS DILAKUKAN

- Segera periksa ke fasilitas pelayanan kesehatan, jika terlambat datang bulan 1 minggu.
- Periksa kehamilan ke fasilitas pelayanan kesehatan paling sedikit 6 kali.
- Makan dengan porsi lebih banyak atau lebih sering daripada sebelum hamil, dan cukup minum (lihat halaman 6, 16 & 38).
- Batasi konsumsi kopi, teh, dan minuman bersoda, hindari minum alkohol.
- Hindari merokok dan paparan asap rokok.
- Minum tablet tambah darah (TTD)/ multivitamin setiap hari selama kehamilan.
- Kenali dan cek tanda bahaya (lihat halaman 8, 17 & 20). Segera pergi ke rumah sakit jika dirujuk.
- Jangan minum obat yang tidak diresepkan oleh dokter.

MENGAPA HARUS DILAKUKAN

- Untuk mencegah masalah pada kehamilan.
- Agar bayi lahir cukup bulan pada usia kehamilan 38-40 minggu dengan berat badan lahir paling sedikit 2.5 kg dan panjang badan paling sedikit 48 cm.
- Untuk mempersiapkan ibu dan keluarga dalam menjalani kehamilan, melahirkan/ kelahiran dan perawatan bayi baru lahir.

Layanan kesehatan gratis selama kehamilan	
Pemeriksaan kehamilan oleh dokter, bidan dan tenaga kesehatan	Pemberian tablet tambah darah (TTD)/multivitamin bagi ibu hamil
Pemeriksaan status gizi	Pemeriksaan tekanan darah
Pemeriksaan laboratorium	Skrining kesehatan jiwa
Pemeriksaan kondisi bayi	Imunisasi Tetanus
USG 2 kali	Kelas ibu hamil

Lihat pencatatan dan pemeriksaan ibu hamil oleh tenaga kesehatan di halaman 96-108.

KIA 2024 Book 2.17.5 5 10/24/24 01:20

KEHAMILAN - TRIMESTER 1

Usia Kehamilan 1-3 Bulan (Trimester 1)

Masa Penting Pembentukan Bagian Tubuh Janin



Bulan ke-1
sebesar biji beras

Bulan ke-3
sebesar jeruk nipis

Selama 3 bulan pertama kehamilan, Ibu dan bayi akan mengalami berbagai perubahan.

YANG AKAN DIALAMI IBU

- Gejala mual, muntah dan mudah lelah. Pada masa ini juga rentan terjadi keguguran.
- Berat badan naik, yaitu sekitar 1-3 kg sesuai dengan grafik peningkatan berat badan (lihat halaman 108).

YANG AKAN DIALAMI BAYI

- Pada masa ini, bayi akan tumbuh mulai dari panjang 0.64 cm atau kira-kira sebesar biji beras, hingga 10 cm dan berat sekitar 28 gram atau kira-kira sebesar jeruk nipis.
- Bagian tubuh bayi, termasuk otak, mulai terbentuk.

YANG HARUS DILAKUKAN

- Periksa kehamilan ke dokter paling sedikit satu kali, termasuk USG dan laboratorium lengkap.
- Makan dengan porsi lebih kecil tapi sering, yang terbagi dalam 3 kali makanan utama dan 2 kali makanan selingan (lihat tabel porsi makan dan minum Ibu Hamil di bawah).
- Minum Tablet Tambah Darah (TTD)/ Multivitamin setiap hari selama kehamilan.
- Kenali dan cek tanda bahaya (lihat halaman 8). Jika mengalami tanda bahaya, segera pergi ke fasilitas pelayanan kesehatan.

MENGAPA HARUS DILAKUKAN

- Memastikan kesehatan ibu dan perkembangan bayi.
- Agar dapat dirawat dengan segera jika ditemukan kondisi yang membahayakan ibu dan bayi.

Porsi Makan dan Minum Ibu Hamil Untuk Kebutuhan Sehari

Bahan Makanan	12 minggu pertama	Keterangan per porsi
Nasi atau Makanan Pokok	5 porsi	• 100 g atau 3/4 gelas nasi • 125 g atau 3 buah jagung sedang • 210 g atau 2 kentang sedang • 120 g atau 1/2 potong singkong • 70 g atau 3 iris roti putih • 200 g atau 2 gelas mie basah
Protein Hewani Ikan, Telur, Ayam dll.	4 porsi	• 50 g atau 1 potong sedang ikan • 55 g atau 1 butir telur Ayam
Protein Nabati Tempe, Tahu, dll.	4 porsi	• 50 g atau 1 potong sedang tempe • 100 g atau 2 potong sedang tahu
Sayur-sayuran	4 porsi	100 g atau 1 mangkuk sayur matang tanpa kuah
Buah-buahan	4 porsi	• 100 g atau 1 potong sedang pisang • 100-190 g atau 1 potong besar pepaya
Minyak/Lemak	5 porsi	5 g atau 1 sendok teh, bersumber dari pengolahan makanan seperti menggoreng, menumis, santan, kemiri, mentega dan sumber lemak lainnya. Minyak/lemak termasuk santan yang digunakan dalam pengolahan, makanan digoreng, ditumis atau dimasak dengan santan.
Gula	2 porsi	10 g atau 1 sendok makan bersumber dari kue-kue manis, minum teh manis dan lain-lainnya

Batasi konsumsi garam paling banyak 1 sendok teh/hari dan minum air putih 8 - 12 gelas per hari.

Petugas kesehatan menjelaskan porsi makan disesuaikan dengan bahan lokal.

Lihat pencatatan dan pemeriksaan ibu hamil trimester 1 oleh tenaga kesehatan di halaman 99-101 .

Diisi oleh Ibu/Pendamping

Jangan Lupa Minum TTD/MMS

Untuk mencegah kekurangan darah, TTD/MMS harus diminum setiap hari selama kehamilan. Sebaiknya pada malam hari sebelum tidur untuk mengurangi rasa mual. Agar zat besi diserap lebih baik dalam tubuh, TTD/MMS sebaiknya dikonsumsi bersama makanan atau minuman yang mengandung vitamin C seperti buah-buahan. Hindari minum TTD/MMS bersama teh, kopi, susu dan obat maag yang dapat menghambat penyerapan zat besi.

Cara Mengisi Tabel TTD/MMS

Pendamping menuliskan bulan dan tahun, serta berikan tanda ✔ (centang) pada kotak sesuai tanggal Anda minum.

Nama Pendamping

Bulan ke	Usia kehamilan	Bulan/Tahun Contoh: 11/2024	Hubungan dengan Bumil 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1																																	
2																																	
3																																	
4																																	
5																																	
6																																	
7																																	
8																																	
9																																	
10																																	

KIA 2024 Book 2.17.5 6 10/24/24 01:20

Tanda Bahaya Pada Trimester 1

Jika mengalami tanda bahaya pada masa kehamilan, segera bawa ibu hamil periksa ke Puskesmas/Rumah Sakit.



Demam Tinggi.



Nyeri perut hebat.



Mual dan muntah hebat.



Perdarahan.



Sakit saat kencing atau keluar keputihan atau gatal di daerah kemaluan.

Masalah Lain Pada Kehamilan



Batuk lama (lebih dari 2 minggu).



Demam, menggigil dan berkeringat. Bila ibu berada di daerah endemis malaria, menunjukkan adanya gejala penyakit malaria.



Diare berulang.



Jantung berdebar- debar atau nyeri di dada.



Sulit tidur dan cemas berlebihan.

Perawatan Sehari-hari Ibu Hamil

1. Menjaga kebersihan diri dengan mencuci tangan pakai sabun dan dibilas dengan air bersih yang mengalir, mandi, dan mengganti pakaian secara teratur
2. Istirahat cukup dengan tidur malam paling sedikit 6-7 jam dan tidur siang selama 1-2 jam.
3. Merangsang pertumbuhan bayi dengan sering berbicara pada bayi, dan melakukan sentuhan pada perut ibu.
4. Hubungan suami istri selama hamil boleh dilakukan selama kondisi kehamilan sehat.

Hal-hal yang Tidak Boleh Dilakukan Ibu Selama Kehamilan



Minum obat tanpa resep dokter.



Aktivitas berat yang membuat ibu kelelahan.



Merokok atau terpapar asap rokok.



Minum minuman beralkohol dan jamu.



Stres berlebihan.



Tidur telentang lebih dari 10 menit pada trimester 2 & 3, untuk menghindari kekurangan oksigen pada bayi.

Aktivitas Fisik yang Tidak Boleh Dilakukan Ibu Selama Hamil



Jongkok terlalu lama.



Melompat.



Risiko keseimbangan.



Membungkuk tanpa pegangan.



Mengejan.



Pada Trimester 1 ibu dapat melakukan latihan fisik, seperti pemanasan dan peregangan, senam panggul, pendinginan dan peregangan.


KEHAMILAN - TRIMESTER 1 & 2

Lembar Pemantauan Ibu Hamil (Diisi oleh ibu)

Trimester I & II

Beri tanda (✔) centang setiap periksa ke dokter dan cek kondisi mingguan Ibu. Jika mengalami kondisi di bawah ini, segera periksa ke Puskesmas/Rumah Sakit.

Cek kondisi mingguan Ibu dan beri tanda (✔) centang jika mengalami kondisi dalam di bawah ini, segera periksa ke Puskesmas/Rumah Sakit.



		Pelayanan Kesehatan		Pemantauan Mingguan			Pemantauan Mingguan					
												
	Minggu Kehamilan	Pemeriksaan kehamilan	Kelas ibu hamil	Demam lebih dari 2 hari	Pusing/sakit kepala berat	Sulit tidur/ cemas berlebih	Risiko TB Batuk lebih dari 2 minggu atau kontak serumah dengan penderita TB	Gerakan bayi Tidak ada atau Kurang dari 10x dalam 12 jam setelah minggu ke-24.	Nyeri perut hebat	Keluar cairan dari jalan lahir Sangat banyak atau berbau	Sakit saat kencing Atau keluar keputihan atau gatal di daerah kemaluan	Diare berulang
TRIMESTER 1	4											
	5											
	6											
	7											
	8											
	9											
	10											
	11											
	12											
TRIMESTER 2	13											
	14											
	15											
	16											
	17											
	18											
	19											
	20											
	21											
	22											
	23											
	24											

KIA 2024 Book 2.17.5 8 10/24/24 01:20

KEHAMILAN - TRIMESTER 2 & 3

Lembar Pemantauan Ibu Hamil (Diisi oleh ibu)

Beri tanda (✔) centang setiap periksa ke dokter dan cek kondisi mingguan Ibu. Jika mengalami kondisi di bawah ini, segera periksa ke Puskesmas/Rumah Sakit.

		Pelayanan Kesehatan		Pemantauan Mingguan		
						
	Minggu Kehamilan	Pemeriksaan kehamilan	Kelas ibu hamil	Demam lebih dari 2 hari	Pusing/sakit kepala berat	Sulit tidur/ cemas berlebih
TRIMESTER 2	25					
	26					
	27					
TRIMESTER 3	28					
	29					
	30					
	31					
	32					
	33					
	34					
	35					
	36					
	37					
	38					
	39					
	40					
	41					
	42					

Trimester II & III

Cek kondisi mingguan Ibu dan beri tanda (✔) centang jika mengalami kondisi dalam di bawah ini, segera periksa ke Puskesmas/Rumah Sakit.

Pemantauan Mingguan					
					
Risiko TB Batuk lebih dari 2 minggu atau kontak serumah dengan penderita TB	Gerakan bayi Tidak ada atau Kurang dari 10x dalam 12 jam setelah minggu ke-24.	Nyeri perut hebat	Keluar cairan dari jalan lahir Sangat banyak atau berbau	Sakit saat kencing Atau keluar keputihan atau gatal di daerah kemaluan	Diare berulang

KIA 2024 Book 2.17.5 9 10/24/24 01:20

KEHAMILAN - TRIMESTER 1

Kesehatan Jiwa Ibu Hamil



Selama kehamilan Ibu dapat mengalami berbagai gejolak emosi, seperti mudah sedih, mudah marah, stres, cemas, dan depresi. Hal ini akan mempengaruhi kesehatan fisik dan emosi ibu hamil, serta perkembangan bayi dalam kandungannya.

Kenali gejala gangguan kesehatan jiwa agar Ibu mendapat perawatan yang tepat, antara lain

- Ketegangan mental, berupa kecemasan dan rasa khawatir yang berlebihan.
- Ketegangan fisik seperti gelisah, gemetar, tidak dapat rileks, ketegangan otot, dan sakit kepala.
- Berdebar, berkeringat, sesak napas, kepala terasa ringan, serta keluhan tidak nyaman di perut bagian atas sekitar ulu hati.
- Merasa lelah berkepanjangan, tapi sulit untuk tidur.
- Mudah tersinggung dan marah.
- Mengalami perubahan hubungan dengan suami.

YANG HARUS DILAKUKAN

Ibu tidak bisa menjalani kehamilan sendiri dan membutuhkan dukungan suami dan keluarga. Jaga kesehatan jiwa Ibu selama kehamilan dengan

- Tidur cukup
- Makan makanan bergizi
- Pergi ke Puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan untuk melakukan pemeriksaan masalah kesehatan jiwa.
- Suami atau keluarga mendampingi, serta memberi perhatian dan bantuan yang dibutuhkan Ibu.

Kesehatan jiwa yang baik selama kehamilan adalah kunci untuk proses melahirkan yang sehat, dan awal yang baik bagi kesehatan fisik maupun mental ibu dan bayi.

Ikuti Kelas Ibu Hamil



Dengan mengikuti kelas ibu hamil, ibu bisa mempersiapkan tubuh dan mental untuk kelancaran proses melahirkan. Selain itu juga mendapatkan dukungan dari ibu-ibu lain, serta memperoleh informasi tentang kehamilan, proses melahirkan, perawatan masa nifas, perawatan bayi baru lahir, kebutuhan dan pemenuhan gizi serta pelayanan kesehatan yang diterima.

Untuk jadwal dan tempat pelaksanaan Kelas ibu hamil tanyakan pada petugas kesehatan, dan minta suami mengikuti paling sedikit 1 kali.

Tanyakan pada petugas kesehatan jadwal dan tempat pelaksanaan Kelas Ibu Hamil.

Absensi Kehadiran Kelas Ibu Hamil (Diisi oleh ibu)

No.	Tanggal	Tanggal, Nama & Paraf Kader
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		

KIA 2024 Book 2.17.5 10 10/24/24 01:20

Usia Kehamilan 4-6 Bulan (Trimester 2)

Saatnya Mulai Merencanakan Kelahiran



Bulan ke-4
sebesar apel



Bulan ke-6
sebesar jagung

YANG AKAN DIALAMI IBU

- Gejala yang dirasakan pada awal kehamilan mulai berkurang.
- Kenaikan berat badan sesuai dengan status gizi ibu sebelum hamil, yaitu sekitar 4 – 8 kg.
- Mulai merasakan gerak bayi, seperti menendang, pada usia kehamilan 5 bulan.

YANG HARUS DILAKUKAN

- Periksa kehamilan ke dokter atau bidan paling sedikit dua kali.
- Pantau gerak bayi.
- Makan dengan porsi lebih kecil tapi sering, yang terbagi dalam 3 kali makanan utama ditambah dengan 1-2 kali makanan kudapan dalam sehari (lihat tabel porsi makan dan minum Ibu Hamil di bawah).
- Minum Tablet Tambah Darah (TTD)/ Multivitamin setiap hari selama kehamilan.
- Kenali dan cek tanda bahaya (lihat halaman 17). Jika mengalami tanda bahaya, segera pergi ke fasilitas pelayanan kesehatan.
- Mulai merencanakan proses melahirkan atau kelahiran melalui diskusi dengan tenaga kesehatan.

YANG AKAN DIALAMI BAYI

Fungsi organ dan tubuh bayi berkembang, dimana bayi akan tumbuh mulai dari panjang 12.5 cm atau kira-kira sebesar apel sampai 34 cm dan berat sekitar 1000 gram, atau kira-kira sebesar jagung di akhir bulan ke 6.

MENGAPA HARUS DILAKUKAN

- Untuk memastikan ibu tetap sehat dan pertumbuhan bayi sesuai tahapannya.
- Agar ibu dan keluarga sudah memiliki perencanaan proses melahirkan/kelahiran sejak jauh hari.

Porsi Makan dan Minum Ibu Hamil Untuk Kebutuhan Sehari

Bahan Makanan	12-40 minggu	Keterangan per porsi
Nasi atau Makanan Pokok	6 porsi	• 100 g atau 3/4 gelas nasi • 125 g atau 3 buah jagung sedang • 210 g atau 2 kentang sedang • 120 g atau 1/2 potong singkong • 70 g atau 3 iris roti putih • 200 g atau 2 gelas mie basah
Protein Hewani Ikan, Telur, Ayam dll.	4 porsi	• 50 g atau 1 potong sedang ikan • 55 g atau 1 butir telur Ayam
Protein Nabati Tempe, Tahu, dll.	4 porsi	• 50 g atau 1 potong sedang tempe • 100 g atau 2 potong sedang tahu
Sayur-sayuran	4 porsi	100 g atau 1 mangkuk sayur matang tanpa kuah
Buah-buahan	4 porsi	• 100 g atau 1 potong sedang pisang • 100-190 g atau 1 potong besar pepaya
Minyak/Lemak	5 porsi	5 g atau 1 sendok teh, bersumber dari pengolahan makanan seperti menggoreng, menumis, santan, kemiri, mentega dan sumber lemak lainnya. Minyak/lemak termasuk santan yang digunakan dalam pengolahan, makanan digoreng, ditumis atau dimasak dengan santan.
Gula	2 porsi	10 g atau 1 sendok makan bersumber dari kue-kue manis, minum teh manis dan lain-lainnya

Batasi konsumsi garam paling banyak 1 sendok teh/hari dan minum air putih 8 - 12 gelas per hari.

Petugas kesehatan menjelaskan porsi makan disesuaikan dengan bahan lokal.

KEHAMILAN - TRIMESTER 2

Tanda Bahaya Pada Trimester 2


Jika mengalami tanda bahaya pada masa kehamilan, segera bawa ibu hamil periksa ke Puskesmas/Rumah Sakit.



Demam Tinggi.



Muntah darah.



Napas pendek dan jantung berdebar kencang.



Nyeri perut hebat.



Pandangan kabur.



Perdarahan.



Perdarahan atau keluar cairan dari jalan lahir yang sangat banyak atau berbau.




Pusing/sakit kepala berat.



Sakit saat kencing atau keluar keputihan atau gatal di daerah kemaluan

KIA 2024 Book 2.17.5 11 10/24/24 01:20

Persiapan Melahirkan (Diisi oleh ibu)



Demi kelancaran proses melahirkan, persiapan harus dilakukan jauh-jauh hari, yaitu mulai trimester kedua. Beri tanda (✓) centang hal-hal yang sudah Ibu lakukan di bawah ini.


- ☐ Saya sudah menanyakan kepada bidan dan dokter tanggal perkiraan proses melahirkan, Tanggal ..... Bulan ..... Tahun .....
- ☐ Saya sudah meminta suami atau keluarga untuk mendampingi saat periksa kehamilan dan proses melahirkan.
- ☐ Saya sudah mempersiapkan tabungan atau dana cadangan untuk biaya proses melahirkan dan biaya lainnya.
- ☐ Saya sudah memperoleh Kartu JKN dan mendaftarkan diri ke kantor BPJS Kesehatan setempat, atau bertanya ke petugas Puskesmas.
- ☐ Saya sudah meminta proses melahirkan dilakukan oleh bidan/dokter di Puskesmas, Rumah Sakit atau Klinik Bersalin.
- ☐ Saya sudah menyiapkan KTP, Kartu Keluarga, dan keperluan lainnya untuk ibu dan bayi yang akan dilahirkan.
- ☐ Saya sudah menyiapkan lebih dari 1 orang yang memiliki golongan darah sama dan bersedia menjadi pendonor, jika diperlukan.
- ☐ Suami, keluarga dan masyarakat sudah menyiapkan kendaraan jika sewaktu-waktu diperlukan.
- ☐ Saya dan keluarga sudah menyepakati amanat proses melahirkan dalam stiker P4K dan sudah ditempelkan di depan rumah.
- ☐ Saya sudah merencanakan ikut Keluarga Berencana (KB) setelah bersalin. Metode KB yang saya pilih adalah ..... (lihat halaman 33).

Usia Kehamilan 7-9 Bulan (Trimester 3)

Persiapan Menyambut Kehadiran Si Kecil



Bulan ke-7
sebesar pepaya



Bulan ke-9
sebesar semangka

Selamat, Ibu sudah mencapai masa terakhir kehamilan! Sebentar lagi ibu, ayah, dan keluarga akan bertemu dengan anggota keluarga baru.

YANG AKAN DIALAMI IBU

- Sering merasa lelah, tidak nyaman, dan sulit tidur.
- Sering buang air kecil dan kakinya bengkak.
- Kenaikan berat badan sesuai dengan status gizi ibu sebelum hamil, yaitu sekitar 4 – 8 kg.

YANG AKAN DIALAMI BAYI

- Perkembangan fungsi organ dan tubuh bayi memasuki tahap akhir dan bayi siap dilahirkan.
- Bayi akan tumbuh mulai dari panjang 40 cm dan berat sekitar 1300 gram, atau kira-kira sebesar buah pepaya, hingga panjang paling sedikit 48 cm dan berat sekitar 2500 – 3999 gram, atau kira-kira sebesar buah semangka di akhir trimester 3.

YANG HARUS DILAKUKAN

- Periksa kehamilan paling sedikit tiga kali dan salah satunya harus oleh dokter, termasuk pemeriksaan USG dan laboratorium.
- Makan dengan porsi lebih kecil tapi sering, yang terbagi dalam 3 kali makanan utama ditambah dengan 1-2 kali makanan kudapan dalam sehari (lihat halaman 16) sama dengan trimester 2.
- Minum Tablet Tambah Darah (TTD)/ Multivitamin setiap hari selama kehamilan.
- Kenali dan cek tanda bahaya (lihat halaman 20). Jika mengalami tanda bahaya, segera pergi ke fasilitas pelayanan kesehatan.
- Kenali tanda awal melahirkan dan tanda bahaya pada melahirkan.
- Pelajari proses melahirkan.
- Diskusikan dengan tenaga kesehatan metode KB yang akan dipilih.
- Pelajari pentingnya Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan pemberian Air Susu Ibu (ASI).
- Ketahui hal-hal penting terkait perawatan bayi baru lahir.

MENGAPA HARUS DILAKUKAN

- Agar ibu mendapatkan pemeriksaan menyeluruh, untuk dapat menentukan di mana sebaiknya ibu melahirkan.
- Agar ibu dan keluarga siap untuk menghadapi proses kelahiran dan merawat bayi yang dilahirkan.

Lihat pencatatan dan pemeriksaan ibu hamil trimester 3 oleh tenaga kesehatan di halaman 102-106.

MITOS Minyak dan makanan pedas dapat mempercepat kelahiran.


FAKTA Mitos ini tidak terbukti secara ilmiah ya, Bu.
Yang terpenting adalah menjaga pola makan seimbang dan memenuhi kebutuhan gizi agar ibu dan bayi tetap sehat selama proses melahirkan.

Ibu juga bisa menanyakan ke kader atau bidan soal makanan dan minuman yang harus dikonsumsi.

KIA 2024 Book 2.17.5 12 10/24/24 01:20

Tanda Bahaya Pada Trimester 3

Jika mengalami tanda bahaya pada masa kehamilan, segera bawa ibu hamil periksa ke Puskesmas/Rumah Sakit.



Gerakan bayi tidak ada/kurang dari 10 kali dalam 12 jam.



Ketuban pecah namun tidak ada kontraksi.



Nyeri perut hebat di antara kontraksi.




Perdarahan hebat.



Pusing/sakit kepala berat.

Melahirkan

Saatnya Sambut Kehadiran Sang Buah Hati



Proses melahirkan harus dilakukan di Puskesmas, Rumah Sakit atau Klinik Bersalin, sehingga jika terjadi masalah dapat ditangani segera.

Masa yang dinanti-nanti telah tiba! Setelah melalui masa kehamilan 9 bulan lebih, kini saatnya mempersiapkan kelahiran si kecil dengan baik.

YANG AKAN DIALAMI

- Ibu akan melahirkan idealnya pada usia kehamilan 38-40 minggu.
- Ketika proses melahirkan dimulai, Ibu akan mengalami pembukaan jalan lahir, keluarnya lendir bercampur darah, merasakan mulas-mulas yang teratur, semakin sering dan semakin lama.

YANG HARUS DILAKUKAN

- Pergi ke Puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan perencanaan melahirkan, bila ibu merasakan tanda awal melahirkan.
- Siapkan pendamping proses melahirkan dan apa saja yang perlu dibawa ibu.
- Ibu dan bayi dirawat dalam satu ruangan jika kondisi keduanya baik.
- Ibu dan bayi dirawat di puskesmas, Rumah Sakit atau klinik bersalin paling sedikit 24 jam setelah melahirkan normal.
- Lakukan perawatan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) atau kontak kulit ke kulit antara ibu dengan bayinya segera setelah melahirkan sampai paling sedikit 1 jam.

MENGAPA HARUS DILAKUKAN

- Melahirkan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk mempercepat penanganan yang tepat, jika terjadi masalah pada saat melahirkan.
- Kontak kulit ke kulit dengan bayi penting untuk menjaga kehangatan bayi, membangun ikatan kasih sayang antara ibu dan anak (bonding), serta awal keberhasilan menyusui, dimana bayi mendapat Air Susu Ibu pertama (Kolostrum) untuk menjaga kekebalan tubuhnya.
- Ibu dan bayi tetap dirawat paling sedikit 24 jam untuk pemantauan kesehatan dan tanda bahaya.

Lihat pencatatan dan pemeriksaan persiapan ibu melahirkan oleh tenaga kesehatan di halaman 110-115.

KIA 2024 Book 2.17.5 13 10/24/24 01:20

MELAHIRKAN

Tanda Awal Proses Melahirkan



Keluar lendir bercampur darah dari jalan lahir atau keluar cairan ketuban dari jalan lahir.



Perut mulas-mulas yang teratur, timbulnya semakin sering dan semakin lama.

Tanda Bahaya Pada Proses Melahirkan

Jika mengalami tanda bahaya pada proses melahirkan, petugas kesehatan segera rujuk ibu ke Rumah Sakit.



Air ketuban hijau dan berbau.



Ibu gelisah atau mengalami kesakitan yang hebat.




Ibu mengalami kejang.



Ibu tidak kuat mengejan.



Perdarahan lewat jalan lahir



Tali pusat atau tangan bayi keluar dari jalan lahir.


KIA 2024 Book 2.17.5 14 10/24/24 01:20

Proses Melahirkan (Diisi oleh ibu)



- ☐ Tanda-tanda akan bersalin didahului dengan mulas teratur, semakin lama semakin kuat.
- ☐ Pada kehamilan pertama, biasanya bayi baru lahir setelah 12 jam sejak mulas-mulas. Pada kehamilan kedua dan berikutnya, biasanya bayi lahir lebih cepat dibandingkan anak pertama.
- ☐ Ibu berhak memilih didampingi atau tidak, dan siapa pendampingnya.
- ☐ Ibu berhak memilih posisi proses melahirkan yang diinginkan, diskusikan dengan petugas posisi yang aman.
- ☐ Jika terasa ingin buang air besar, segera beritahu petugas.
- ☐ Untuk mengurangi rasa sakit ketika bersalin, tarik nafas melalui hidung dan keluarkan lewat mulut.
- ☐ Setelah bayi lahir, lakukan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dengan cara kontak kulit ke kulit antara bayi dan ibunya segera setelah kelahiran dan berlangsung selama 1 jam.

Inisiasi Menyusu Dini (IMD)



Bayi yang baru lahir harus segera mendapatkan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) melalui kontak kulit ke kulit dengan ibunya dalam waktu 1 jam setelah kelahiran. Setelah menyusu pada jam pertama, bayi biasanya akan tidur panjang dan menyusu lagi jika lapar.

Manfaat IMD pada ibu dan bayi adalah sebagai berikut:

- Menciptakan rasa tenang dan nyaman pada ibu dan bayi melalui kontak kulit ke kulit.
- Kandungan kolostrum dalam ASI mengandung gizi dan antibodi dari ibu, sehingga bisa meningkatkan daya tahan tubuh dan ketahanan hidup bayi,
- Meningkatkan kesehatan sistem pencernaan bayi, sehingga mengurangi risiko diare pada bayi.
- Menstimulasi produksi ASI dan meningkatkan durasi menyusui.
- Mengurangi pendarahan karena gerakan bayi di atas perut ibu dapat membantu menstimulasi kontraksi rahim.
- Mempercepat proses pelepasan plasenta.

KIA 2024 Book 2.17.5 15 10/24/24 01:20

Setelah Melahirkan

Periksa ke Dokter/Bidan/Perawat Paling Sedikit 4 Kali



Pertama	Kedua	Ketiga	Keempat
6 jam - 2 hari setelah melahirkan	3 - 7 hari setelah melahirkan	8 - 28 hari setelah melahirkan	29 - 42 hari setelah melahirkan

Selamat, Ibu sudah melahirkan si kecil! Pada masa ini, ibu ayah dan keluarga perlu memperhatikan kesehatan ibu dan bayi,

YANG AKAN DIALAMI

- Masa pemulihan ibu setelah hamil dan melahirkan, dimana ibu akan mengalami banyak perubahan fisik, hormonal, maupun emosional.
- Kolostrum (ASI pertama) mulai keluar dengan jumlah sekitar 5-10 ml pada hari pertama kelahiran. Lalu ASI akan semakin bertambah jumlahnya dari hari ke hari, seiring dengan semakin seringnya ibu menyusui bayinya.

YANG HARUS DILAKUKAN

- Ibu dan bayi periksa ke fasilitas pelayanan kesehatan setidaknya 4 kali, yaitu
  - 1 kali pada 6 – 48 jam
  - 1 kali pada 3 – 7 hari
  - 1 kali pada 8 – 28 hari
  - 1 kali untuk ibu saja pada 29 – 42 hari
- Konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) untuk mencegah kekurangan darah (anemia).
- Kenali dan cek tanda bahaya setelah melahirkan, dan segera ke fasilitas pelayanan kesehatan, jika merasakan tanda bahaya.
- Periksa ke fasilitas pelayanan kesehatan, jika dalam 2 minggu atau lebih setelah melahirkan, ibu merasa mudah murung, sedih, depresi, dan gejala gangguan jiwa lainnya.
- Dalam sehari, makan lebih banyak dan lebih sering, terdiri dari 3 kali makanan utama dan 1-2 kali makanan kudapan, sesuai dengan anjuran porsi makan (lihat tabel porsi makan dan minum Ibu Menyusui).
- Makan makanan beragam, terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, sayur dan buah, serta cukup minum.
- Segera menemui tenaga kesehatan atau konselor menyusui, jika mengalami masalah dalam menyusui.
- Ayah dan keluarga berbagi peran pengasuhan serta membantu ibu merawat bayi dan menyusui, seperti memijat dengan lembut punggung ibu.

MENGAPA HARUS DILAKUKAN

- Untuk memantau kesehatan ibu setelah melahirkan hingga 42 hari setelah melahirkan, memeriksa adanya infeksi, perdarahan setelah melahirkan, atau masalah kesehatan lainnya,
- Memenuhi kebutuhan makan ibu, agar ibu dapat memberikan ASI kepada bayinya dengan sepenuhnya.

Lihat pencatatan dan pemeriksaan setelah ibu melahirkan oleh tenaga kesehatan di halaman 116-120.

Tanda Bahaya Pada Ibu Setelah Melahirkan (Nifas)

Kematian ibu tertinggi terjadi pada masa setelah melahirkan.


Jika mengalami tanda bahaya pada masa setelah melahirkan, segera bawa ibu periksa ke Puskesmas/Rumah Sakit.



Demam lebih dari 2 hari.



Ibu terlihat sedih, murung dan menangis tanpa sebab (depresi).



Keluar cairan berbau dari jalan lahir.



Nyeri ulu hati, mual muntah, sakit kepala, pandangan kabur, kejang dengan atau tanpa bengkak pada kaki, tangan dan wajah.




Payudara bengkak, merah disertai rasa sakit.



Perdarahan lewat jalan lahir.

Hal-hal yang Tidak Boleh Dilakukan oleh Ibu Setelah Melahirkan dan Selama Pemulihan.



Membuang ASI yang pertama keluar (kolostrum) karena sangat berguna untuk kekebalan tubuh anak.




Membersihkan payudara dengan alkohol/povidon iodine/obat merah atau sabun karena bisa terminum oleh bayi.



Latihan fisik posisi telungkup.





Mengikat perut terlalu kencang.



Menempelkan daun-daunan pada kemaluan karena akan menimbulkan infeksi.

Lembar Pemantauan Ibu Nifas (Diisi oleh ibu) A

Cek kondisi Ibu setiap hari dan beri tanda (✓) centang jika mengalami kondisi dalam kotak-kotak di bawah ini. Segera ke Puskesmas untuk periksa.




	Pelayanan Kesehatan			Pemantauan Harian						
										
Hari ke-	Pemeriksa-an nifas.	Konsumsi vitamin A.	Konsumsi tablet tambah darah.	Pemenuhan gizi sesuai kebutuhan.	Masalah kesehatan jiwa.	Demam > 38°C.	Sakit kepala.	Pandangan kabur.	Nyeri ulu hati.	Tanggal, Nama & Paraf Kader/ Nakes
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										

15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										

SETELAH MELAHIRKAN

Lembar Pemantauan Ibu Nifas (Diisi oleh ibu) B

Cek kondisi Ibu setiap hari dan beri tanda (✓) centang jika mengalami kondisi dalam kotak-kotak di bawah ini. Segera ke Puskesmas untuk periksa.

	Pelayanan Kesehatan			Pemantauan Harian						
										
Hari ke-	Jantung berdebar.	Keluar cairan dari jalan lahir.	Napas pendek/ terengah-engah.	Payudara bengkak/ nyeri/ada benjolan.	Gangguan buang air kecil.	Area kelamin bengkak/ nyeri/luka.	Darah nifas berbau/ mengalir/ perut nyeri.	Pendarahan > 2 pembalut kurun 5 menit.	Keputihan.	Tanggal, Nama & Paraf Kader/ Nakes
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										

15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										

SETELAH MELAHIRKAN

10/24/24 01:20

KIA 2024 Book 2.17.5 18 10/24/24 01:20

Depresi Setelah Melahirkan



Setelah melahirkan, ibu dapat mengalami depresi atau yang biasa disebut *postpartum depression*, sebagai berikut:

BABY BLUES

Terjadi setelah melahirkan dan memuncak dalam beberapa hari hingga 2 minggu. **Gejala:** Suasana perasaan tidak stabil, mudah menangis, sulit tidur, mudah cemas dan mudah tersinggung.

DEPRESI SETELAH MELAHIRKAN

- Terjadi dalam 2 minggu setelah melahirkan, secepatnya 48-72 jam pertama pasca melahirkan. **Gejala:** Mudah tersinggung, perubahan perasaan dan perilaku yang tidak serasi/sesuai, gangguan tidur, berhalusinasi dan mengalami waham/delusi.
- Terjadi sekitar 4 minggu setelah melahirkan, paling sedikit selama 2 minggu berturut-turut. **Gejala:** Merasa sangat sedih, tertekan, sulit konsentrasi, gangguan tidur, tidak selera makan/banyak makan, mudah tersinggung, mudah marah, merasa lelah, tidak bergairah melakukan aktivitas harian, perasaan bersalah, khawatir tidak dapat menjadi ibu yang baik, pikiran untuk melukai diri/bayinya dan merasa menderita terhadap gejala yang dialami.

Pencegahan

- Ibu hamil dan setelah melahirkan beserta keluarga dapat mengenali dan memahami tanda-tanda atau gejala-gejala masalah kesehatan jiwa.
- Pada saat hamil, kontrol dengan teratur ke bidan atau dokter sesuai jadwal.
- Mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi termasuk vitamin.
- Deteksi dini faktor risiko pada ibu hamil atau pasca melahirkan beserta keluarga.
- Dukungan dan perhatian dari suami, keluarga dan teman selama masa kehamilan dan pasca melahirkan.

Penanganan

- Dukungan keluarga, terutama suami, sehingga tidak hanya bayinya saja yang diperhatikan.
- Ada yang membantu mengasuh bayinya.
- Mengajak bicara mengenai perasaannya.
- Program kunjungan rumah oleh tenaga kesehatan.
- Melakukan konseling dengan tenaga kesehatan.
- Terapi dengan obat-obatan.

Keluarga Berencana (Diisi oleh ibu)



Untuk mewujudkannya, penting untuk memiliki kesehatan fisik dan mental dalam kondisi layak untuk hamil, yaitu

- Usia 20-35 tahun dan jarak kehamilan 2 tahun untuk mengurangi angka kematian ibu melahirkan.
- Jumlah anak kurang dari 3 untuk kecukupan gizi dan perawatan anak.

MERENCANAKAN KEHAMILAN YANG SEHAT

Kehamilan yang sehat adalah kehamilan yang direncanakan, diinginkan, dan dijaga perkembangannya dengan baik. Tujuannya agar ibu dapat menjalani kehamilan dan melahirkan yang sehat dan aman, serta melahirkan bayi yang sehat.

KELUARGA BERENCANA (KB)

Program KB (keluarga berencana) pasca melahirkan mencakup pemanfaatan atau penggunaan alat kontrasepsi langsung sesudah melahirkan sampai 6 minggu atau 42 hari sesudah melahirkan. Prinsip pemilihan metode kontrasepsi yang digunakan tidak mengganggu produksi ASI dan sesuai dengan kondisi ibu.

☐ Mengapa Perlu Ikut ber KB?

- Mengatur jarak dan mencegah kehamilan, agar tidak terlalu dekat (paling sedikit 2 tahun setelah melahirkan.
- Mengatur jumlah anak agar ibu tidak terlalu sering melahirkan (sebaiknya tidak lebih dari tiga).
- Mencegah kehamilan yang tidak diinginkan.
- Menjaga dan meningkatkan kesehatan ibu, bayi dan balita.
- Ibu memiliki waktu dan perhatian yang cukup untuk dirinya sendiri, anak dan keluarga.

☐ Metode Kontrasepsi Jangka Panjang

- Metode Operasi Wanita (MOW), Metode Operasi Pria (MOP)
- Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)/ spiral, jangka waktu penggunaan bisa sampai 10 tahun.
- Implan (alat kontrasepsi bawah kulit), jangka waktu penggunaan 3 tahun.

☐ Non Metode Kontrasepsi Jangka Panjang

- Pil KB.
- Kondom.
- Kontrasepsi suntik 3 bulan diberikan setelah 6 minggu pasca melahirkan. Untuk ibu menyusui, tidak disarankan menggunakan KB suntik 1 bulan, karena akan mengganggu produksi ASI.

Pernyataan	Paraf Ibu
Bersedia menggunakan KB pasca salin	

KIA 2024 Book 2.17.5 19 10/24/24 01:20

Menyusui

Menjaga Kesehatan Fisik dan Mental Ibu Setelah Melahirkan



Menyusui bayi secara langsung dapat mempercepat proses pemulihan ibu setelah melahirkan.

Air susu ibu (ASI) mengandung semua gizi yang dibutuhkan oleh bayi untuk tumbuh kembang sehat serta menjaga daya tahan tubuhnya. Oleh karena itu, penting bagi Ibu untuk memberikan hanya ASI saja kepada bayi hingga usia 6 bulan, kemudian dilanjutkan hingga usia 2 tahun.

Namun ternyata, pemberian ASI lewat menyusui tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan si kecil, tapi juga ibu. Apa saja manfaat menyusui bagi ibu?

- Mencegah terjadinya kanker payudara.
- Mempercepat kembali ke berat badan semula, karena menyusui merupakan aktivitas yang menguras energi.
- Menjadi metode KB alami.
- Membantu mempercepat rahim kembali ke ukuran semula.
- Mencegah perdarahan setelah melahirkan.
- Memperkuat ikatan dengan bayi, yang dapat mengurangi rasa cemas dan perasaan takut tidak bisa menjadi ibu yang baik, serta menjaga kesehatan mental Ibu.

Dapatkan layanan konseling menyusui secara gratis di Puskesmas.

Pindai kode QR untuk mendapatkan layanan konsultasi online.


Ibu Menyusui (Diisi oleh ibu)


Menyusui bayi bermanfaat untuk pemulihan rahim dan kesehatan payudara Ibu, dan ASI adalah gizi terbaik bagi bayi.

☐ Cara Menyusui yang Benar

- Menyusui sesering mungkin atau semau bayi (8-12 kali sehari atau lebih.
- Bila bayi tidur lebih dari 3 jam, bangunkan, lalu susui.
- Susui sampai payudara terasa kosong, lalu pindah ke payudara sisi yang lain.
- Apabila bayi sudah kenyang, tetapi payudara masih terasa penuh/kencang, maka payudara perlu diperah, dan ASI disimpan. Hal ini bertujuan mencegah mastitis dan menjaga pasokan ASI.

☐ Posisi dan Pelekatan Menyusui yang Benar





Posisi

- Kepala dan badan bayi membentuk garis lurus.
- Wajah bayi menghadap payudara, hidung berhadapan dengan puting susu.
- Badan bayi dekat ke tubuh ibu.
- Ibu menggendong/mendekap badan bayi secara utuh.

Pelekatan

- Bayi dekat dengan payudara dengan mulut terbuka lebar.
- Dagu bayi menyentuh payudara.
- Bagian areola di atas lebih banyak terlihat dibanding di bawah mulut bayi.
- Bibir bawah bayi memutar keluar (dower).

☐ Posisi Menyusui Bayi Kembar





KIA 2024 Book 2.17.5 20 10/24/24 01:20

Cara Memerah dan Menyimpan ASI





- Cuci bersih dengan sabun cangkir/gelas kecil yang akan digunakan untuk wadah.
- Tuangkan air mendidih ke dalam cangkir dan diamkan beberapa menit untuk membunuh sebagian besar kuman.
- Buang air dari cangkir ketika akan digunakan.
- Untuk memerah kolostrum atau ASI pada hari-hari pertama gunakan wadah berupa sendok karena akan sulit mengumpulkan dalam cangkir.





- Letakkan ibu jari di atas puting dan areola payudara, sedangkan jari telunjuk dan jari tengah di bawahnya, di seberang ibu jari.
- Tekan payudara di belakang puting dan areola diantara ibu jari dan jari telunjuk.
- Tekan dan lepaskan sampai ASI mulai menetes. Tekan areola dari samping, untuk memastikan ASI keluar semua.
- Perah satu payudara setidaknya 3-5 menit, kemudian perah sisi lainnya, lalu ulangi kedua sisi. Ibu dapat berganti tangan jika lelah.
- Waktu untuk memerah ASI sekitar 20-30 menit.





- Simpan ASI pada suhu ruangan maksimal 6 jam di tempat paling dingin dalam ruangan atau kulkas.
- Jika menyimpan di beberapa wadah, beri label tanggal.
- Utamakan memberi ASI segar (bukan beku) segera setelah diperah, dalam waktu satu jam.
- Jangan merebus ASI atau memanaskannya dalam microwave, karena dapat merusak kandungan gizinya.
- ASI beku dicairkan perlahan di kulkas atau dibiarkan dalam wadah berisi air hangat, dan digunakan dalam waktu 24 jam.





- Tuang ASI untuk perkiraan 1 kali minum ke dalam cangkir.
- Bungkus bayi agar lengannya tidak membentur cangkir, dan gendong di posisi duduk tegak atau setengah tegak di pangkuan.
- Letakkan cangkir di bibir bawah bayi, dan tempelkan tepi cangkir ke bagian luar bibir atas bayi.
- Jangan menuangkan ASI ke dalam mulut bayi karena dapat masuk ke saluran pernapasan.
- Bayi tidak mau minum lagi jika sudah kenyang, tapi jika ASI perah belum habis, mungkin bayi butuh minum lebih sering.

Tempat Penyimpanan	Suhu	Lama Penyimpanan
ASI Baru Diperah Disimpan Dalam Cooler Bag	15 °C	24 jam
Dalam Ruangan (ASIP Segar)	27 °C s/d 32 °C	4 jam
	< 25 °C	6 - 8 jam
Kulkas	< 4 °C	48 - 72 jam (2 - 3 hari)
Freezer pada Lemari Es 1 Pintu	-15 °C s/d 0 °C	2 minggu
Freezer pada Lemari Es 2 Pintu	-20 °C s/d -18 °C	3 - 6 bulan

Catatan Simpan ASI Perah sebanyak 15-60ml per wadah untuk menghindari ASI Perah terbuang karena tidak habis diminum oleh bayi.
Hindari ASI Perah mengalami perubahan suhu yang terlalu ekstrem.

Porsi Makan dan Minum Ibu Menyusui Untuk Kebutuhan Sehari

Bahan Makanan	Ibu Menyusui 0 - 12 Bulan	Keterangan per porsi
Nasi atau Makanan Pokok	6 porsi	• 100 g atau ¾ gelas nasi • 125 g atau 3 buah jagung ukuran sedang • 210 g atau 2 kentang ukuran sedang • 120 g atau 1 ½ potong singkong • 70 g atau 3 iris roti putih • 200 g atau 2 gelas mie basah
Protein Hewani Ikan, Telur, Ayam dan Lainnya	4 porsi	• 50 g atau 1 potong sedang ikan • 55 g atau 1 butir telur Ayam
Protein Nabati Tempe, Tahu, dan Lainnya	4 porsi	• 50 g atau 1 potong sedang tempe • 100 g atau 2 potong sedang tahu
Sayur-sayuran	4 porsi	100 g atau 1 mangkuk sayur matang tanpa kuah
Buah-buahan	4 porsi	• 100 g atau 1 potong sedang pisang • 100-190 g atau 1 potong besar pepaya
Minyak/Lemak	6 porsi	5 g atau 1 sendok teh, bersumber dari pengolahan makanan seperti menggoreng, menumis, santan, kemiri, mentega dan sumber lemak lainnya. Minyak/lemak termasuk santan yang digunakan dalam pengolahan, makanan digoreng, ditumis atau dimasak dengan santan
Gula	2 porsi	10 g atau 1 sendok makan bersumber dari kue-kue manis, minum teh manis dan lain-lainnya
Minum Air Putih: 14 gelas/hari di 6 bulan pertama dan 12 gelas/hari pada 6 bulan kedua.		

Konsultasikan porsi makan kepada tenaga kesehatan, perhatikan Indeks Massa Tubuh.

KIA 2024 Book 2.17.5 21 10/24/24 01:20

0 - 6 Bulan

Berikan ASI Saja Sampai Usia 6 Bulan



Ibu, dukung pertumbuhan bayi Anda dengan memberinya hanya ASI saja hingga berusia 6 bulan.

Si kecil siap menjalani kehidupan baru di luar rahim Ibu. Masa ini adalah masa sangat penting dalam pertumbuhannya.

YANG AKAN DIALAMI

Bayi akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang pesat, ditandai dengan penambahan berat badan dan panjang badan yang cepat.

YANG HARUS DILAKUKAN

- Beri hanya ASI saja sampai usia 6 bulan.
- Jangan tambahkan air putih, makanan, minuman, obat, vitamin atau mineral, kecuali dianjurkan dokter atau tenaga kesehatan.
- Susui semau bayi dan hindari penggunaan botol susu atau dot.
- Temui tenaga kesehatan atau konselor menyusui, jika ibu mengalami masalah dalam menyusui bayi.
- Timbang berat badan, ukur panjang badan dan cek perkembangan bayi tiap bulan di Posyandu atau fasilitas kesehatan lainnya.
- Dapatkan imunisasi dasar lengkap sesuai usia (lihat halaman 124).
- Sering ajak anak berkomunikasi dan bermain untuk merangsang perkembangan sesuai usianya (lihat halaman 54 & 55).
- Pastikan bayi istirahat yang cukup.
- Cek kesehatan bayi secara rutin.

MENGAPA HARUS DILAKUKAN

- Meningkatkan ikatan antara ibu dan bayi.
- Bayi mendapat gizi cukup selama proses menyusui dan mencegah masalah gizi, seperti stunting.
- Mendukung perkembangan otak bayi, agar terbentuk sempurna dan meningkatkan kemampuan belajarnya.
- Imunisasi dasar melindungi bayi dari penyakit-penyakit yang dapat mengakibatkan kematian.

Pindai kode QR untuk mendapatkan layanan konsultasi online.

Ukuran Lambung Bayi Baru Lahir



Perilaku Menyusu Bayi

Frekuensi bayi menyusu meningkat sejalan dengan semakin banyaknya ASI yang keluar dan bertambahnya ukuran lambung. Berikut adalah perilaku menyusu bayi baru lahir

HARI PERTAMA

- Ukuran dan volume lambung bayi sebesar kelereng.
- Bayi menyusu sebanyak 5-12 kali dalam 24 jam pertama. Namun ini juga tergantung pada tipe bayi, kontak kulit ke kulit, dan rawat gabung bersama ibunya.

HARI KE-2 SAMPAI HARI KE-3

- Ukuran dan volume lambung bayi sebesar bola pingpong
- Frekuensi menyusu meningkat menjadi 10-12 kali, tapi masih belum stabil.

SATU MINGGU

- Ukuran dan volume lambung bayi sebesar telur ayam
- Frekuensi menyusu rata-rata sekitar 8 kali dalam 24 jam.
- Interval menyusu mungkin lebih lama karena kapasitas lambung bertambah.

SATU BULAN

- Ukuran dan volume lambung bayi sebesar telur bebek
- Frekuensi menyusu rata-rata 8-12 kali dalam 24 jam.

Selama menyusui, ibu harus selalu berada di dekat bayi agar dapat merespon saat bayi menunjukkan tanda lapar, tanggap dan mulai lebih banyak bergerak, memutar kepala, mengisap jari dan mengecap mulut.

Bayi Baru Lahir (0 - 28 Hari)



Satu bulan pertama kehidupan merupakan masa penting untuk mendukung kelangsungan hidup bayi.

YANG AKAN DIALAMI

- Bayi akan mengalami perubahan yang cepat, dari lingkungan yang terlindungi di dalam rahim ke dunia luar.
- Orang tua atau pengasuh berperan penting dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan bayi pada masa awal kehidupan
- Pola tidur bayi sampai dengan 16 jam dalam sehari.

YANG HARUS DILAKUKAN

- Pastikan bayi mendapat pemeriksaan dan pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan :
  - 0-6 jam setelah lahir
  - 6-48 jam setelah lahir
  - 3-7 hari setelah lahir
  - 8-28 hari setelah lahir
- Susui bayi dengan penuh kasih sayang, dekap dengan hangat, dan jalin hubungan kasih sayang dengan menatap dan mengajaknya bicara.
- Jaga bayi tetap hangat dan jaga kebersihan selama merawat bayi.
- Cek kesehatan bayi dan kenali tanda bahaya pada bayi baru lahir. Jika ada tanda bahaya, segera ke fasilitas pelayanan kesehatan.
- Pastikan bayi mendapat imunisasi hepatitis B (HB0) sebelum 24 jam, skrining Hipotiroid Kongenital (SHK) 48 - 72 jam setelah lahir, dan skrining Penyakit Jantung Bawaan (PJB) kritis 24-48 jam setelah lahir.
- Tetap berikan ASI saja selama 6 bulan, dan dilanjutkan hingga bayi berusia 2 tahun.
- Tips pola tidur bayi yang sehat
  - Sebaiknya bayi tidur terlentang.
  - Gunakan alas yang rata.
  - Jauhkan benda yang dapat menutupi kepala.
  - Gunakan kelambu.

MENGAPA HARUS DILAKUKAN

- Dua pertiga kematian balita di Indonesia terjadi di usia 1-28 hari pertama.
- Pemeriksaan dan pelayanan kesehatan dilakukan untuk memantau kesehatan bayi secara menyeluruh, agar dapat segera dilakukan penanganan apabila ditemukan adanya infeksi atau kondisi yang membahayakan bayi.
- Menjalin kedekatan dengan bayi penting untuk pertumbuhan dan perkembangannya yang terbaik.

Beri tanda ✔ (centang) jika si kecil sudah mendapat pemeriksaan dan pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan di Puskesmas pada:

☐ 0 - 6 jam setelah lahir. ☐ 6 - 48 jam setelah lahir. ☐ Hari 3 - 7 setelah lahir. ☐ Hari 8 - 28 setelah lahir.

Tanyakan kepada bidan/dokter/Perawat untuk penjelasan lebih lanjut terkait perawatan bayi baru lahir.


Lihat pencatatan dan pemeriksaan bayi baru lahir di halaman 122.

Tanda Bahaya Pada Bayi Umur 0 - 28 Hari


Jika bayi mengalami tanda bahaya, segera periksa ke bidan/dokter/perawat.



Demam/panas tinggi.



Diare.



Dingin.



Kejang.



Kulit dan mata kuning.




Lemah.




Menangis atau merintih terus menerus.



Muntah-muntah




Sesak napas.



Tali pusat kemerahan sampai dinding perut, berbau bernanah.



Tidak mau menyusu.






Tinja bayi saat buang air besar berwarna pucat.

Sunat pada bayi perempuan tidak mempunyai manfaat terhadap kesehatan dan berisiko tinggi bagi kesehatan bayi saat ini maupun masa yang akan datang.

Lembar Pemantauan Harian Bayi Umur 0 - 28 Hari (Diisi oleh ibu) _____ A

Cek kondisi bayi setiap hari dan beri tanda (✔) centang jika mengalami kondisi dalam kotak-kotak di bawah ini. Segera ke Puskesmas untuk periksa.

Hari ke-	 Sesak napas/napas cepat/dada tertarik ke dalam.	 Aktivitas tampak lemah/tidak bergerak/menangis/ merintih.	 Warna kulit tampak biru/memar di sekitar mulut/ tangan/kaki.	 Hisapan bayi lemah/tidak bergerak. Muntah susu/cairan hijau. Kencing < 6x/hari. Warna kencing kurang pekat.	 Kejang. Mata mendelik/tangan menari/mulut mencucu/menangis melengking.	 Suhu tubuh panas > 38,5°C/dingin 36,5 - 37,5°C.	Tanggal, Nama & Paraf Kader/ Nakes
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							

Napas Normal: 40 - 60x/menit.
Sesak/napas cepat/napas pelan/dada tertarik ke dalam: Napas < 40x/menit atau > 60x/menit.

10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							

Napas Normal: 40 - 60x/menit.
Sesak/napas cepat/napas pelan/dada tertarik ke dalam: Napas < 40x/menit atau > 60x/menit.




0 - 6 BULAN

KIA 2024 Book 2.17.5 23

10/24/24 01:20

Lembar Pemantauan Harian Bayi Umur 0 - 28 Hari (Diisi oleh ibu) _____ B

Cek kondisi bayi setiap hari dan beri tanda (✔) centang jika mengalami kondisi dalam kotak-kotak di bawah ini. Segera ke Puskesmas untuk periksa.

Hari ke-	 BAB > 48 jam setelah lahir/tidak ada anus/BAB keluar dari sekitar anus/BAB seperti dempul/BAB lebih sering dan lebih encer.	 Jumlah air kencing sedikit/tidak kencing selama 6 jam, warna kuning pekat, kecoklatan, atau warna lainnya.	 Tali pusat kemerahan di sekitar/bernanah/ berbau.	 Mata merah/ada kotoran/bernanah.	 Kulit ada bintil-bintil isi air/nanah.	 Belum dapat imunisasi Hepatitis BO/BCG.	Tanggal, Nama & Paraf Kader/ Nakes
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							

KIA 2024 Book 2.17.5 24

10/24/24 01:20

KIA 2024 Book 2.17.5 25 10/24/24 01:20

0 - 6 BULAN

Perawatan Bayi Umur 0 - 28 Hari (Diisi oleh ibu)

Setelah ibu membaca dan memahami informasi, tandai hal-hal berikut ini.

Cara Menjaga Bayi Tetap Hangat

- ☐ Mandikan bayi dengan air hangat 6 jam setelah lahir dengan syarat kondisi stabil.
  - Sebelum tali pusat lepas, mandikan bayi dengan dilap.
  - Setelah tali pusat lepas, bayi dapat dimandikan dengan dimasukkan ke dalam air. Hati-hati agar kepala tidak terendam.
  - Bersihkan kemaluan bayi dari depan ke belakang dengan kapas yang dibasahi air bersih atau handuk bersih basah.
- ☐ Beri pakaian dan selimuti setiap saat.
- ☐ Pakaikan topi, kaos kaki, kaos tangan jika dirasakan cuaca dingin.
- ☐ Segera ganti baju dan popok jika basah.
- ☐ Lakukan perawatan metode kanguru jika berat badan bayi < 2500 gram.
- ☐ Bidan/Perawat/Dokter menjelaskan perawatan metode kanguru.
- ☐ Usahakan bayi berada dalam lingkungan udara sejuk.
  - Jika menggunakan kipas angin, usahakan agar arah angin tidak langsung mengenai bayi.
  - Suhu AC sekitar 25 – 26°C.

Cara Merawat Tali Pusat

- ☐ Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum dan sesudah memegang bayi.
- ☐ Jangan memberikan apapun pada tali pusat.
- ☐ Rawat tali pusat terbuka dan kering.
- ☐ Jika kotor/basah, cuci dengan air bersih dan sabun, lalu keringkan.



Jika berat lahir <2500 gram atau usia kehamilan ≤ 37 minggu, bayi menggunakan Buku KIA Khusus Bayi Kecil.

Perawatan Metode Kanguru untuk Bayi Kecil

Bayi kecil atau bayi prematur (< 37 minggu), bayi berat lahir rendah (< 2500 gram) akan mendapatkan perawatan di Puskemas, Rumah Sakit atau Klinik Bersalin hingga kondisinya stabil dan diperbolehkan pulang ke rumah. Pelajari perawatan metode kanguru untuk menjaga kehangatan dan meningkatkan asupan ASI.



Posisi bayi pada perawatan metode kanguru.



Bayi pada perawatan metode kanguru.



Perawatan metode kanguru dengan kontak kulit ke kulit pada posisi tidur dan istirahat.



Ayah bergantian untuk perawatan metode kanguru.



Perawatan metode kanguru saat ibu beraktivitas.

Warna Tinja (Diisi oleh ibu)




Periksa warna tinja bayi setiap hari.

Periksa warna tinja bayi setiap hari hingga berumur 4 bulan, dan catat warna tinja saat berumur 2 minggu, 1 bulan dan 1-4 bulan.

Jika menemukan warna tinja lebih pucat mendekati nomor 1 sampai 3, segera bawa bayi ke dokter, karena ada kemungkinan bayi menderita sumbatan kandung empedu (Atresia Bilier).

Usia	2 Minggu	1 Bulan	2 - 4 Bulan
Tanggal (DD/MM/YYYY)			
Nomor Warna Tinja			



Perhatikan warna tinja bayi sampai berumur 4 bulan. Jika mata bayi masih kuning atau urin berwarna kuning keruh setelah usia 2 minggu, segera bawa bayi ke dokter.

KIA 2024 Book 2.17.5 26 10/24/24 01:20

Pola Asuh Bayi Baru Lahir Sampai Usia 18 Bulan









- Pengasuhan anak yang dilakukan dengan penuh kasih sayang, akan menimbulkan rasa aman, bahagia dan percaya.
- Tangisan menunjukkan bahwa bayi membutuhkan bantuan. Jangan biarkan bayi menangis lama karena akan membuat stres.
- Berikan ASI dengan penuh kasih sayang, dekaplah anak dengan hangat dan jalinlah hubungan kasih sayang sambil menatap dan mengajak bicara bayi. Perasaan yang tidak menyenangkan pada ibu akan dirasakan oleh bayi dan berdampak rasa tidak nyaman pada saat menyusu.
- Ajak anak bermain menggunakan permainan yang menstimulasi fisik, motorik dan kemampuan berpikir.
- Bayi usia 4-12 bulan perlu tidur 12-16 jam sehari (termasuk tidur siang).
- Bayi/Anak berusia <18 bulan tidak menggunakan gawai kecuali dalam bentuk video-chatting (video-call) dengan didampingi orang tua.
- Penggunaan gawai berlebih berdampak keterlambatan bicara dan bahasa, kurangnya interaksi, gampang marah/ledakan emosi (tantrum), gangguan kognitif (kurangnya kecerdasan).


Bawa anak ke Posyandu/Fasilitas Kesehatan setiap bulan untuk memantau pertumbuhan, perkembangan (sesuai jadwal), pelayanan imunisasi, vitamin A dan obat cacing.

Pengukuran Lingkar Lengan Atas (LiLA)

Anak usia 6-59 bulan diukur LiLA di Posyandu atau fasilitas kesehatan terdekat, dengan tujuan untuk skrining, deteksi dini dan rujukan masalah pertumbuhan balita. Di fasyankes akan dilakukan konfirmasi pengukuran Berat Badan, Panjang Badan atau Tinggi Badan dan Indeks Massa Tubuh oleh tenaga kesehatan.

- Pengukuran LiLA dilakukan di lengan yang tidak terlalu aktif dalam berkegiatan.
- Pengukuran LiLA dilakukan oleh orang tua/ pengasuh terlatih di rumah atau oleh kader/ tenaga kesehatan terlatih setiap bulan secara rutin di posyandu.
- Jika hasil pengukuran LiLA menunjukkan Gizi Kurang atau Gizi Buruk, harus dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh tenaga kesehatan untuk menentukan penanganan yang tepat.

Alat yang Digunakan



Lihat pencatatan dan pemeriksaan bayi oleh tenaga kesehatan di halaman 128.

KIA 2024 Book 2.17.5 27 10/24/24 01:20

Kelas Ibu Balita

Ibu, ayah, keluarga ikut kelas ibu balita.



Manfaat bagi Ibu dan Keluarga

- Memperoleh informasi penting terkait bagaimana melakukan pola asuh sesuai tahapan usia anak.
- Memperoleh informasi penting tentang tumbuh kembang, imunisasi, gizi, perawatan bayi, dan anak balita serta penyakit yang sering ditemukan.
- Mendapat teman berdiskusi, tukar pendapat, tukar pengalaman akan pemenuhan pelayanan kesehatan, gizi dan stimulasi pertumbuhan dan perkembangan.

Absensi Kehadiran Kelas Ibu Balita (Diisi oleh ibu)

No.	Tanggal	Tanggal, Nama & Paraf Kader/Nakes
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

No.	Tanggal	Tanggal, Nama & Paraf Kader/Nakes
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

Tanda Bahaya Pada Balita 29 hari – 5 tahun

Jika bayi mengalami tanda bahaya, segera periksa ke bidan/dokter/perawat.



Demam/panas tinggi.



Diare.



Kejang.




Muntah-muntah.



Pembengkakan yang nyeri di belakang telinga.



Pendarahan di hidung/kulit/BAB.



Sesak napas.



Tampak biru (sianosis).



Tidak bisa minum.

KIA 2024 Book 2.17.5 28 10/24/24 01:20

Lembar Pemantauan Mingguan Bayi 29 Hari - 3 Bulan (Diisi oleh ibu)

Cek kondisi bayi setiap minggu dan beri tanda (✓) centang jika mengalami kondisi dalam kotak-kotak di bawah ini. Segera ke Puskesmas untuk periksa.

Minggu ke-	Sesak napas/ cuping hidung kembang kempis/ dada tertarik ke dalam.	Batuk dengan bunyi grok-grok/mengi.	Suhu tubuh panas > 38,5°C/ada tanda pendarahan (mimisan/ gusi berdarah/ muntah kopi/BAB hitam).	BAB lebih sering/lebih encer, dengan mata cekung/ haus minum dengan lahap/diare disertai darah.	Jumlah air kencing sedikit/tidak kencing selama 6 jam, warna kuning pekat, kecoklatan, atau warna lainnya.	Warna kulit tampak biru/memar di sekitar mulut/ tangan/kaki.	Aktivitas tampak lemah/tidak bergerak/ menangis/ merintih.	Hisapan bayi lemah/ tidak bergerak. Muntah susu/cairan hijau. Kencing < 6x/hari. Warna kencing kurang pekat.	Tidak mau makan/ minum. Berat badan tidak naik sesuai pertumbuh-an.	Tanggal, Nama & Paraf Kader/ Nakes
5										
6										
7										
8										
9										

Perawatan Bayi Umur 29 Hari - 3 Bulan (Diisi oleh ibu)

Bawa bayi anda setiap bulan ke Posyandu/Puskesmas/Fasilitas Kesehatan untuk mendapat pelayanan:

- Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan.
- Ibu/Ayah/Keluarga mengikuti kelas Ibu Balita.
- Imunisasi (lihat halaman 124-125).

Manfaat Imunisasi	
BCG	Mencegah penyakit TBC.
Polio	Mencegah polio yang menyebabkan lumpuh layu pada tungkai dan atau lengan.
DPT-HB-Hib	Mencegah penyakit difteri yang menyebabkan penyumbatan jalan nafas, pertusis atau batuk rejan (batuk 100 hari), tetanus hepatitis B, dan pneumonia dan meningitis (radang selaput otak) karena bakteri Hib.
PCV	Mencegah penyakit pneumonia akibat bakteri pneumokokus.
RV (Rotavirus)	Mencegah diare berat yang menyebabkan dehidrasi dan kematian.

Pantau Tumbuh Kembang Bayi Anda

Dukung tumbuh kembang si kecil sesuai perkembangan anak seusianya dengan melakukan stimulasi dalam suasana aman, nyaman dan menyenangkan.

Stimulasi bayi pada rentang usia 29 hari - 3 bulan dengan:

- Peluk, cium, ayun bayi.
- Senyum, tatap mata, ajak bicara.
- Tirukan ocehan dan mimik bayi.
- Interaksi langsung untuk mengenalkan berbagai suara, bunyi, atau nyanyian.
- Gantung benda berwarna, berbunyi.
- Meraih, meraba, pegang mainan, angkat kepala.
- Gulingkan kanan-kiri, tengkurap-telentang.

Beri tanda ✓ (centang) pada kolom Ya/Tidak. Jika anak belum bisa melakukan salah satu dari hal berikut ini, segera bawa ke Puskesmas.

No.	Penanda Perkembangan Anak	Ya	Tidak
1	Bayi bisa mengangkat kepala mandiri hingga setinggi 45 derajat?		
2	Bayi bisa menggerakkan kepala dari kiri/kanan ke tengah?		
3	Bayi bisa melihat dan menatap wajah anda?		
4	Bayi bisa mengoceh spontan atau bereaksi dengan mengoceh?		
5	Bayi suka tertawa keras?		
6	Bayi bereaksi terkejut terhadap suara keras?		
7	Bayi membalas tersenyum ketika diajak bicara/tersenyum?		
8	Bayi mengenal ibu dengan penglihatan, penciuman, pendengaran, kontak?		

Lembar Pemantauan Bulanan Bayi 3 - 6 Bulan (Diisi oleh ibu)

Cek kondisi bayi setiap bulan dan beri tanda ✓ (centang) jika mengalami kondisi dalam kotak-kotak di bawah ini. Segera ke Puskesmas untuk periksa.

Bulan ke-	Sesak napas/ cuping hidung kembang kempis/ dada tertarik ke dalam.	Batuk dengan bunyi grok-grok/mengi.	Suhu tubuh panas > 38,5°C/ada tanda pendarahan (mimisan/ gusi berdarah/ muntah kopi/BAB hitam)	BAB lebih sering/lebih encer, dengan mata cekung/ haus minum dengan lahap/diare disertai darah.	Jumlah air kencing sedikit/tidak kencing selama 6 jam, warna kuning pekat, kecoklatan, atau warna lainnya.	Warna kulit tampak biru/memar di sekitar mulut/ tangan/kaki.	Aktivitas tampak lemah/tidak bergerak/ menangis/ merintih.	Hisapan bayi lemah/ tidak bergerak. Muntah susu/cairan hijau. Kencing < 6x/hari. Warna kencing kurang pekat.	Tidak mau makan/ minum. Berat badan tidak naik sesuai pertumbuh-an.	Tanggal, Nama & Paraf Kader/ Nakes
3										
4										
5										

Perawatan Bayi Umur 3 - 6 bulan (Diisi oleh ibu)

Bawa bayi anda setiap bulan ke Posyandu/ Puskesmas/Fasilitas Kesehatan untuk mendapat pelayanan:

- Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan.
- Ibu/Ayah/Keluarga mengikuti kelas Ibu Balita.
- Imunisasi (lihat halaman 124-125).

Lakukan perawatan gigi. Cara membersihkan gigi bayi:

1. Gendong atau pangku anak dengan satu tangan.
2. Bersihkan gusi anak secara perlahan dengan kain atau lap basah yang dilingkarkan pada jari telunjuk ibu.

Pantau Tumbuh Kembang Bayi Anda

Dukung tumbuh kembang si kecil sesuai perkembangan anak seusianya dengan melakukan stimulasi dalam suasana aman, nyaman dan menyenangkan.

Stimulasi bayi pada rentang usia 3 - 6 bulan dengan:

- Peluk, cium, pandang mata, senyum, bicara
- Mencari sumber suara.
- Bermain cilukba, melihat wajah di cermin.
- Memeluk, mengayun.
- Melihat, meraih.
- Mengamati benda kecil, benda bergerak.
- Mengambil benda kecil.
- Berguling-guling, duduk.

Beri tanda ✓ (centang) pada kolom Ya/Tidak. Jika anak belum bisa melakukan salah satu dari hal berikut ini, segera bawa ke Puskesmas.

No.	Penanda Perkembangan Anak	Ya	Tidak
1	Bayi bisa berbalik dari telungkup ke telentang?		
2	Bayi bisa mengangkat kepala secara mandiri hingga tegak 90 °?		
3	Bayi bayi bisa mempertahankan posisi kepala tetap tegak dan stabil?		
4	Bayi bisa menggenggam mainan kecil atau mainan bertangkai?		
5	Bayi bisa meraih benda yang ada dalam jangkauannya?		
6	Bayi bisa mengamati tangannya sendiri?		
7	Bayi berusaha memperluas pandangan?		
8	Bayi mengarahkan matanya pada benda-benda kecil?		
9	Bayi mengeluarkan suara gembira bernada tinggi atau memekik		
10	Bayi tersenyum ketika melihat mainan/gambar yang menarik saat bermain sendiri?		

KIA 2024 Book 2.17.5 30 10/24/24 01:20

6 - 12 BULAN

6 - 12 Bulan

Cegah Stunting dengan MPASI Kaya Protein Hewani



Awas bahaya stunting, karena dapat menyebabkan gagal pertumbuhan dan anak menjadi kurang cerdas.

Di usia 6-12 bulan bayi berkembang semakin pesat secara fisik dan mental, sehingga membutuhkan gizi lengkap terutama yang kaya protein hewani.

YANG AKAN DIALAMI

- Bayi mendapatkan pengalaman makan pertama kalinya dan beradaptasi dengan berbagai tekstur makanan sesuai usia.
- Bayi mulai tumbuh gigi disertai diare dan demam.
- Bayi mulai berbalik dari posisi telentang ke telungkup atau tengkurap dan menjaga kepala tetap tegak.
- Meraih benda di sekitarnya, menirukan bunyi, dan tersenyum melihat hal-hal yang menarik.
- Bayi menjelajah lingkungannya dengan merangkak di usia 8-9 bulan.

YANG HARUS DILAKUKAN

- Berikan MPASI yang kaya protein hewani.
- Latih bayi menyenangi suasana makan dan ibu perlu peka terhadap respons bayi.
- Berikan ASI hingga usia 2 tahun atau lebih.
- Cek perkembangan bayi tiap bulan di Posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan.
- Pastikan bayi mendapat vitamin A kapsul biru 1 kali setahun untuk daya tahan tubuhnya.
- Dapatkan Pemeriksaan Kesehatan Anak Terintegrasi (PKAT) di usia 6-7 bulan.
- Dapatkan imunisasi dasar lengkap sesuai usia (lihat halaman 124).
- Ajari bayi makan sendiri dengan sendok dan minum sendiri dengan gelas.
- Ajari bayi duduk, memegang benda kecil dengan 2 jari, serta berdiri dan berjalan dengan berpegangan.
- Ajak bayi main Cilukba dan bicara sesering mungkin.
- Cek kesehatan bayi dan kenali tanda bahaya. Segera ke fasilitas kesehatan jika bayi sakit atau mengalami tanda bahaya.

MENGAPA HARUS DILAKUKAN

- Mencegah stunting dan penyakit infeksi.
- Memastikan anak bisa bicara bahasa, bersosialisasi dan mandiri (lihat halaman 62-63).

Lihat pencatatan dan pemeriksaan bayi dan balita oleh tenaga kesehatan di halaman 130-154.

MPASI 6 - 12 Bulan

1 Air Susu Ibu (ASI)



2 Makanan Pokok



3 Kacang-kacangan



4 Susu Hewani dan Produk Turunannya



5 Daging-dagingan



6 Telur



7 Buah dan Sayuran Kaya Vitamin A



8 Buah dan Sayuran Lainnya



Di usia 6 hingga 12 bulan, makanan yang diberikan pada bayi harus mengandung sumber gizi lengkap, yang dibutuhkan untuk tumbuh kembang terbaik.

Perkenalkan makanan satu per satu sambil memperhatikan apakah anak memiliki alergi terhadap makanan tertentu. Pastikan cara memasak makanan direbus atau dikukus, serta hindari makanan yang digoreng, mengandung bahan pengawat dan tinggi gula dan garam.

Ibu bisa memulai dengan makanan bertekstur lunak dan lembut, seperti bubur pisang campur apel dan pir, bubur sup daging kacang merah atau puding kentang ayam dan telur. Kemudian, lanjutkan dengan makanan yang bertekstur lebih kasar tapi tetap lembut di usia 9-11 bulan, seperti sup daging cincang, nasi tim ikan kembung telur puyuh, dan tim bubur manado daging dan udang.

Pindai kode QR untuk mendapatkan resep MPASI anak usia 6-12 bulan

KIA 2024 Book 2.17.5 31 10/24/24 01:20

Pemenuhan Gizi Usia 6 - 24 Bulan

Melanjutkan pemberian ASI disertai Makanan Pendamping ASI (MPASI). Pemberian MPASI yang baik harus sesuai syarat berikut ini:

1. **Tepat waktu**
   MPASI diberikan saat ASI saja sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan gizi bayi. MPASI diberikan mulai usia 6 bulan.

2. **Cukup sesuai kebutuhan (adekuat)**
   MPASI yang diberikan dengan mempertimbangkan jumlah, frekuensi, konsistensi/tekstur/kekentalan dan variasi makanan. Variasi makanan dalam MPASI terdiri dari:
   - Makanan pokok: beras, biji-bijian, jagung, gandum, sagu, umbi, kentang, singkong, dan lain-lain.
   - Makanan sumber protein hewani: ikan, ayam, daging, hati, udang, telur, susu dan hasil olahannya. Pemberian protein hewani dalam MPASI diprioritaskan. Selain itu sumber protein nabati mulai diperkenalkan, yang terdapat dalam kacang-kacangan (protein nabati): kedelai, kacang hijau, kacang polong, kacang tanah, dan lain-lain.
   - Lemak diperoleh dari proses pengolahan misalnya dari penambahan minyak, santan, dan penggunaan protein hewani dalam MPASI.
   - Mulai diperkenalkan buah dan sayur mengandung vitamin A dan C: jeruk, mangga, tomat, bayam, wortel, dan lain-lain.

3. **Aman**
   - Perhatikan kebersihan makanan dan peralatan.
   - Mencuci tangan sebelum menyiapkan makanan dan sebelum memberikan makanan kepada anak.

4. **Diberikan dengan cara yang benar**
   - MPASI diberikan secara teratur (pagi, siang, sore/menjelang malam).
   - Lama pemberian makan maksimal 30 menit.
   - Lingkungan netral (tidak sambil bermain atau menonton TV).
   - Ajari anak makan sendiri dengan sendok dan minum dengan gelas.




Bayi 6 - 8 Bulan

DISARING

Makanan dibuat dengan disaring Tekstur makanan lumat dan kental. **Kebutuhan cairan:** 800 ml/hari (±3 gelas belimbing).

- Lanjutkan menyusui.
- Berikan 2 - 3 sdm bertahap hingga 1/2 mangkok berukuran 250 ml (125 ml) setiap kali makan. (125 ml).
- Berikan 2 - 3 kali makanan utama dan 1 - 2 kali makanan selingan setiap hari.
- Jumlah energi dari MPASI yang dibutuhkan per hari 200 kkal.




Bayi 9 - 11 Bulan

DICINCANG

Bahan makanan sama dengan untuk orang dewasa. Tekstur makanan dicincang. Perhatikan respons anak saat makan.

- Lanjutkan menyusui.
- Berikan 1⁄2 - 3⁄4 mangkok ukuran 250 ml (125 - 200 ml) setiap kali makan.
- Berikan 3 - 4 kali makanan utama dan 1 - 2 kali makanan selingan setiap hari.
- Jumlah energi dari MPASI yang dibutuhkan per hari 300 kkal.



Bayi 12 - 23 Bulan


MASAK BIASA

Bahan makanan sama dengan untuk orang dewasa. Tekstur makanan yang diiris-iris. Perhatikan respons anak saat makan. **Kebutuhan cairan:** 1.300 ml/hari (±5 gelas

- Lanjutkan menyusui hingga 2 tahun atau lebih.
- 3⁄4 - 1 mangkok ukuran 250 ml setiap kali makan.
- Berikan 3 - 4 kali makanan utama dan 1 - 2 kali makanan selingan setiap hari.
- Jumlah energi dari MPASI yang dibutuhkan per hari 550 kkal.

Pemenuhan Gizi Usia 6 - 24 Bulan


Cara Membuat MPASI dari Makanan Keluarga (Matang)



Bayi 6 - 8 Bulan

Contoh Bahan
- Nasi putih 30 g.
- Dadar telur 35 g.
- Sayur kare wortel tempe 20 g.


Cara Membuat
1. Nasi, telur dadar, tempe dan wortel (dari sayur kare) dilumatkan kemudian disaring.
2. Ditambahkan kuah sayur (santan kare) sampai mendapatkan konsistensi bubur kental.
3. Sajikan.



Bayi 9 - 11 Bulan

Contoh Bahan
- Nasi putih 45 g.
- Ikan kembung bumbu kuning 30 g.
- Tumis buncis 25 g.

Cara Membuat
1. Nasi, ikan kembung bumbu kuning dan tumis buncis dicincang.
2. Sajikan dengan kuah sayur (santan kare).




Bayi 12 - 23 Bulan

Contoh Bahan
- Nasi putih 55 g.
- Semur hati ayam 45 g.
- Bening/bobor bayam 20 g.

Cara Membuat
MPASI untuk anak 12-23 bulan disajikan dalam bentuk makanan keluarga (dicincang gak besar jika diperlukan).

Contoh Makanan Selingan Perkedel Kentang Isi Daging



Cara Membuat MPASI dari Bahan Mentah



Bayi 6 - 8 Bulan

Contoh Bahan
- Beras putih 10 g.
- Telur ayam 30 g.
- Tempe kedelai 10 g.
- Wortel 10 g.
- Santan 30 g.

Cara Membuat
1. Memasak beras, tambahkan santan dan bumbu yang telah ditumis dengan sedikit minyak (bawang merah, daun salam, kunyit).
2. Setelah nasi masak, masukan telur yang telah dikocok lepas, tempe dan wortel yang telah dicincang.
3. Aduk sampai mendapatkan konsistensi bubur kental lalu sajikan



Bayi 9 - 11 Bulan

Contoh Bahan
- Beras putih 15 g.
- Ikan kembung 30 g.
- Minyak kelapa 10 g.
- Wortel 15 g.
- Tempe 10 g.

Cara Membuat
1. Memasak beras, tambahkan bumbu yg telah ditumis (bawang merah, daun salam, kunyit) dengan minyak kelapa.
2. Setelah nasi masak, masukkan ikan kembung dan buncis yang telah dicincang.
3. Aduk sampai mendapatkan konsistensi bubur kasar/cincang.
4. Sajikan.



Bayi 12 - 23 Bulan

Contoh Bahan
- Beras putih 25 g.
- Hati ayam 50 g.
- Minyak kelapa 5 g.
- Bayam 20 g.
- Santan 50 g.

Cara Membuat
1. Memasak beras sampai men jadi nasi.
2. Membuat hati ayam goreng (goreng/tumis hati ayam dengan minyak kelapa).
3. Membuat sayur bayam.
4. Sajikan.

KIA 2024 Book 2.17.5 32 10/24/24 01:20

Resep MPASI 6 - 8 Bulan

Bubur Sup Daging Kacang Merah

Resep untuk 3 porsi



Bahan

- 50 g (6 sdm) nasi
- 30 g (3 sdm) daging ayam cincang
- 25 g (1/2 butir) telur ayam
- 10 g (1 sdm) buncis
- 10 g (1 sdm) wortel
- 10 g (1 sdm) kacang merah
- 10 g (1 batang) "bawang daun
- 1 batang seledri
- 300 ml kaldu ayam
- 2.5 g (1/2 sdt) minyak untuk menumis

Bumbu Halus

- 2 siung bawang merah
- 2 siung bawang putih

Buah

100 g (2 buah) jeruk diambil sarinya

Cara Membuat

1. Didihkan air kaldu ayam, masukkan kacang merah dan masak sampai empuk.
2. Tumis bumbu halus sampai harum, masukkan daging ayam cincang, lalu masak sampai berubah warna.
3. Masukkan tumisan daging ayam ke dalam air kaldu, masak sampai daging empuk.
4. Masukkan nasi, buncis, dan wortel.
5. Tambahkan kocokan telur, aduk merata dan masak sampai matang.
6. Haluskan bubur sampai mencapai tekstur yang diinginkan, lalu sajikan.

Resep MPASI 9 - 12 Bulan

Nasi Tim Ikan Kembung Telur Puyuh

Resep untuk 3 porsi



Bahan

- 115 g (12 sdm) nasi putih
- 30 g (1 potong kecil) ikan kembung segar, haluskan
- 30 g (3 butir) telur puyuh
- 15 g (1 potong besar) wortel
- 10 g (1 buah sedang) tomat
- 7.5 g (1.5 sdt) minyak kelapa
- 75 cc (1/3 gelas belimbing) kaldu ayam
- 50 g (1/2 potong) pepaya, haluskan

Buah

180 g (1 potong besar) semangka

Cara Membuat

1. Masukkan nasi, ikan kembung, telur puyuh, dan minyak kelapa ke dalam mangkok tim.
2. Tambahkan air kaldu.
3. Masukkan wortel dan tomat, tim hingga matang.
4. Angkat, sajikan dengan saus pepaya.

Lembar Pemantauan Bulanan Bayi 6 - 12 Bulan (Diisi oleh ibu)

Cek kondisi bayi setiap bulan dan beri tanda ✔ (centang) jika mengalami kondisi dalam kotak-kotak di bawah ini. Segera ke Puskesmas untuk periksa.

Bulan ke-	Sesak napas/ cuping hidung kembang kempis/ dada tertarik ke dalam.	Batuk dengan bunyi grok-grok/mengi.	Suhu tubuh panas > 38,5°C/ada tanda pendarahan (mimisan/ gusi berdarah/ muntah kopi/BAB hitam).	BAB lebih sering/lebih encer, dengan mata cekung/ haus minum dengan lahap/diare disertai darah.	Jumlah air kencing sedikit/tidak kencing selama 6 jam, warna kuning pekat, kecoklatan, atau warna lainnya.	Warna kulit tampak biru/memar di sekitar mulut/ tangan/kaki.	Aktivitas tampak lemah/tidak bergerak/ menangis/ merintih.	Hisapan bayi lemah/ tidak bergerak. Muntah susu/cairan hijau. Kencing < 6x/hari. Warna kencing kurang pekat.	Tidak mau makan/ minum. Berat badan tidak naik sesuai pertumbuh-an.	Tanggal, Nama & Paraf Kader
6										
7										
8										
9										
10										
11										

KIA 2024 Book 2.17.5 33 10/24/24 01:20

Perawatan Bayi Umur 6 - 9 Bulan (Diisi oleh ibu)

Pelayanan Kesehatan

Bawa bayi anda setiap bulan ke Posyandu/ Puskesmas/Fasilitas Kesehatan untuk mendapat pelayanan:

- Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan.
- Ibu/Ayah/Keluarga mengikuti kelas Ibu Balita.
- Kapsul Vitamin A (bulan Februari atau Agustus).
- Imunisasi (lihat halaman 124-125).

Manfaat Imunisasi

Campak-Rubella mencegah penularan penyakit yang dapat mengakibatkan masalah radang paru, radang otak dan kebutaan.

Manfaat Vitamin A

Vitamin A untuk meningkatkan kesehatan mata dan pertumbuhan anak.

Perawatan Gigi

Perhatikan tumbuhnya 4 gigi seri rahang atas dan rahang bawah.

Pantau Tumbuh Kembang Bayi Anda

Dukung tumbuh kembang si kecil sesuai perkembangan anak seusianya dengan melakukan stimulasi dalam suasana aman, nyaman dan menyenangkan.

Stimulasi bayi pada rentang usia 6 - 9 bulan dengan:

- Peluk, senyum, bicara, panggil namanya.
- Bersalaman, tepuk tangan, melambai ke orang lain.
- Kenalkan/tunjuk nama orang (papa/mama) dan benda sekitar.
- Cilukba, melihat cermin.
- Tunjuk dan sebutkan nama gambar
- Bacakan dongeng.
- Pegang mainan dengan 2 tangan.
- Masukkan benda kecil ke dalam wadah.
- Sembunyikan dan cari mainan.
- Mainan yang mengapung di air.
- Memukul-mukul.
- Duduk, merangkak, berdiri berpegangan.

Beri tanda ✔ (centang) pada kolom Ya/Tidak. Jika anak belum bisa melakukan salah satu dari hal berikut ini, segera bawa ke Puskesmas.

No.	Penanda Perkembangan Anak	Ya	Tidak
1	Bayi bisa duduk secara mandiri?		
2	Bayi belajar berdiri, kedua kakinya menyangga sebagian berat badan?		
3	Bayi bisa merangkak meraih mainan atau mendekati seseorang?		
4	Bayi bisa memindahkan benda dari satu tangan ke tangan lainnya?		
5	Bayi bisa memungut 2 benda, kedua tangan pegang 2 benda pada saat bersamaan?		
6	Bayi bisa memungut benda sebesar kacang dengan cara meraup?		
7	Bayi bersuara tanpa arti, mamama, bababa, dadada, tatatata?		
8	Bayi mencari mainan/benda yang dijatuhkan?		
9	Bayi bermain tepuk tangan/Cilukba		
10	Bayi bergembira dengan melempar benda?		
11	Bayi bergembira dengan melempar benda?		

6 - 12 BULAN

Perawatan Bayi Umur 9 - 12 Bulan (Diisi oleh ibu)

Pelayanan Kesehatan

Bawa bayi anda setiap bulan ke Posyandu/ Puskesmas/Fasilitas Kesehatan untuk mendapat pelayanan:

- Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan.
- Ibu/Ayah/Keluarga mengikuti kelas Ibu Balita.
- Kapsul Vitamin A (bulan Februari atau Agustus).
- Imunisasi (lihat halaman 124-125).

Manfaat Imunisasi

JE Mencegah anak dari penyakit radang otak.

Perawatan Gigi

Lanjutkan perawatan gigi bayi anda dengan:

- Perhatikan tumbuhnya gigi, pada usia 9 bulan adanya gigi seri 8 buah, gigi geraham 4 buah.
- Bersihkan gigi anak dengan menggunakan kasa yang diberi air hangat dengan sedikit pasta gigi anak.

Pantau Tumbuh Kembang Bayi Anda

Dukung tumbuh kembang si kecil sesuai perkembangan anak seusianya dengan melakukan stimulasi dalam suasana aman, nyaman dan menyenangkan.

Stimulasi bayi pada rentang usia 9 - 12 bulan dengan:

- Berbicara dengan boneka.
- Menunjuk dan mengucapkan orang/benda/ organ tubuh yang sudah dikenal.
- Bacakan dongeng pada saat mengenalkan dan menyuruh menunjuk.
- Pegang mainan dengan 2 tangan.
- Memasukan benda kecil ke dalam wadah.
- Menyusun balok.
- Sembunyikan dan cari mainan.
- Memegang pensil dan mencoret-coret kertas.
- Duduk, merangkak, berdiri berpegangan.
- Berjalan mundur, jinjit.

Beri tanda ✔ (centang) pada kolom Ya/Tidak. Jika anak belum bisa melakukan salah satu dari hal berikut ini, segera bawa ke Puskesmas.

No.	Penanda Perkembangan Anak	Ya	Tidak
1	Bayi bisa mengangkat badannya ke posisi berdiri?		
2	Bayi belajar berdiri selama 30 detik atau berpegangan di kursi?		
3	Bayi dapat berjalan dengan dituntun?		
4	Bayi mengulurkan lengan/badan untuk meraih mainan yang diinginkan?		
5	Bayi bisa menggenggam erat pensil?		
6	Bayi memasukkan benda ke mulut?		
7	Bayi mengulang menirukan bunyi yang didengar?		
8	Bayi menyebut 2-3 suku kata yang sama tanpa arti?		
9	Bayi mengeksplorasi sekitar, ingin tahu, ingin menyentuh apa saja?		
10	Bayi bereaksi terhadap suara yang perlahan atau bisikan?		
11	Bayi senang diajak bermain Cilukba?		
13	Bayi mengenal anggota keluarga, takut pada orang yang belum dikenal?		

KIA 2024 Book 2.17.5 34 10/24/24 01:20

12 - 24 BULAN

12 - 24 Bulan

Beri Makanan Bergizi dan Periksa Rutin ke Posyandu untuk Cegah Stunting.



Beri makanan yang kaya protein hewani, seperti telur, ikan dan daging.

Memasuki usia 1 tahun ke atas, kemampuan fisik, mental, dan sosial anak semakin berkembang.

YANG AKAN DIALAMI

- Anak telah makan makanan keluarga, mulai belajar berjalan dan berkata-kata.
- 70% kebutuhan gizi anak dipenuhi dari MPASI. Namun ASI masih tetap dibutuhkan karena menyumbang 30% kebutuhan gizi anak.

YANG HARUS DILAKUKAN

- Timbang, ukur dan cek perkembangan anak setiap bulan.
- Penuhi kecukupan gizi anak dengan pemberian MPASI yang kaya protein hewani (lihat halaman 56).
- Berikan makanan beragam dan menarik.
- Tetap berikan ASI hingga usia 2 tahun.
- Hindari pemberian makanan atau jajanan yang rendah gizi, tinggi gula dan garam, berpengawet dan berpemanis.
- Ajari anak untuk belajar makan sendiri.
- Ajari anak berjalan di undakan/tangga, mencoret-coret di kertas, menyebut bagian tubuhnya, dan bergerak bebas dalam pengawasan.
- Ajak anak membersihkan meja dan menyapu, membereskan mainan, bernyanyi, dan bermain dengan teman.
- Bacakan cerita buat anak, dan bimbing anak untuk mematuhi aturan permainan.
- Dapatkan imunisasi lanjutan (lihat halaman 124).
- Cek kesehatan anak secara rutin dan segera ke fasilitas kesehatan, jika anak sakit atau ditemukan tanda bahaya.
- Pastikan anak mendapatkan suplementasi vitamin A kapsul merah dan obat cacing sebanyak 2 kali dalam setahun.

MENGAPA HARUS DILAKUKAN

Stunting paling banyak terjadi di kelompok usia ini. Tetap lanjutkan pemantauan tumbuh kembang anak di Posyandu atau fasilitas kesehatan lainnya untuk memastikan anak memiliki kondisi yang sehat, status gizi dan perkembangan terbaik sesuai usianya.

Lihat pencatatan dan pemeriksaan bayi dan balita oleh tenaga kesehatan di halaman 130-154.

MPASI 12 - 24 Bulan



Memasuki usia 1 tahun ke atas, kebutuhan energi dan protein si kecil semakin bertambah. Ibu perlu mendukungnya dengan memberi kecukupan gizi, terutama protein hewani yang mengandung asam amino esensial untuk mendukung pertumbuhan otak dan sel-sel tubuh lainnya.

Kemampuan makan anak juga membaik dan si kecil sudah mulai bisa makan makanan yang dimakan oleh ibu dan anggota keluarga lainnya. Di rentang usia ini, anak sudah tahu apa yang ia suka dan tidak suka, serta mulai memilih-milih makanan. Frekuensi makan si kecil biasanya 3-4 kali dalam sehari, yaitu 3-4 kali makanan utama dan 1-2x makanan selingan/camilan di antara waktu makan utama.

Berikan menu makanan yang lengkap, bervariasi, dan bergizi seimbang, selain ASI. Hindari pemberian jenis makanan dan minuman seperti berikut






- susu atau yoghurt rendah lemak.
- minuman bersoda.
- makanan yang terlalu asam dan pedas.
- makanan dan minuman yang tinggi kandungan gulanya atau terbuat dari pemanis buatan, seperti minuman kemasan dan kalengan.
- makanan yang banyak mengandung MSG dan bahan pengawet, seperti makanan instan.

Karena si kecil sudah mulai bisa makan nasi dan daging yang diiris-iris. beberapa resep MPASI yang bisa ibu siapkan antara lain nasi sup telur puyuh bola ayam, nasi ikan kuah kuning, sup telur puyuh ikan air tawar labu kuning, dan nugget tempe ayam sayuran.

Pindai kode QR untuk mendapatkan resep MPASI anak usia 12 - 24 bulan

Lembar Pemantauan Bulanan Bayi 12 - 24 Bulan (Diisi oleh ibu)

Cek kondisi bayi setiap bulan dan beri tanda ✔ (centang) jika mengalami kondisi dalam kotak-kotak di bawah ini. Segera ke Puskesmas untuk periksa.

Bulan ke-	 Sesak napas/ cuping hidung kembang kempis/ dada tertarik ke dalam.	 Batuk dengan bunyi grok-grok/mengi.	 Suhu tubuh panas > 38,5°C/ada tanda pendarahan (mimisan/ gusi berdarah/ muntah kopi/BAB hitam).	 BAB lebih sering/lebih encer, dengan mata cekung/ haus minum dengan lahap/diare disertai darah.	 Jumlah air kencing sedikit/tidak kencing selama 6 jam, warna kuning pekat, kecoklatan, atau warna lainnya.	 Warna kulit tampak biru/memar di sekitar mulut/ tangan/kaki.	 Aktivitas tampak lemah/tidak bergerak/ menangis/ merintih.	 Hisapan bayi lemah/ tidak bergerak. Muntah susu/cairan hijau. Kencing < 6x/hari. Warna kencing kurang pekat.	 Tidak mau makan/ minum. Berat badan tidak naik sesuai pertumbuh-an.	Tanggal, Nama & Paraf Kader/ Nakes
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										

KIA 2024 Book 2.17.5 35
10/24/24 01:20

KIA 2024 Book 2.17.5 36 10/24/24 01:20

Perawatan Anak Bayi 12 - 18 Bulan (Diisi oleh ibu)

Pelayanan Kesehatan
Bawa anak anda setiap bulan ke Posyandu/ Puskesmas/Fasilitas Kesehatan untuk mendapat pelayanan:
- Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan.
- Ibu/Ayah/Keluarga mengikuti kelas Ibu Balita.
- Kapsul Vitamin A (bulan Februari atau Agustus).
- Obat cacing.
- Imunisasi (lihat halaman 124-125).

Manfaat Imunisasi Lanjutan
Pengulangan Imunisasi dasar untuk mempertahankan tingkat kekebalan dan untuk memperpanjang masa perlindungan anak yang sudah mendapatkan Imunisasi dasar.

Manfaat Obat Cacing
Untuk pencegahan dan pengobatan infeksi cacingan sehingga dampak cacingan pada tubuh dapat dicegah.

Perawatan Gigi
Perhatikan tumbuhnya gigi, pada usia 18 bulan adanya gigi susu berjumlah 16 buah.

Pantau Tumbuh Kembang Bayi Anda

Dukung tumbuh kembang si kecil sesuai perkembangan anak seusianya dengan melakukan stimulasi dalam suasana aman, nyaman dan menyenangkan.

Stimulasi bayi pada rentang usia 12 - 18 bulan dengan:
- Berjalan mundur, naik tangga.
- Tangkap dan lempar bola.
- Menyusun balok atau puzzle, menggambar.
- Bermain air, meniup, menendang bola.
- Bercerita tentang gambar di buku.
- Menyebutkan nama benda, menyanyi.
- Main telpon-telponan, menyatakan keinginan.
- Bermain dengan teman sebaya, petak umpet.
- Merapikan mainan, membuka baju.
- Makan bersama.
- Merangkai manik besar.

Beri tanda ✔ (centang) pada kolom Ya/Tidak. Jika anak belum bisa melakukan salah satu dari hal berikut ini, segera bawa ke Puskesmas.

No.	Penanda Perkembangan Anak	Ya	Tidak
1	Anak bisa berdiri sendiri tanpa berpegangan?		
2	Anak bisa membungkuk memungut mainan kemudian berdiri kembali?		
3	Anak bisa berjalan mundur lima langkah?		
4	Anak bisa memanggil ayah dengan kata ”papa”, memanggil ibu dengan kata ”mama”?		
5	Anak bisa menumpuk dua kubus?		
6	Anak bisa memasukkan kubus di kotak?		
7	Anak bisa menunjuk apa yang diinginkan tanpa menangis/merengek, anak bisa mengeluarkan suara yang menyenangkan atau menarik tangan ibu?		
8	Anak bisa memperlihatkan rasa cemburu/bersaing?		

Perawatan Anak Bayi 18 - 24 Bulan (Diisi oleh ibu)

Pelayanan Kesehatan
Bawa anak anda setiap bulan ke Posyandu/ Puskesmas/Fasilitas Kesehatan untuk mendapat pelayanan:
- Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan.
- Ibu/Ayah/Keluarga mengikuti kelas Ibu Balita.
- Kapsul Vitamin A (bulan Februari atau Agustus).
- Obat cacing.
- Imunisasi (lihat halaman 124-125).

Perawatan Gigi
Lanjutkan perawatan gigi anak anda. Perhatikan tumbuhnya gigi, pada usia 24 bulan adanya gigi susu berjumlah 20 buah. Gosok giginya setelah sarapan dan sebelum tidur dengan sikat gigi kecil khusus anak yang berbulu lembut, pakai pasta gigi mengandung fluor cukup selapis tipis (1/2 biji kacang polong).

Pantau Tumbuh Kembang Bayi Anda

Dukung tumbuh kembang si kecil sesuai perkembangan anak seusianya dengan melakukan stimulasi dalam suasana aman, nyaman dan menyenangkan.

Stimulasi bayi pada rentang usia 18 - 24 bulan dengan:
- Bicara, bertanya, bercerita, bernyanyi.
- Tanya jawab, main telpon-telponan.
- Perintah sederhana, membantu pekerjaan.
- Melepas baju, rapikan mainan.
- Makan bersama dengan sendok garpu.
- Menyusun balok, memasang puzzle, menggambar, membentuk lilin.
- Buat rumah-rumahan, petak umpet.
- Berjalan, berlari, melompat.
- Berdiri satu kaki, naik turun tangga.
- Melempar, menangkap, menendang bola.

Beri tanda ✔ (centang) pada kolom Ya/Tidak. Jika anak belum bisa melakukan salah satu dari hal berikut ini, segera bawa ke Puskesmas.

No.	Penanda Perkembangan Anak	Ya	Tidak
1	Anak bisa berdiri sendiri tanpa berpegangan 30 detik?		
2	Anak bisa berjalan tanpa terhuyung-huyung?		
3	Anak bisa menumpuk 4 buah kubus?		
4	Anak bisa memungut benda kecil dengan ibu jari dan jari telunjuk?		
5	Anak bisa menggelindingkan bola ke arah sasaran?		
6	Anak bisa menyebut 3 – 6 kata yang mempunyai arti?		
7	Anak bisa membantu/menirukan pekerjaan rumah tanggal?		
8	Anak bisa memegang cangkir sendiri, belajar makan-minum sendiri?		

KIA 2024 Book 2.17.5 37 10/24/24 01:20

Warna Air Kencing



	Baik	Anak ibu sudah terhidrasi dengan baik. Teruskan minum air putih sesuai kebutuhan.
	Kurang Baik	Anak ibu kurang terhidrasi. Tambahkan minum sesuai kebutuhan.
	Tidak Baik	Anak ibu sangat kurang minum. Segera minum air putih sesuai kebutuhan. Bila warna air kencing tidak membaik, segera hubungi bidan/perawat/dokter untuk penjelasan lebih lanjut.

2 - 6 Tahun

Pastikan Si Kecil Memiliki Tanda Anak Sehat



Di usia 2 tahun ke atas, perkembangan fisik, mental dan sosial anak berkembang pesat hingga usia 6 tahun.

YANG AKAN DIALAMI

- Anak mulai disapih, lebih banyak melakukan aktivitas, bergaul lebih luas dan memasuki masa pra sekolah.
- Di usia 3 tahun pertama, otak anak berkembang sangat pesat, sehingga asupan gizi disertai stimulasi perkembangan penting agar anak memiliki kesempatan belajar sejak dini.
- Pelayanan kesehatan, pola asuh yang peka dengan kebutuhan anak, serta perlindungan dan keamanan juga penting bagi anak.

YANG HARUS DILAKUKAN

- Penuhi gizi anak dengan pemberian makanan keluarga yang bervariasi dan kaya protein hewani (lihat halaman 78).
- Timbang dan ukur serta cek perkembangan anak setiap bulan di Posyandu, atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, serta PAUD.
- Ajak anak mulai melibatkan diri dalam kegiatan bersama.
- Ajarkan anak perbedaan jenis kelamin dan menjaga alat kelaminnya.
- Kembangkan kreativitas anak dan kemampuan bergaul.
- Cek kesehatan anak secara rutin dan segera ke fasilitas pelayanan kesehatan, jika anak sakit atau mengalami tanda bahaya.
- Pastikan anak balita mendapatkan suplementasi Vitamin A kapsul merah dan obat cacing sebanyak 2 kali dalam setahun.

MENGAPA HARUS DILAKUKAN

- Untuk memastikan anak memiliki kondisi yang sehat, status gizi dan perkembangan terbaik sesuai usianya.
- Mempersiapkan anak memasuki masa pra sekolah dan sekolah dasar.

Lihat pencatatan dan pemeriksaan bayi dan balita oleh tenaga kesehatan di halaman 130-154.

KIA 2024 Book 2.17.5 38 10/24/24 01:21

Cegah Diare dan Dehidrasi pada Balita



Pemenuhan gizi balita usia 2 hingga 6 tahun merupakan salah satu upaya, agar si kecil memiliki tanda anak sehat. Ibu bisa mendukungnya dengan:

- Memberikan gizi seimbang, terdiri dari makanan pokok, lauk hewani dan nabati, dilengkapi dengan sayur dan buah-buahan.
- Mengutamakan kebersihan makanan yang diberikan.
- Mencukupi kebutuhan cairan untuk anak. Anak harus minum sedikitnya 5 - 7 gelas air setiap hari.

Pengolahan dan penyajian makanan yang tidak bersih dan sehat dapat membuat anak rentan terkena diare. Ibu harus dapat mengenali tanda dan gejala diare, karena diare dapat menyebabkan dehidrasi yang membahayakan kesehatan dan jiwa si kecil.

Berikut adalah tindakan pencegahan dehidrasi yang dapat Ibu lakukan jika anak mengalami diare.

1. Memberikan ASI lebih sering dan lebih lama dari biasanya.
2. Memberikan oralit sampai diare berhenti untuk mencegah dehidrasi.
3. Memberikan obat zinc sehari sekali selama 10 hari berturut-turut untuk mengurangi tingkat keparahan diare.
4. Memberikan air minum atau mineral, dan makanan berkuah seperti sayur dan sup.

Segera bawa balita ke fasilitas pelayanan kesehatan dan minta bantuan tenaga kesehatan, jika kondisinya tidak membaik.

Pola Asuh Anak Umur 1,5 - 3 Tahun





- Selalu menghargai dan mengakui kemampuan anak.
- Mendorong anak bergerak bebas, hindari larangan-larangan yang tidak perlu, namun orang tua harus melindunginya dari bahaya.
- Mengajak anak bermain dan berbicara dengan kalimat pendek-pendek yang penuh arti.
- Mendorong anak bermain dengan anak lain.
- Melatih sopan santun dan disiplin secara sederhana.
- Memberi anak permainan yang sederhana.
- Anak 1-2 tahun perlu tidur 11-14 jam sehari (termasuk tidur siang).

- Penggunaan gawai pada anak berusia 18-24 bulan:
  - Hanya memilih konten program yang berkualitas untuk anak, batasi tidak lebih dari 1 jam per hari.
  - Hendaknya dimainkan bersama orang tua sehingga anak dapat mengetahui cara terbaik untuk menggunakannya.
  - Hindarkan anak menggunakan gawai sendirian tanpa pendampingan orang tua.

Bawa anak ke Posyandu/Fasilitas Kesehatan setiap bulan untuk memantau pertumbuhan, perkembangan (sesuai jadwal), pelayanan imunisasi, vitamin A dan obat cacing.

Lembar Pemantauan Bulanan Anak 2 - 6 Tahun (Diisi oleh ibu) _____ A

Cek kondisi bayi setiap bulan dan beri tanda ✔ (centang) jika mengalami kondisi dalam kotak-kotak di bawah ini. Segera ke Puskesmas untuk periksa.



	Bulan ke-	 Sesak napas/ cuping hidung kembang kempis/ dada tertarik ke dalam.	 Batuk dengan bunyi grok-grok/mengi.	 Suhu tubuh panas > 38,5°C/ada tanda pendarahan (mimisan/ gusi berdarah/ muntah kopi/BAB hitam).	 BAB lebih sering/lebih encer, dengan mata cekung/ haus minum dengan lahap/diare disertai darah.	 Jumlah air kencing sedikit/tidak kencing selama 6 jam, warna kuning pekat, kecoklatan, atau warna lainnya.	 Warna kulit tampak biru/memar di sekitar mulut/ tangan/kaki.	 Aktivitas tampak lemah/tidak bergerak/ menangis/ merintih.	 Hisapan bayi lemah/ tidak bergerak. Muntah susu/cairan hijau. Kencing < 6x/hari. Warna kencing kurang pekat.	 Tidak mau makan/ minum. Berat badan tidak naik sesuai pertumbuh-an.	Tanggal, Nama & Paraf Kader/ Nakes
2 TAHUN	24										
	25										
	26										
	27										
	28										
	29										
2 TAHUN	30										
	31										
	32										
	33										
	34										
	35										
3 TAHUN	36										
	37										
	38										
	39										
	40										
	41										
	42										
	43										
	44										
	45										
	46										
	47										

KIA 2024 Book 2.17.5 39

10/24/24 01:21

Lembar Pemantauan Bulanan Anak 2 - 6 Tahun (Diisi oleh ibu) _____ B

Cek kondisi bayi setiap bulan dan beri tanda ✔ (centang) jika mengalami kondisi dalam kotak-kotak di bawah ini. Segera ke Puskesmas untuk periksa.

	Bulan ke-	 Sesak napas/ cuping hidung kembang kempis/ dada tertarik ke dalam.	 Batuk dengan bunyi grok-grok/mengi.	 Suhu tubuh panas > 38,5°C/ada tanda pendarahan (mimisan/ gusi berdarah/ muntah kopi/BAB hitam).	 BAB lebih sering/lebih encer, dengan mata cekung/ haus minum dengan lahap/diare disertai darah.	 Jumlah air kencing sedikit/tidak kencing selama 6 jam, warna kuning pekat, kecoklatan, atau warna lainnya.	 Warna kulit tampak biru/memar di sekitar mulut/ tangan/kaki.	 Aktivitas tampak lemah/tidak bergerak/ menangis/ merintih.	 Hisapan bayi lemah/ tidak bergerak. Muntah susu/cairan hijau. Kencing < 6x/hari. Warna kencing kurang pekat.	 Tidak mau makan/ minum. Berat badan tidak naik sesuai pertumbuhan	Tanggal, Nama & Paraf Kader/ Nakes
4 TAHUN	48										
	49										
	50										
	51										
	52										
	53										
4 TAHUN	54										
	55										
	56										
	57										
	58										
	59										
5 TAHUN	60										
	61										
	62										
	63										
	64										
	65										
	66										
	67										
	68										
	69										
	70										
	71										

KIA 2024 Book 2.17.5 40
10/24/24 01:21