






Iteration k = 1
objective function
observations
posterior sample
posterior global minimum
f(x)
x
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0



Iteration k = 2
objective function
observations
posterior sample
posterior global minimum
f(x)
x
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
−2.0
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0



Iteration k = 3
objective function
observations
posterior sample
posterior global minimum
f(x)
x
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0



Iteration k = 4
objective function
observations
posterior sample
posterior global minimum
f(x)
x
2
1
0
−1
−2
−2.0
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0



Iteration k = 5
objective function
observations
posterior sample
posterior global minimum
f(x)
x
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0



Iteration k = 6
objective function
observations
posterior sample
posterior global minimum
f(x)
x
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0



Iteration k = 7
objective function
observations
posterior sample
posterior global minimum
f(x)
x
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0



Iteration k = 8
objective function
observations
posterior sample
posterior global minimum
f(x)
x
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0



Iteration k = 9
objective function
observations
posterior sample
posterior global minimum
f(x)
x
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0



Iteration k = 10
objective function
observations
posterior sample
posterior global minimum
f(x)
x
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0



Iteration k = 11
objective function
observations
posterior sample
posterior global minimum
f(x)
x
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0



Iteration k = 12
objective function
observations
posterior sample
posterior global minimum
f(x)
x
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0



Iteration k = 13
objective function
observations
posterior sample
posterior global minimum
f(x)
x
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0



Iteration k = 14
objective function
observations
posterior sample
posterior global minimum
f(x)
x
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0



Iteration k = 15
objective function
observations
posterior sample
posterior global minimum
f(x)
x
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0



Iteration k = 16
objective function
observations
posterior sample
posterior global minimum
f(x)
x
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0



Iteration k = 17
objective function
observations
posterior sample
posterior global minimum
f(x)
x
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0



Iteration k = 18
objective function
observations
posterior sample
posterior global minimum
f(x)
x
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0



Iteration k = 19
objective function
observations
posterior sample
posterior global minimum
f(x)
x
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
−2.0
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0



Iteration k = 20
objective function
observations
posterior sample
posterior global minimum
f(x)
x
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0



Iteration k = 21
objective function
observations
posterior sample
posterior global minimum
f(x)
x
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0



Iteration k = 22
objective function
observations
posterior sample
posterior global minimum
f(x)
x
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0



Iteration k = 23
objective function
observations
posterior sample
posterior global minimum
f(x)
x
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0



Iteration k = 24
objective function
observations
posterior sample
posterior global minimum
f(x)
x
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0



Iteration k = 25
objective function
observations
posterior sample
posterior global minimum
f(x)
x
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0


Iteration k = 26
objective function
observations
posterior sample
posterior global minimum
f(x)
x
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0


Iteration k = 27
objective function
observations
posterior sample
posterior global minimum
f(x)
x
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0


Iteration k = 28
objective function
observations
posterior sample
posterior global minimum
f(x)
x
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0


Iteration k = 29
objective function
observations
posterior sample
posterior global minimum
f(x)
x
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0


Iteration k = 30
objective function
observations
posterior sample
posterior global minimum
f(x)
x
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0