Fecha de Nacimiento: 13.06.1995
Convenio: FAM COLS EVENTO

Tipo Identificación: CC

Número Identificación: 1026584017

Edad: 22 Años 11 Meses 09 días Sexo: F

Centro medico: CL CIUDAD ROMA Episodio: 0034976172 No. Habitación:

Tipo de Registro: Interconsulta

Fecha: 22.05.2018 Hora: 17:13:58

----SUBJETIVO----

AUXILIAR DE ENFERMERIA

MC: "ANSIEDAD, ME DUELE TODO EL CUERPO" EA: FEMENINA DE 22 AÑOS QUIEN DESDE HACE 6 MESES CONSUMO OPIACEOS 2 VESES POR SEMANA, EN EL ULTIMO VEZ AUMENTA CONSUMO HASTA SER DE FORMA DIARIA , DOSIS ENDOVENOSASAS APROXIMADAS DE 5MG DE HIDROMORFONA/ 8MG DE MORFINA, REFIERE QUE EL FIN DE SEMANA NO FUE POSIBLE LA CONSECUCION DE ESTOS OPIACEOS POR LO QUE DESDE ESE MOMENTO PRESENTA MIALGIAS, ARTRALGIAS, NAUSEA QUE INTENTA MANEJAR CON HALOPERIDOL 2MG CON POSTERIORSENSACION DE MUERTE INMINENTE, INQUIETUD PSICOMOTORA LO QUE LA LLEVA A PENSAR EN EL SUICIDIO, EL CUAL NO CONSUMA. EL DIA DE AYER USA TRAZADONA PARA COMO INDIUCTOR DE SUEÑO PERO CON INCREMENTEO DE MALESTAR GENERAL INGRESA A URGENCIAS

- -MIALGIAS, ARTRALGIAS
- -MALESTAR GENERAL
- -NAUSEAS
- -DISESTESIAS EN MEIMBROS SUPERIORES

ANTECEDENTES:

-PAT: NIEGA -QX: NIEGA

-TOX/ALERG: CONSUMO DIARIO DE OPIACEOS

-G/O: GOPO FUM 16/5/18

EXAMEN FISICO:

TA 113/62 FC 82 SAT 97%

C/C: CAVIDAD ORAL HIDRATADA CUELLO NO ADENOPATIA NO MASAS NO MEGALIAS

C/P: RSCS RITMICOS NO SOPLO RSRS SIN AGREGADOS CAMPOS NORMOVENTILADOS ABD: BLANDO NO MASAS

EXT: NO EDEMAS, LLENADO CAPIALR DISTAL MENOR DE 3 SEGUNDOS NEU: ANSIOSA, TEMBLOR FINO VISIBLE, DIAFORESIS, ACATISIA, NO

FOCALIZACION O DEFICIT MOTOR O SENSITIVO

PARACLINICOS:

22/5/18

BILI DIRE 0.41 BILI IND 0.68 BILI TOTAL 1.09 TGP 27.6 TGO 21.9 FOSFATASA ALCAINA 58 AMILASA 96

-----ANÁLISIS-----

- 1. ABSTINENCIA A OPIACEOS LEVE COWS SCORE 8
- TRASTORNO DE ABUSO DE SUSTANCIAS

CONCEPTO:

FEMENIAN MOTIVADA POR ESTRÉS FAMILIAR Y LABORAL INICIA CONSUMO DE OPIACEOS HACE 6 MESES, EN EL ULTIMO MES HA VENIDO CRECINEDO FRECUENCIA YVOLUMEN DE CONSUMO APROXIMADAMENTE EN DOSIS EQUIVALENTES A 50MG DE MORFINA AL DIA, EL FIN DE SEMANA PREVIO ANTE AUSENCIA DE SUSTANCIA PSICOACTIVA PRESENTA ABSTIENCIA QUE ELLA MISMA MANEJÓ CON HALOPERIDOL CON EFECTO ADVERSO TRAS SU ADMINISTRACION (SINDROME EXTRAPIRAMIDAL) QUE LE LLEVO A PENSAR EN GESTA SUICIDA QUE NO REALIZO, ASI MISMO USÓ INDUCTORES DE SUEÑO, PERO AUNTE AUSENCIA DE EFECTO DESEADO CONSULTA A

EN URGENCIAS ENCUETRO A PACIENTE CON ABSTINENCIA A OPIACEOS LEVE POR COWS SCORE, LO QUE INDICA INICIO DE BENZODIACEPINAS POR AHORA ORAL. ASOCIADO A CLONIDINA 75MCG CADA 12 HORAS.

ES NECESARIO VALORACION POR SALUD MENTAL

SE INCIA REMISION

SE EXPLICA A PACIENTE Y FAMILAR COMENTA ENTENDER Y ACEPTAR

EMERGENCIOLOGO

-----PLAN-----

- 1. REMISION A UNIDAD SALUD MENTAL

2. ALPRAZOLAM 0.5MG CADA 8 HORAS
3. CLONIDINA 75MCG CADA 12 HORAS

N. Identificación: 1022328153
Responsable: MORERA, ANDRES Especialidad: MEDICINA URGENCIAS.