



Consent Form

HIV Testing

DRAFT · FOR CLINICAL & LEGAL REVIEW

Doc no: YLO/CON/HIV/00
Issue: 00 (draft)
Date: 08.10.2026 · Page 1 of 4

DATE _____

PATIENT DETAILS fill in block letters

☐ Mr. ☐ Ms. ☐ Mrs. ☐ Master FULL NAME _____

DATE OF BIRTH _____ AGE _____ SEX ☐ Male ☐ Female ☐ Transgender

ADDRESS _____

STATE _____ PINCODE _____ PHONE _____ EMAIL _____

PATIENT ID _____ ☐ OPD ☐ IPD DEPARTMENT / UNIT _____

CONSENT FOR HIV TESTING AND PRE-TEST COUNSELLING

I consent* to have my blood tested for HIV. The meaning of the test and relevant information have been explained to me in pre-test counselling. Post-test counselling will be done by the laboratory on a pre-arranged appointment, or I may choose to be counselled by my referring doctor. I understand that my result will be kept confidential. I authorise the following person or agency to collect my report on my behalf:

☐ Self ☐ Referring doctor ☐ Referring agency ☐ Next of kin

HIV reports on the Yello portal can be opened only with the patient-specific user ID and password.

PURPOSE OF HIV TESTING ☐ Visa ☐ Antenatal (ANC) ☐ Pre-surgery ☐ High-risk behaviour ☐ Other

PRE-TEST COUNSELLING

NAME OF COUNSELLOR _____ SIGNATURE _____

PATIENT NAME _____ SIGNATURE OF PATIENT _____

POST-TEST COUNSELLING

NAME OF COUNSELLOR _____ SIGNATURE _____

PATIENT NAME _____ SIGNATURE OF PATIENT _____

* For minors, a parent or legal guardian signs. In adoption cases, the orphanage, NGO or adopting parents sign. For an incapacitated or hospitalised patient, the next of kin or the doctor signs.

GENERAL INFORMATION ON HIV

AIDS (acquired immune deficiency syndrome) is caused by infection with the human immunodeficiency virus, HIV-1 or HIV-2. Left untreated, the first infection becomes long-term and can lead to advanced HIV disease.

How HIV is spread

- Sexual contact
- Transfusion of infected blood or blood products
- Sharing needles and syringes among people who inject drugs
- From mother to baby, during pregnancy, birth or breastfeeding
- Needle-stick or specimen exposure of health-care and laboratory workers

How HIV is not spread

- Everyday or family contact, or holding hands
- Insects such as mosquitoes
- Sharing cups, plates or utensils
- Toilet seats
- Living in the same house as a person with HIV

Diagnosis

The laboratory diagnosis depends on finding antibodies to HIV, the virus itself, or both. Tests used include screening tests (EIA, rapid immunochromatography, CLIA, ECLIA), the p24 antigen test, the HIV RNA test, and the CD4+ T-cell count.

Window period

Antibodies can begin to appear about 2 weeks after infection, and are reliably detectable within 3 months. The gap between exposure and detectable antibodies is the window period. A negative test in the window period may need repeating.

Results

Every positive screening result is re-tested with different methods, following the National AIDS Control Organisation (NACO) national guidelines for HIV testing.

DATE / తేదీ

PATIENT DETAILS fill in block letters

☐ Mr. ☐ Ms. ☐ Mrs. ☐ Master FULL NAMEDATE OF BIRTH AGE SEX ☐ Male ☐ Female ☐ Transgender

ADDRESS

STATE PINCODE PHONE EMAIL

HIV పరీక్ష మరియు పరీక్షకు ముందు కౌన్సలింగ్ కోసం అంగీకారం

నా రక్తాన్ని HIV కోసం పరీక్షించడానికి నేను అంగీకరిస్తున్నాను*. ఈ పరీక్ష యొక్క అర్థం, సంబంధిత సమాచారం పరీక్షకు ముందు కౌన్సలింగ్‌లో నాకు వివరించారు. పరీక్ష తర్వాత కౌన్సలింగ్‌ను ముందుగా నిర్ణయించిన అపాయింట్‌మెంట్‌పై ప్రయోగశాల చేస్తుంది, లేదా నేను నా రిఫర్ చేసిన డాక్టర్ ద్వారా కౌన్సలింగ్ తీసుకోవచ్చు. నా ఫలితం గోప్యంగా ఉంచబడుతుందని అర్థం చేసుకున్నాను. నా తరపున నా రిపోర్ట్‌ను తీసుకునేందుకు కింది వ్యక్తికి / సంస్థకు అనుమతి ఇస్తున్నాను:

☐ స్వయంగా ☐ రిఫర్ చేసిన డాక్టర్ ☐ రిఫర్ చేసిన సంస్థ ☐ బంధువుHIV పరీక్ష ఉద్దేశం ☐ వీసా ☐ గర్భిణీ పరీక్ష (ANC) ☐ శస్త్రచికిత్సకు ముందు ☐ అధిక ప్రమాద ప్రవర్తన ☐ ఇతరం

కౌన్సలర్ పేరు సంతకం

రోగి పేరు రోగి సంతకం

* మైనర్ల విషయంలో తల్లిదండ్రులు లేదా చట్టపరమైన సంరక్షకుడు సంతకం చేయాలి. దత్తత కేసుల్లో అనాథాశ్రమం, NGO లేదా దత్తత తీసుకునే తల్లిదండ్రులు సంతకం చేయాలి. అసమర్థులైన లేదా అనుపత్తిలో చేరిన రోగుల విషయంలో బంధువు లేదా డాక్టర్ సంతకం చేయాలి.

Telugu text: machine-assisted draft. A native Telugu speaker and the treating clinician must check it before patient use.

HIV గురించి సాధారణ సమాచారం

AIDS (అక్విర్డ్ ఇమ్యూన్ డెఫిషియెన్సీ సిండ్రోమ్) HIV-1 లేదా HIV-2 వైరస్ సంక్రమణ వల్ల కలుగుతుంది. చికిత్స చేయకపోతే మొదటి సంక్రమణ దీర్ఘకాలికంగా మారి, ముదిరిన HIV వ్యాధికి దారితీయవచ్చు.

HIV ఎలా వ్యాపిస్తుంది

- లైంగిక సంపర్కం
- కలుషిత రక్తం లేదా రక్త ఉత్పత్తుల మార్పిడి
- మాదకద్రవ్యాలు ఇంజెక్ట్ చేసుకునేవారు సూదులు, సిరంజిలు పంచుకోవడం
- గర్భధారణ, ప్రసవం లేదా పాలిచ్చే సమయంలో తల్లి నుండి బిడ్డకు
- ఆరోగ్య సిబ్బంది, ప్రయోగశాల సిబ్బందికి సూది గుచ్చుకోవడం లేదా నమూనాల ద్వారా

HIV ఎలా వ్యాపించదు

- సాధారణ లేదా కుటుంబ సంపర్కం, చేతులు కలపడం
- దోమల వంటి కీటకాలు
- కప్పులు, పళ్ళాలు, పాత్రలు పంచుకోవడం
- టాయిలెట్ సిట్లు
- HIV ఉన్న వ్యక్తితో ఒకే ఇంట్లో ఉండటం

నిర్ధారణ

ప్రయోగశాల నిర్ధారణ HIV యాంటిబాడీలు, వైరస్ లేదా రెండింటినీ గుర్తించడంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. స్క్రీనింగ్ పరీక్షలు (EIA, రాపిడ్, CLIA, ECLIA), p24 యాంటిజెన్ పరీక్ష, HIV RNA పరీక్ష, CD4+ T-సెల్ కౌంట్ ఉపయోగిస్తారు.

విండో పీరియడ్

సంక్రమణ తర్వాత సుమారు 2 వారాలకు యాంటిబాడీలు కనిపించడం మొదలవుతుంది; 3 నెలల్లో నమ్మదగిన స్థాయిలో కనిపిస్తాయి. వైరస్ కు గురైన సమయం నుండి యాంటిబాడీలు కనిపించే వరకు ఉన్న ఈ వ్యవధిని విండో పీరియడ్ అంటారు. ఈ సమయంలో ఫలితం నెగటివ్ వచ్చినా మళ్ళీ పరీక్షించాల్సి రావచ్చు.

ఫలితాలు

ప్రతి పాజిటివ్ స్క్రీనింగ్ ఫలితాన్ని NACO జాతీయ మార్గదర్శకాల ప్రకారం వేర్వేరు పద్ధతులతో మళ్ళీ పరీక్షిస్తారు.

Telugu text: machine-assisted draft. A native Telugu speaker and the treating clinician must check it before patient use.