

Az informatika logikai alapjai

5. előadás

Vaszi György

vaszil.gyorgy@inf.unideb.hu

I. emelet 110-es szoba

Az első zárthelyi dolgozatról

- **Október 18-án** kedden **12.00 – 14.00**
- IK épület **F0 terem**
- A dolgozatban „elmélet” nem lesz, csak a gyakorlaton megoldottakhoz hasonló típusú feladatok.
- A téma az első **öt vagy hat előadás** anyaga (ezt még pontosítjuk, ha látom, hogy meddig jutunk előre a tananyagban).
- Aki a fenti időpontban **nem tud megjelenni**, annak a **félév végén** lesz alkalma a ZH-t **bepótolni**.

A múlt órán

- Az igazságfunktorok (logikai műveletek) tulajdonságai
 - nevezetes logikailag ekvivalens formulák
 - logikai műveletek kifejezhetősége egymással
 - nevezetes logikai következmények
 - nevezetes logikai törvények (érvényes formulák)
- Logikai műveletek egymással való kifejezhetősége
- Formulák kielégíthetőségének vizsgálata: A szemantikus táblák módszere
 - A módszer helyessége, teljessége

Például: Nevezetes logikai ekvivalenciák

Logikailag ekvivalens formulák

- Kettős tagadás törvénye: $\neg\neg A \Leftrightarrow A$
- Kommutativitás: $A \wedge B \Leftrightarrow B \wedge A$, $A \vee B \Leftrightarrow B \vee A$ és $A \equiv B \Leftrightarrow B \equiv A$
- Asszociativitás: $A \wedge (B \wedge C) \Leftrightarrow (A \wedge B) \wedge C$, $A \vee (B \vee C) \Leftrightarrow (A \vee B) \vee C$ és $A \equiv (B \equiv C) \Leftrightarrow (A \equiv B) \equiv C$
- Idempotencia: $A \wedge A \Leftrightarrow A$ és $A \vee A \Leftrightarrow A$
- Disztibutivitás:
 - $A \vee (B \wedge C) \Leftrightarrow (A \vee B) \wedge (A \vee C)$
 - $A \wedge (B \vee C) \Leftrightarrow (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$
- Elnyelés: $A \wedge (B \vee A) \Leftrightarrow A$ és $A \vee (B \wedge A) \Leftrightarrow A$
- De Morgan: $\neg(A \wedge B) \Leftrightarrow \neg A \vee \neg B$ és $\neg(A \vee B) \Leftrightarrow \neg A \wedge \neg B$

Például: Nevezets logikai következmények

Logikai következmények

- $A \supset \neg A \vdash \neg A$
- $\neg A \supset A \vdash A$
- $A \wedge B \vdash A$ és $A \wedge B \vdash B$
- $A \vdash A \vee B$
- $\{A \vee B, \neg A\} \vdash B$
- $\{A \supset B, A\} \vdash B$ modus ponens: leválasztási szabály
- $\{A \supset B, \neg B\} \vdash \neg A$ modus tollens: indirekt cáfolás sémája
- $\{A \supset B, B \supset C\} \vdash A \supset C$ láncszabály
- $\{A \supset B, A \supset \neg B\} \vdash \neg A$ redukció ad absurdum
- $\neg A \vdash A \supset B$
- $B \vdash A \supset B$

A múlt órán

- Az igazságfunktorkok (logikai műveletek) tulajdonságai
 - nevezetes logikailag ekvivalens formulák
 - logikai műveletek kifejezhetősége egymással
 - nevezetes logikai következmények
 - nevezetes logikai törvények (érvényes formulák)
- Logikai műveletek egymással való kifejezhetősége
- Formulák kielégíthetőségének vizsgálata: A szemantikus táblák módszere
 - A módszer helyessége, teljessége

Milyen logikai művelet van?

(két argumentumal ?)

x_1	x_2	\circ_1	\circ_2	\circ_3	\circ_4	\circ_5	\circ_6	\circ_7	\circ_8
T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
T	F	T	T	T	T	F	F	F	F
F	T	T	T	F	F	T	T	F	F
F	F	T	F	T	F	T	F	T	F

x_1	x_2	\circ_9	\circ_{10}	\circ_{11}	\circ_{12}	\circ_{13}	\circ_{14}	\circ_{15}	\circ_{16}
T	T	F	F	F	F	F	F	F	F
T	F	T	T	T	T	F	F	F	F
F	T	T	T	F	F	T	T	F	F
F	F	T	F	T	F	T	F	T	F

\circ_2 : diszjunktív (\vee)

\circ_5 : implikáció (\supset)

\circ_7 : ekvivalencia (\equiv)

\circ_8 : konjunktív (\wedge)

\circ_{10} : kizáró vagy

Kifejezhetőség

- $A \supset B \Leftrightarrow \neg(A \wedge \neg B)$
- $A \supset B \Leftrightarrow (\neg A \vee B)$
- $A \wedge B \Leftrightarrow \neg(A \supset \neg B)$
- $A \vee B \Leftrightarrow (\neg A \supset B)$
- $A \vee B \Leftrightarrow \neg(\neg A \wedge \neg B)$
- $A \wedge B \Leftrightarrow \neg(\neg A \vee \neg B)$
- $A \equiv B \Leftrightarrow (A \supset B) \wedge (B \supset A)$

Tétel

$\neg, \wedge, \supset, \equiv$ bármelyike kifejezhető egy másik kérmely
kifejezővel:

- \neg, \vee
- \neg, \wedge
- \neg, \supset

Bizonyítás

- \neg, \vee : \wedge kifejezhető, \exists kifejezhető ~~kérmely~~, \equiv kifejezhető \supset, \wedge -sel
- \neg, \wedge : \vee kifejezhető, \exists kifejezhető, \equiv kifejezhető \supset, \wedge -sel
- \neg, \supset : \wedge kifejezhető, \vee kifejezhető, \equiv kifejezhető \supset, \wedge -sel

A többi lehetséges művelet is kifejezhető mindegyik párossal.

Ket idetes mi'celet

x_1	x_2	\circ_1	\circ_2	\circ_3	\circ_4	\circ_5	\circ_6	\circ_7	\circ_8
T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
T	F	T	T	T	T	F	F	F	F
F	T	T	T	F	F	T	T	F	F
F	F	T	F	T	F	T	F	T	F

x_1	x_2	\circ_9	\circ_{10}	\circ_{11}	\circ_{12}	\circ_{13}	\circ_{14}	\circ_{15}	\circ_{16}
T	T	F	F	F	F	F	F	F	F
T	F	T	T	T	T	F	F	F	F
F	T	T	T	F	F	T	T	F	F
F	F	T	F	T	F	T	F	T	F

\circ_7 : "nand"
(a hangin ci'o
fagadeia)

\circ_{15} : "xor"
(a disojin ci'o
fagadeia)

Ki lehet jeini ezekt egyetlen
művelettel?

Igen: A and vagy or önmagában is degeszt.

Például:

Fejessük ki \wedge -t and segítségével:

$$\begin{aligned} \bullet \quad \boxed{A \wedge B} &\Leftrightarrow \neg \neg (A \wedge B) \Leftrightarrow \neg (A \text{ and } B) \\ &\Leftrightarrow \neg ((A \text{ and } B) \wedge (A \text{ and } B)) \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \boxed{(A \text{ and } B) \text{ and } (A \text{ and } B)} \end{aligned}$$

$$\bullet \quad \boxed{\neg A} \Leftrightarrow \neg (A \wedge A) \Leftrightarrow \boxed{A \text{ and } A}$$

Melyik lépés miért igaz?

$$\neg \neg A \Leftrightarrow A$$

$$A \wedge B \Leftrightarrow B \wedge A, A \vee B \Leftrightarrow B \vee A \text{ és } A \equiv B \Leftrightarrow B \equiv A$$

$$A \wedge (B \wedge C) \Leftrightarrow (A \wedge B) \wedge C, A \vee (B \vee C) \Leftrightarrow (A \vee B) \vee C \text{ és } A \equiv (B \equiv C) \Leftrightarrow (A \equiv B) \equiv C$$

$$A \wedge A \Leftrightarrow A \text{ és } A \vee A \Leftrightarrow A$$

$$A \vee (B \wedge C) \Leftrightarrow (A \vee B) \wedge (A \vee C)$$

$$A \wedge (B \vee C) \Leftrightarrow (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$$

$$A \wedge (B \vee A) \Leftrightarrow A \text{ és } A \vee (B \wedge A) \Leftrightarrow A$$

$$\neg (A \wedge B) \Leftrightarrow \neg A \vee \neg B \text{ és } \neg (A \vee B) \Leftrightarrow \neg A \wedge \neg B$$

A múlt órán

- Az igazságfunktorok (logikai műveletek) tulajdonságai
 - nevezetes logikailag ekvivalens formulák
 - logikai műveletek kifejezhetősége egymással
 - nevezetes logikai következmények
 - nevezetes logikai törvények (érvényes formulák)
- Logikai műveletek egymással való kifejezhetősége
- Formulák kielégíthetőségének vizsgálata: A szemantikus táblák módszere
 - A módszer helyessége, teljessége

Formula'r felbætur litrálförne

- litrál: atami formula
atami formula negatífa


positív
litrál

$L^{(0)} = (LC, Con, Form)$
↑
menlogískar
konstantar
eða
atami formula

- Komplement
litrálpör: $p, \neg p$, aðal $p \in Con$


negatív
litrál

Dæmi:



Kiért is lehet az az igaz?
(formulák felbontása literálokra)

Kielégi théoréma:
 $p \wedge (\neg q \vee \neg p)$



Kielégi théoréma, ha $\{p, \neg q\}$ vagy $\{p, \neg p\}$ kielégi théoréma.

Milyen tulajdonságok szerint
konjunkciókat a táblázatban?

α	α_1	α_2
$\neg\neg A_1$	A_1	
$A_1 \wedge A_2$	A_1	A_2
$\neg(A_1 \vee A_2)$	$\neg A_1$	$\neg A_2$
$\neg(A_1 \supset A_2)$	A_1	$\neg A_2$

β	β_1	β_2
$\neg(B_1 \wedge B_2)$	$\neg B_1$	$\neg B_2$
$B_1 \vee B_2$	B_1	B_2
$B_1 \supset B_2$	$\neg B_1$	B_2

- $\boxed{\alpha}$ típusú formula esetén bővíthető a formula halmaz
- $\boxed{\beta}$ típusú formula esetén elágazhat, és alternatívákba bontható bővíthető a formula halmaz
- A levezetés végig kell járni a ~~levezetés~~ (gy. 6H / 20pt) 7

Käultheruue'ger

- $A \in \text{Form}$ alder si sdr alder luel'gi'stett,
la T yitott (men vett).
- $A \in \text{Form}$ irue'ger (logi'ei tö'mei) alder si
gur alder, la $a \neg A$ her fatter' la'hela lert.
- A nomantik la'hela konstansio'ji uer regi'st'e'ul
eldö'nthe'et, men egg formula irue'ger-e.

"eldö'nt'e'si e'gä'ra" \rightarrow

A múlt órán

- Az igazságfunktorkok (logikai műveletek) tulajdonságai
 - nevezetes logikailag ekvivalens formulák
 - logikai műveletek kifejezhetősége egymással
 - nevezetes logikai következmények
 - nevezetes logikai törvények (érvényes formulák)
- Logikai műveletek egymással való kifejezhetősége
- Formulák kielégíthetőségének vizsgálata: A szemantikus táblák módszere
 - A módszer helyessége, teljessége

Vizsgáljuk meg színdetektálhatóságot an (1) színdetektálhatóságot

akkor és
csak akkor,
ha a

- (1). A formula kielégíthetetlen
minden lehetséges zárt ($\Leftrightarrow A$ "lehetővé van")

Helyes és helytelen

A nemantikus formula kielégíthetősége egy módszer a
formula kielégíthetőségének eldöntésére.

- A módszer helyes:

Ha a módszerrel kapott eredmény szerint a formula kielégíthetetlen,
akkor a formula valóban kielégíthetetlen.

- A módszer helyes:

Bármilyen kielégíthetetlen formulára alkalmazom is a módszert,
a módszerrel kapott eredmény az, hogy a formula kielégíthetetlen.

Vizsgáljuk meg zártaságát az (1) zártaságot:

akkor és
csak akkor,
ha a

- (1). A formula kielégíthetetlen
minden lezárta zárt ($\leftrightarrow A$ "lezárt")

Helyes és helyes

A nemantikus tábla konstrukciója egy módszer a
formula kielégíthetőségének eldöntésére.



- A módszer helyes:

Ha a kapott tábla zárt,
akkor a formula valóban kielégíthetetlen.

- A módszer helyes:

Bármilyen kielégíthetetlen formulára alkalmazom is a módszert,
minden kapott tábla zárt.

Reálisított logikai



A múlt órán

- Az igazságfunktorok (logikai műveletek) tulajdonságai
 - nevezetes logikailag ekvivalens formulák
 - logikai műveletek kifejezhetősége egymással
 - nevezetes logikai következmények
 - nevezetes logikai törvények (érvényes formulák)
 - Logikai műveletek egymással való kifejezhetősége
 - Formulák kielégíthetőségének vizsgálata: A szemantikus táblák módszere
 - A módszer helyessége, teljessége
- „Módszerek” helyességének és teljességének a kérdésére még visszatérünk!**

A mai órán

- Szekvent, érvényes szekvent
- Szekvent kalkulus – axiómák és levezetési szabályok
- Levezetési fa, levezetési fa bővítése, bizonyítás
- A szekvent kalkulus helyessége és teljessége

Born	November 24, 1909 Greifswald, Germany
Died	August 4, 1945 (aged 35) Prague, Czechoslovakia
Cause of death	Starvation
Nationality	German
Alma mater	University of Göttingen
Scientific career	
Fields	Mathematics
Doctoral advisor	Paul Bernays

Gerhard Gentzen



Gerhard Gentzen in Prague, 1945.

Szekvent kalkulus – Mi az, hogy szekvent

Szintaxis: Ha Γ és Δ két (esetleg üres) formulahalmaz, akkor a $\Gamma \vdash \Delta$ egy **szekvent**.

Szemantika: Az $\{A_1, \dots, A_n\} \vdash \{B_1, \dots, B_m\}$ szekvent **érvényes**, ha minden olyan ϱ interpretáció esetén, ahol $|A_1|_{\varrho} = \dots = |A_n|_{\varrho} = 1$ van olyan i , hogy $|B_i|_{\varrho} = 1$.

Vagyis: Ha egy szekvent **nem érvényes** – azaz **cáfolható** –, akkor van olyan ϱ interpretáció, melyre $|A_1|_{\varrho} = \dots = |A_n|_{\varrho} = 1$, míg $|B_1|_{\varrho} = \dots = |B_m|_{\varrho} = 0$.

Az érvényesség még egyszer

A szekvent érvényes, ha **minden baloldali** formula teljesülése szükségszerűen maga után vonja, hogy **valamelyik jobboldali** formula teljesül.

A szekvent érvényes, ha **nincs olyan** eset (interpretáció), hogy **egyik jobboldali formula sem** teljesül, miközben az **összes baloldali** teljesül.

Érvényes nement:

$$A, B, C \vdash \neg A, B \wedge C$$

Nem érvényes nement:

$$A, B, C \vdash \neg A, \neg B$$

Az érvényesség még egyszer

A szekvent érvényes, ha **minden baloldali** formula teljesülése szükségszerűen maga után vonja, hogy **valamelyik jobboldali** formula teljesül.

A szekvent érvényes, ha **nincs olyan** eset (interpretáció), hogy **egyik jobboldali formula sem** teljesül, miközben az **összes baloldali** teljesül.

Azaz:

$A_1, \dots, A_n \vdash B_1, \dots, B_m$ érvényes szekvent
akkor és csak akkor, ha

$A_1, \dots, A_n \models B_1 \vee \dots \vee B_m$ fennáll

A mai órán

- Szekvent, érvényes szekvent
- Szekvent kalkulus – axiómák és levezetési szabályok
- Levezetési fa, levezetési fa bővítése, bizonyítás
- A szekvent kalkulus helyessége és teljessége

Szekvent kalkulus – Axiómák és levezetési szabályok

- A szekvent kalkulus **axiómái** a következő alakúak (axiómaséma):

$$\Gamma, A \vdash \Delta, A$$

ahol A egy atomi formula, Γ és Δ pedig formulahalmazok.

- A szekvent kalkulus **levezetési szabályai**:

konjunkció:

$$\frac{\Gamma \vdash \Delta, A \quad \Gamma \vdash \Delta, B}{\Gamma \vdash \Delta, A \wedge B} \qquad \frac{\Gamma, A, B \vdash \Delta}{\Gamma, A \wedge B \vdash \Delta}$$

diszjunkció:

$$\frac{\Gamma \vdash \Delta, A, B}{\Gamma \vdash \Delta, A \vee B} \qquad \frac{\Gamma, A \vdash \Delta \quad \Gamma, B \vdash \Delta}{\Gamma, A \vee B \vdash \Delta}$$

implikáció:

$$\frac{\Gamma, A \vdash \Delta, B}{\Gamma \vdash \Delta, A \supset B} \qquad \frac{\Gamma \vdash \Delta, A \quad \Gamma, B \vdash \Delta}{\Gamma, A \supset B \vdash \Delta}$$

negáció:

$$\frac{\Gamma, A \vdash \Delta}{\Gamma \vdash \Delta, \neg A} \qquad \frac{\Gamma \vdash \Delta, A}{\Gamma, \neg A \vdash \Delta}$$

(premissza és konklúzió) Vegyük észre: Ezek mind „szintaktikai fogalmak”

A levezetési szabályok megőrzik a szekventek érvényességét

Tétel. Ha a levezetési szabály premisszája/premisszái érvényes(ek), akkor a konklúziója is.

Azaz: Ha egy φ interpretáció cáfolja a levezetési szabály konklúzióját, akkor cáfolja a levezetési szabály valamely premisszáját is.

Igazoljuk!

Tétel. Ha a levezetési szabály premisszája/premisszái érvényes(ek), akkor a konklúziója is.

Azaz: Ha egy \mathcal{Q} interpretáció cáfolja a levezetési szabály konklúzióját, akkor cáfolja a levezetési szabály valamely premisszáját is.

$$\frac{\Gamma \vdash \Delta, A \quad \Gamma \vdash \Delta, B}{\Gamma \vdash \Delta, A \wedge B}$$

$$\frac{\Gamma, A, B \vdash \Delta}{\Gamma, A \wedge B \vdash \Delta}$$

$$\frac{\Gamma \vdash \Delta, A, B}{\Gamma \vdash \Delta, A \vee B}$$

$$\frac{\Gamma, A \vdash \Delta \quad \Gamma, B \vdash \Delta}{\Gamma, A \vee B \vdash \Delta}$$

$$\frac{\Gamma, A \vdash \Delta, B}{\Gamma \vdash \Delta, A \supset B}$$

$$\frac{\Gamma \vdash \Delta, A \quad \Gamma, B \vdash \Delta}{\Gamma, A \supset B \vdash \Delta}$$

$$\frac{\Gamma, A \vdash \Delta}{\Gamma \vdash \Delta, \neg A}$$

$$\frac{\Gamma \vdash \Delta, A}{\Gamma, \neg A \vdash \Delta}$$

(Nézzük végig a szabályokat)

Még egy tétel

Tétel. Ha a levezetési szabály premisszája/premisszái érvényes(ek), akkor a konklúziója is.

Tétel. A szekvent kalkulus axiómái érvényesek.

Még egy tétel

A szekvent kalkulus axiómái a következő alakúak:

$$\Gamma, A \vdash \Delta, A$$

Tétel. Ha a levezetés
értékes(ek), akkor a konklúziója is.

Tétel. A szekvent kalkulus axiómái értékesek.

Bizonyítás. Ha a \mathcal{M} modellje a szekvent első
formulahalmazának, akkor az abban szereplő atomi
formulák halmazának is modellje. Ezek közül legalább egy a
definíció szerint a szekvent második formulahalmazában is
szerepel, így a szekvent értékes.

A mechanikus eljárás (a szabályalkalmazás) és a szemantikai fogalmak közötti kapcsolat

Tétel. Ha a levezetési szabály premisszája/premisszái érvényes(ek), akkor a konklúziója is.

Tétel. A szekvent kalkulus axiómái érvényesek.

A mechanikus eljárás: Ha axiómákból kiindulva a szabályok alkalmazásával le tudunk vezetni egy szekventet, akkor az érvényes.

Milyen axiómákból induljunk ki? Nem tudjuk, haladjunk tehát „visszafelé”, a szekventtől az axiómák felé.

Például

Próbáljuk ki: <http://logitext.mit.edu/main>

$$X \rightarrow Y, \sim Y \vdash \sim X$$

$$X \supset Y, \neg Y \vdash \neg X$$

Jelölések:

\rightarrow (implikáció),

\sim (negáció),

\vdash (levezethetőség)

\wedge (konjunkció)

\vee (diszjunkció)

Mi is történt

$$\frac{\Gamma \vdash \Delta, A \quad \Gamma \vdash \Delta, B}{\Gamma \vdash \Delta, A \wedge B} \quad \frac{\Gamma, A, B \vdash \Delta}{\Gamma, A \wedge B \vdash \Delta}$$

$$\frac{\Gamma \vdash \Delta, A, B}{\Gamma \vdash \Delta, A \vee B} \quad \frac{\Gamma, A \vdash \Delta \quad \Gamma, B \vdash \Delta}{\Gamma, A \vee B \vdash \Delta}$$

$$\frac{\Gamma, A \vdash \Delta, B}{\Gamma \vdash \Delta, A \supset B} \quad \frac{\Gamma \vdash \Delta, A \quad \Gamma, B \vdash \Delta}{\Gamma, A \supset B \vdash \Delta}$$

$$\frac{\Gamma, A \vdash \Delta}{\Gamma \vdash \Delta, \neg A} \quad \frac{\Gamma \vdash \Delta, A}{\Gamma, \neg A \vdash \Delta}$$

$$\frac{\frac{X \vdash X, Y \quad X, Y \vdash Y}{X, X \rightarrow Y \vdash Y} (\rightarrow I)}{\frac{X, X \rightarrow Y, \neg Y \vdash}{X \rightarrow Y, \neg Y \vdash \neg X} (\neg I)} (\neg E)$$

A mai órán

- Szekvent, érvényes szekvent (**→szintaxis és szemantika**)
- Szekvent kalkulus – axiómák és levezetési szabályok (**→szintaktikai szabályok, kapcsolatuk a szemantikai érvényesség fogalommal**)
- Levezetési fa, levezetési fa bővítése, bizonyítás (**→szintaktikai szabályok alkalmazása: szemantikai vizsgálódástól mentes mechanikus eljárás – bizonyítás, bizonyíthatóság**)
- A szekvent kalkulus helyessége és teljessége (**→bizonyíthatóság és érvényesség kapcsolata**)


Levezetési fa, levezetési fa bővítése

- A **levezetési fa** egy olyan fa, melynek **csúcsaiban szekventek** állnak, és a **levezetési szabályok** szerint épül fel.
- Speciális esetben: Egy $\Gamma \vdash \Delta$ szekvent egyben egy **levezetési fa** is, melynek ez a szekvent a **gyökere**, sőt **egyetlen levele** is.

Most úgy képzeljük a fát, hogy „lent” van a gyökere, és „felfelé nő”, azaz „fent” vannak a levelei.

Levezetési fa, levezetési fa bővítése

- Legyen F egy **levezetési fa**, melynek egyik **levele** a $\Gamma \vdash \Delta$ szekvent. Tegyük fel, hogy van egy olyan **levezetési szabály**, melynek a **konklúziója** „illeszthető” a $\Gamma \vdash \Delta$ szekventre, míg a **premisszái** a $\Gamma_1 \vdash \Delta_1, \dots, \Gamma_n \vdash \Delta_n$ szekventek.
- **Bővítsük az F levezetési fát** a $\Gamma \vdash \Delta$ szekvent felett a $\Gamma_1 \vdash \Delta_1, \dots, \Gamma_n \vdash \Delta_n$ szekventekkel (megfelelő „illesztés” és „helyettesítés” után), így kapjuk a F' levezetési fát, melynek a **gyökere** az F gyökere, **leveleit** pedig az F levelei (mínusz $\Gamma \vdash \Delta$) és a $\Gamma_1 \vdash \Delta_1, \dots, \Gamma_n \vdash \Delta_n$ szekventek alkotják



Levezetési fa, levezetési fa bővítése

- Legyen F eszaki szekvent. T melynek a $\Gamma_n \vdash \Delta_n$ szel

$$\begin{array}{c}
 \frac{\Gamma \vdash \Delta, A \quad \Gamma \vdash \Delta, B}{\Gamma \vdash \Delta, A \wedge B} \quad \frac{\Gamma, A, B \vdash \Delta}{\Gamma, A \wedge B \vdash \Delta} \\
 \\
 \frac{\Gamma \vdash \Delta, A, B}{\Gamma \vdash \Delta, A \vee B} \quad \frac{\Gamma, A \vdash \Delta \quad \Gamma, B \vdash \Delta}{\Gamma, A \vee B \vdash \Delta} \\
 \\
 \frac{\Gamma, A \vdash \Delta, B}{\Gamma \vdash \Delta, A \supset B} \quad \frac{\Gamma \vdash \Delta, A \quad \Gamma, B \vdash \Delta}{\Gamma, A \supset B \vdash \Delta} \\
 \\
 \frac{\Gamma, A \vdash \Delta}{\Gamma \vdash \Delta, \neg A} \quad \frac{\Gamma \vdash \Delta, A}{\Gamma, \neg A \vdash \Delta}
 \end{array}$$

- Bővítsük az $\Gamma_n \vdash \Delta_n$ szel gyökere az és a $\Gamma_1 \vdash \Delta_1, \dots, \Gamma_m \vdash \Delta_m$ szel

a $\Gamma \vdash \Delta$ si szabály, $\Gamma \vdash \Delta_1, \dots,$

a $\Gamma_1 \vdash \Delta_1, \dots,$ t, melynek a mínusz $\Gamma \vdash \Delta$)

$$\frac{A \vdash A \quad \frac{A \vdash A, B}{A \vdash A \vee B} \text{ (Vr)}}{A \vdash A \wedge (A \vee B)} \text{ (Ar)}$$

A szekvent kalkulus mechanikus (szintaktikai szabályokon alapuló) eljárás bizonyítások konstruálására

- Egy levezetési fa **bizonyítás**, ha minden levele axióma.

Például:

$$\begin{array}{c}
 \frac{X \vdash X, Y \quad X, Y \vdash Y}{X, X \rightarrow Y \vdash Y} (\rightarrow I) \\
 \frac{X, X \rightarrow Y \vdash Y}{X, X \rightarrow Y, \neg Y \vdash} (\neg I) \\
 \frac{X, X \rightarrow Y, \neg Y \vdash}{X \rightarrow Y, \neg Y \vdash \neg X} (\neg E)
 \end{array}$$

$$\frac{A \vdash A \quad \frac{A \vdash A, B}{A \vdash A \vee B} (\vee I)}{A \vdash A \wedge (A \vee B)} (\wedge I)$$

Mit „bizonyít”?

Vegyük észre, hogy itt a „bizonyítás” szintaktikai fogalom:

A gyökér egy szekvent, a fa a szintaktikai szabályoknak megfelelően épül fel, a levelek axiómák.

A mai órán

- Szekvent, érvényes szekvent (**→szintaxis és szemantika**)
- Szekvent kalkulus – axiómák és levezetési szabályok (**→szintaktikai szabályok, kapcsolatuk a szemantikai érvényesség fogalommal**)
- Levezetési fa, levezetési fa bővítése, bizonyítás (**→szintaktikai szabályok alkalmazása: szemantikai vizsgálódástól mentes mechanikus eljárás – bizonyítás, bizonyíthatóság**)
- A szekvent kalkulus helyessége és teljessége (**→bizonyíthatóság és érvényesség kapcsolata**)

Vágjunk egy rendet még egyszer...

Szintaktikai fogalmak:

- szekvent
- axióma
- levezetési szabályok, levezetési fa, levezetési fa bővítése
- **bizonyítás** (gyökérszekvent, minden levél axióma)

Szemantikai fogalmak:

- szekvent érvényessége
- az axiómák érvényessége
- a levezetési szabályok alapján átalakított szekventek érvényességének megmaradása
- **teljesség, helyesség** (ha egy szekvent érvényes, akkor van bizonyítása illetve ha egy fa bizonyítás, akkor a gyökérszekventje érvényes)

A „ \vdash ” egy szintaktikai reláció („szintaktikai következményreláció”, „bizonyíthatóság”),
míg „ \models ” egy szemantikai reláció („szemantikai következményreláció”)

A szekvent kalkulus mint bizonyítási eljárás **helyessége** és **teljessége**

Egy levezetési fa **bizonyítás**, ha minden levele axióma.

Tétel.

Minden bizonyítás gyökérszekventje érvényes.

Tétel.

Ha az S szekvent érvényes, akkor létezik olyan bizonyítás, melynek a gyökérszekventje S .

A szekvent kalkulus mint bizonyítási eljárás **helyessége** és **teljessége**

Egy levezetési fa **bizonyítás**, ha minden levele axióma.

Tétel. ← Helyesség

Minden bizonyítás gyökérszekventje érvényes.

Tétel. ← Teljesség

Ha az S szekvent érvényes, akkor létezik olyan bizonyítás, melynek a gyökérszekventje S .

A szekvent kalkulus helyes

Bizonyítás. Tegyük fel indirekt, hogy van egy bizonyítás cáfolható gyökérszekvenntel.

- Strukturális indukcióval belátható, hogy egy cáfolható gyökerű levezetési fának van cáfolható levele.
- Levezetési fa cáfolható levéllel nem bizonyítás.
- Ellentmondáshoz jutottunk, így a gyökérnek érvényesnek kell lenni.

„Strukturális indukcióval belátható, hogy egy cáfolható gyökerű levezetési fának van cáfolható levele.” **Miért is?**

- Ha egy csúcsnál lévő szekvent cáfolható (nem érvényes), akkor a „felette” lévő csúcsok legalább egyike is cáfolható
- A gyökér cáfolható

$$\frac{\Gamma \vdash \Delta, A \quad \Gamma \vdash \Delta, B}{\Gamma \vdash \Delta, A \wedge B}$$

$$\frac{\Gamma, A, B \vdash \Delta}{\Gamma, A \wedge B \vdash \Delta}$$

$$\frac{\Gamma \vdash \Delta, A, B}{\Gamma \vdash \Delta, A \vee B}$$

$$\frac{\Gamma, A \vdash \Delta \quad \Gamma, B \vdash \Delta}{\Gamma, A \vee B \vdash \Delta}$$

$$\frac{\Gamma, A \vdash \Delta, B}{\Gamma \vdash \Delta, A \supset B}$$

$$\frac{\Gamma \vdash \Delta, A \quad \Gamma, B \vdash \Delta}{\Gamma, A \supset B \vdash \Delta}$$

$$\frac{\Gamma, A \vdash \Delta}{\Gamma \vdash \Delta, \neg A}$$

$$\frac{\Gamma \vdash \Delta, A}{\Gamma, \neg A \vdash \Delta}$$

Azaz: lesz olyan levél,
ami cáfolható.

A szekvent kalkulus teljes

Azaz: Ha az S szekvent érvényes, akkor létezik olyan bizonyítás, melynek a gyökérszekventje S .

- 1. Lemma.** Egy csak atomi formulákat tartalmazó szekvent, pontosan akkor érvényes, ha axióma.
- 2. Lemma.** Bármely levezetési fa kiterjeszthető olyan levezetési fává, melynek levelei csak atomi formulákat tartalmaznak.
- 3. Lemma.** Bármely érvényes gyökerű levezetési fának csak érvényes levelei vannak.

Igazoljuk a lemmákat!

A szekvent kalkulus axiómái a következő alakúak:

$\Gamma, A \vdash \Delta, A$

1. Lemma. Egy csak atomi formulákat tartalmazó szekvent **pontosan akkor** érvényes, ha axióma, azaz:

- **ha axióma, akkor érvényes**, (könnyű)
- **ha érvényes, akkor axióma**.

Igazoljuk a lemmákat!

A szekvent kalkulus axiómái a következő alakúak:

$\Gamma, A \vdash \Delta, A$

1. Lemma. Egy csak atomi formulákat tartalmazó szekvent **pontosan akkor** érvényes, ha axióma, azaz:

- ha axióma, akkor érvényes,
- **ha érvényes, akkor axióma.**

Igazoljuk a lemmákat!

A szekvent kalkulus axiómái a következő alakúak:

$$\Gamma, A \vdash \Delta, A$$

1. Lemma. Egy csak atomi formulákat tartalmazó szekvent **pontosan akkor** érvényes, ha axióma, azaz:

- ha axióma, akkor érvényes,
- ha érvényes, akkor axióma, azaz **ha nem axióma, akkor nem érvényes.**

Valóban:

$A_1, \dots, A_n \vdash B_1, \dots, B_m$, ahol $A_i \neq B_j$ bármely i, j esetén.

Legyen q az az interpretáció, ahol $|A_i|_q = 1$ és $|B_j|_q = 0$.

Igazoljuk a lemmákat!

2. Lemma. Bármely levezetési fa kiterjeszthető olyan levezetési fává, melynek levelei csak atomi formulákat tartalmaznak.

Valóban: A szabályalkalmazás során „egyszerűsödnek” a formulák.

$$\frac{\Gamma \vdash \Delta, A \quad \Gamma \vdash \Delta, B}{\Gamma \vdash \Delta, A \wedge B}$$

$$\frac{\Gamma, A, B \vdash \Delta}{\Gamma, A \wedge B \vdash \Delta}$$

$$\frac{\Gamma \vdash \Delta, A, B}{\Gamma \vdash \Delta, A \vee B}$$

$$\frac{\Gamma, A \vdash \Delta \quad \Gamma, B \vdash \Delta}{\Gamma, A \vee B \vdash \Delta}$$

$$\frac{\Gamma, A \vdash \Delta, B}{\Gamma \vdash \Delta, A \supset B}$$

$$\frac{\Gamma \vdash \Delta, A \quad \Gamma, B \vdash \Delta}{\Gamma, A \supset B \vdash \Delta}$$

$$\frac{\Gamma, A \vdash \Delta}{\Gamma \vdash \Delta, \neg A}$$

$$\frac{\Gamma \vdash \Delta, A}{\Gamma, \neg A \vdash \Delta}$$

Igazoljuk a lemmákat!

3. Lemma. Bármely érvényes gyökerű levezetési fának csak érvényes levelei vannak.

Valóban: Ha a konklúzió szekventje érvényes, akkor a premisszá(k) szekventje(i) is érvényes(ek).

- Azaz: ha a premisszák nem érvényesek, akkor a konklúzió sem érvényes.
- Azaz: ha van olyan interpretáció, amiben legalább az egyik premissza jobb oldalán minden formula hamis, és a bal oldalán minden formula igaz, akkor ebben az interpretációban a konklúzió baloldalán lévő formulák is igazak lesznek, míg a jobboldalon lévők hamisak.

Ha van olyan interpretáció, amiben legalább az egyik premissza jobb oldalán minden formula hamis, és a bal oldalán minden formula igaz, akkor ebben az interpretációban a konklúzió baloldalán lévő formulák is igazak lesznek, míg a jobboldalon lévők hamisak.
(Szemléletesebben: A szabályalkalmazás „megőrzi” a cáfolhatóságot.)

$$\frac{\Gamma \vdash \Delta, A \quad \Gamma \vdash \Delta, B}{\Gamma \vdash \Delta, A \wedge B}$$

$$\frac{\Gamma, A, B \vdash \Delta}{\Gamma, A \wedge B \vdash \Delta}$$

$$\frac{\Gamma \vdash \Delta, A, B}{\Gamma \vdash \Delta, A \vee B}$$

$$\frac{\Gamma, A \vdash \Delta \quad \Gamma, B \vdash \Delta}{\Gamma, A \vee B \vdash \Delta}$$

$$\frac{\Gamma, A \vdash \Delta, B}{\Gamma \vdash \Delta, A \supset B}$$

$$\frac{\Gamma \vdash \Delta, A \quad \Gamma, B \vdash \Delta}{\Gamma, A \supset B \vdash \Delta}$$

$$\frac{\Gamma, A \vdash \Delta}{\Gamma \vdash \Delta, \neg A}$$

$$\frac{\Gamma \vdash \Delta, A}{\Gamma, \neg A \vdash \Delta}$$

A szekvent kalkulus teljességéről

Azaz: Ha az S szekvent érvényes, akkor létezik olyan bizonyítás, melynek a gyökérszekventje S .

- 1. Lemma.** Egy csak atomi formulákat tartalmazó szekvent, pontosan akkor érvényes, ha axióma.
- 2. Lemma.** Bármely levezetési fa kiterjeszthető olyan levezetési fává, melynek levelei csak atomi formulákat tartalmaznak.
- 3. Lemma.** Bármely érvényes gyökerű levezetési fának csak érvényes levelei vannak.

A szekvent kalkulus teljes

Azaz: Ha az S szekvent érvényes, akkor létezik olyan bizonyítás, melynek a gyökérszekventje S .

Bizonyítás: Legyen S egy érvényes szekvent!

- Terjesszük ki ebből a gyökérből álló levezetési fát olyan fává, melynek a levelei csak atomi formulákat tartalmaznak. (A **2. lemma** szerint ez lehetséges.)
- Mivel a gyökér érvényes, a fa minden levele érvényes (a **3. lemma** szerint).
- Ha egy szekvent érvényes és csak atomi formulákat tartalmaz, akkor (az **1. lemma** szerint) axióma, így a levezetési fa minden levele axióma, tehát ez a levezetési fa bizonyítás.

Mit is bizonyítottunk:

A szekvent kalkulus **helyessége** és **teljessége**

Tétel.

Minden bizonyítás gyökérszekventje érvényes.

Tétel.

Ha az S szekvent érvényes, akkor létezik olyan bizonyítás, melynek a gyökérszekventje S .

Azaz: Ha egy szekvent érvényes, akkor be lehet bizonyítani, továbbá ha egy szekventnek van bizonyítása, akkor az érvényes.

Azaz: A szekvent pontosan akkor érvényes, ha bizonyítható.

Ismét: A „ \vdash ” egy szintaktikai reláció („bizonyíthatóság”), míg a szekvent érvényessége egy szemantikai relációt „ \models ” fejez ki („logikai következmény”)

Megjegyzés: Cáfoló modell létezése

Tétel. Ha az S szekvent nem bizonyítható, akkor létezik egy interpretáció, mely cáfolja.

Bizonyítás.

- Készítsük el S egy olyan levezetési fáját ami a leveleken csak atomi formulákat tartalmaz.
- Mivel S nem bizonyítható, létezik egy nem axióma levélszekvent: $A_1, \dots, A_n \vdash B_1, \dots, B_m$, ahol $A_i \neq B_j$ bármely i, j esetén.
- Definiáljuk a q interpretációt úgy, hogy minden i, j -re legyen $|A_i|_q = 1$ és $|B_j|_q = 0$.
- q cáfolja a levél szekventjét, s így a gyökérszekventet is.

$|A_i|_q=1$ és $|B_j|_q=0$. „ q cáfolja a levél szekventjét,
s így a gyökérszekventet is” **Miért is?**

$$\frac{\Gamma \vdash \Delta, A \quad \Gamma \vdash \Delta, B}{\Gamma \vdash \Delta, A \wedge B}$$

$$\frac{\Gamma, A, B \vdash \Delta}{\Gamma, A \wedge B \vdash \Delta}$$

$$\frac{\Gamma \vdash \Delta, A, B}{\Gamma \vdash \Delta, A \vee B}$$

$$\frac{\Gamma, A \vdash \Delta \quad \Gamma, B \vdash \Delta}{\Gamma, A \vee B \vdash \Delta}$$

$$\frac{\Gamma, A \vdash \Delta, B}{\Gamma \vdash \Delta, A \supset B}$$

$$\frac{\Gamma \vdash \Delta, A \quad \Gamma, B \vdash \Delta}{\Gamma, A \supset B \vdash \Delta}$$

$$\frac{\Gamma, A \vdash \Delta}{\Gamma \vdash \Delta, \neg A}$$

$$\frac{\Gamma \vdash \Delta, A}{\Gamma, \neg A \vdash \Delta}$$

Például

$$\begin{array}{c}
 \frac{A, A, B \vdash C, B}{A, B \vdash C, \neg A, B} (\neg\text{-r}) \quad \frac{A, A, B \vdash C, C}{A, B \vdash C, \neg A, C} (\neg\text{-r}) \quad \frac{A, A, B, B \vdash B}{A, B, B \vdash \neg A, B} (\neg\text{-r}) \quad \frac{A, A, B, B \vdash C}{A, B, B \vdash \neg A, C} (\neg\text{-r}) \\
 \hline
 \frac{A, B \vdash C, \neg A, B \quad A, B \vdash C, \neg A, C}{A, B \vdash C, \neg A, B \wedge C} (\wedge\text{-r}) \quad \frac{A, B, B \vdash \neg A, B \quad A, B, B \vdash \neg A, C}{A, B, B \vdash \neg A, B \wedge C} (\wedge\text{-r}) \\
 \hline
 A, B, C \rightarrow B \vdash \neg A, B \wedge C \quad (\rightarrow\text{-I})
 \end{array}$$

A leveleket
cáfoló
interpretáció:

$$|A|_q = 1$$

$$|B|_q = 1$$

$$|C|_q = 0$$

cáfolja a
gyökeret is

$$\frac{\Gamma \vdash \Delta, A \quad \Gamma \vdash \Delta, B}{\Gamma \vdash \Delta, A \wedge B}$$

$$\frac{\Gamma, A, B \vdash \Delta}{\Gamma, A \wedge B \vdash \Delta}$$

$$\frac{\Gamma \vdash \Delta, A, B}{\Gamma \vdash \Delta, A \vee B}$$

$$\frac{\Gamma, A \vdash \Delta \quad \Gamma, B \vdash \Delta}{\Gamma, A \vee B \vdash \Delta}$$

$$\frac{\Gamma, A \vdash \Delta, B}{\Gamma \vdash \Delta, A \supset B}$$

$$\frac{\Gamma \vdash \Delta, A \quad \Gamma, B \vdash \Delta}{\Gamma, A \supset B \vdash \Delta}$$

$$\frac{\Gamma, A \vdash \Delta}{\Gamma \vdash \Delta, \neg A}$$

$$\frac{\Gamma \vdash \Delta, A}{\Gamma, \neg A \vdash \Delta}$$

A mai órán

- Szekvent, érvényes szekvent
- Szekvent kalkulus – axiómák és levezetési szabályok
- Levezetési fa, levezetési fa bővítése, bizonyítás
- A szekvent kalkulus helyessége és teljessége