

# **Kapitola XI.**

## **Vlastnosti regulárních jazyků**

# Pumping lemma pro RJ

**Myšlenka: Pumping lemma ukazuje nekonečné iterace některých podřetězců v řetězcích v RJ.**

- Necht'  $L$  je RJ. Pak existuje  $k \geq 1$  takové, že: **pokud**  $z \in L$  a  $|z| \geq k$ , **pak** existuje  $u, v, w: z = uvw$ ,  
1)  $v \neq \varepsilon$  2)  $|uv| \leq k$  3) pro každé  $m \geq 0$ ,  $uv^m w \in L$



**Příklad:** pro RV  $r = ab^*c$ ,  $L(r)$  je *regulární*.

Pro tento jazyk existuje  $k = 3$  takové, že 1), 2) a 3) platí.

- pro  $z = \underset{\substack{\downarrow \text{orange} \\ u}}{a} \underset{\substack{\downarrow \text{blue} \\ v}}{b} \underset{\substack{\downarrow \text{green} \\ w}}{c}$ :  $z \in L(r)$  a  $|z| \geq 3$ :  
 $uv^0w = ab^0c = ac \in L(r)$   
 $uv^1w = ab^1c = abc \in L(r)$   
 $uv^2w = ab^2c = abbc \in L(r)$   
 $\vdots$   
 $v \neq \varepsilon, |uv| = 2 \leq 3$
- pro  $z = \underset{\substack{\downarrow \text{orange} \\ u}}{a} \underset{\substack{\downarrow \text{blue} \\ v}}{bb} \underset{\substack{\downarrow \text{green} \\ w}}{c}$ :  $z \in L(r)$  a  $|z| \geq 3$ :  
 $uv^0w = ab^0bc = abc \in L(r)$   
 $uv^1w = ab^1bc = abbc \in L(r)$   
 $uv^2w = ab^2bc = abbbc \in L(r)$   
 $\vdots$   
 $v \neq \varepsilon, |uv| = 2 \leq 3$

# Pumping lemma: Ilustrace

- $L$  = libovolný regulární jazyk:




- 1)  $v \neq \varepsilon$
- 2)  $|v| \leq k$



...


# Důkaz pumping lemma 1/3

- Necht'  $L$  je libovolný regulární jazyk. Potom existuje **DKA**  $M = (Q, \Sigma, R, s, F)$  a  $L = L(M)$ .
- Pro  $z \in L(M)$ ,  $M$  provede  $|z|$  přechodů a  $M$  navštíví  $|z| + 1$  stavů:
- pro  $z = a_1 a_2 \dots a_n$ :



## Důkaz pumping lemma 2/3

- Necht'  $k = \text{card}(Q)$  (celkový počet stavů v  $M$ ).  
Pro každé  $z \in L$  a  $|z| \geq k$ ,  $M$  navštíví nejméně  $k + 1$  stavů. Protože  $k + 1 > \text{card}(Q)$ , musí existovat stav  $q$ , který  $M$  navštíví nejméně dvakrát.
- Pro  $z$  existuje  $u, v, w$  takové, že:  $z = uvw$ :



Celkově:

$$sz = suvw \vdash^i qvw \vdash^j qw \vdash^* f, f \in F$$

# Důkaz pumping lemma 3/3

- Obecně tedy  $M$  může provést přechody:  
 ①  $su \vdash^i q$ ;    ②  $qv \vdash^j q$ ;    ③  $qw \vdash^* f, f \in F$ , tedy:  
 • pro  $m = 0$ ,  $uv^m w = uv^0 w = uw$ ,

$$\overset{\textcircled{1.}}{suw} \vdash^i \overset{\textcircled{3.}}{qw} \vdash^* f, f \in F$$

- pro každé  $m > 0$ ,

$$\overset{\textcircled{1.}}{su} v^m w \vdash^i \overset{\textcircled{2.}}{qv^m} w \vdash^j \overset{\textcircled{2.}}{qv^{m-1}} w \vdash^j \dots \vdash^j \overset{\textcircled{3.}}{qw} \vdash^* f, f \in F$$

**Celkově:**

- 1)  $qv \vdash^j q, j \geq 1$ ; proto  $|v| \geq 1$ , tedy  $v \neq \varepsilon$
- 2)  $su \vdash^i qv \vdash^j q, i + j \leq k$ ; proto  $|uv| \leq k$
- 3) Pro každé  $m \geq 0$ :  $su v^m w \vdash^* f, f \in F$ , proto  $uv^m w \in L$

**CBD**

# Pumping lemma: Aplikace I.

- Pomocí pumping lemma pro RJ často provádíme důkaz sporem, že daný jazyk **není** regulární:

Předpokládejme, že  $L$  je regulární

Uvažujme PL konstantu  $k$  a vyberme  $z \in L$ , jehož délka je závislá na  $k$  tak, že  $|z| \geq k$  je vždy pravdivé

Pro všechny dekompozice  $z$  na  $uvw$ ,  $v \neq \varepsilon$ ,  $|uv| \leq k$  ukážeme:  
 existuje  $m \geq 0$ , pro které  $uv^m w \notin L$ ;  
 ale podle PL platí vztah:  $uv^m w \in L$  } **SPOR**

**špatný předpoklad**



Proto  
 **$L$  není regulární**


# Pumping Lemma: Příklad

Dokažme, že  $L = \{a^n b^n : n \geq 0\}$  není regulární:

1) Předpokládejme, že  $L$  je regulární. Necht'  $k \geq 1$  je konstanta z pumping lemma pro jazyk  $L$ .

2) Necht'  $z = a^k b^k : a^k b^k \in L$ ,  $|z| = |a^k b^k| = 2k \geq k$

3) Všechny dekompozice  $z$  na  $uvw$ ,  $v \neq \varepsilon$ ,  $|uv| \leq k$ :



4) Proto  $L$  není regulární jazyk



## Poznámka k použití pumping lemma

- **Pumping lemma:**

pokud  $L$  je regulární  $\Rightarrow$  existuje  $k \geq 1$  a ...

### Základní aplikace pumping lemma:

- důkaz sporem, že  $L$  není regulární jazyk.

- Ale následující implikace je **špatná**:

~~pokud existuje  $k \geq 1$  a ...  $\Rightarrow L$  je regulární~~

- **Nelze** použít pumping lemma k dokázání, že daný jazyk  $L$  je regulární!!

# Pumping lemma: Aplikace II. 1/3

- Pumping lemmu je možné použít k dokazování dalších tvrzení.

## Ilustrace:

- Necht'  $M$  je DKA a  $k$  konstanta z pumping lemmy ( $k$  je počet stavů v  $M$ ). Potom platí:  
 $L(M)$  je nekonečný  $\Leftrightarrow$  existuje  $z \in L(M)$ ,  $k \leq |z| < 2k$

## Důkaz:

1) existuje  $z \in L(M)$ ,  $k \leq |z| < 2k \Rightarrow L(M)$  je nekonečný:

pokud  $z \in L(M)$ ,  $k \leq |z|$ , potom podle PL:


$z = uvw$ ,  $v \neq \varepsilon$  a dále pro každé  $m \geq 0$ :  $uv^mw \in L(M)$

$L(M)$  je nekonečný

# Pumping Lemma: Aplikace II. 2/3

2)  $L(M)$  je nekonečný  $\Rightarrow$  existuje  $z \in L(M)$ ,  $k \leq |z| < 2k$ :


- Dokážeme sporem, že platí:



a) Dokážeme sporem, že:

- $L(M)$  je nekonečný  $\Rightarrow$  existuje  $z \in L(M)$ ,  $|z| \geq k$

Předpokládme, že  $L(M)$  je nekonečný a neexistuje  $z \in L(M)$ ,  $|z| \geq k$




# Pumping Lemma: Aplikace II. 3/3

**b)** Dokážeme sporem:

- **existuje**  $z \in L(M)$ ,  $|z| \geq k \Rightarrow$   
**existuje**  $z \in L(M)$ ,  $k \leq |z| < 2k$

Předpokl., že **existuje**  $z \in L(M)$ ,  $|z| \geq k$   
 a **neexistuje**  $z \in L(M)$ ,  $k \leq |z| < 2k$



Nechť  $z_0$  je **nejkratší řetězec** splňující  $z_0 \in L(M)$ ,  $|z_0| \geq k$

Protože neexistuje  $z \in L(M)$ ,  $k \leq |z| < 2k$ , musí:  $|z_0| \geq 2k$

Pokud  $z_0 \in L(M)$  a  $|z_0| \geq k$ , PL zaručuje:  $z_0 = uvw$ ,

$|uv| \leq k$  a pro každé  $m \geq 0$ ,  $uv^m w \in L(M)$

$$|uw| = \underbrace{|z_0|}_{\geq 2k} - \underbrace{|v|}_{\leq k} \geq k \quad \text{pro } m = 0: uv^m w = uw \in L(M)$$

**Celkově:**  $uw \in L(M)$ ,  $|uw| \geq k$  a  $|uw| < |z_0|$ !

**$z_0$  není nejkratší řetězec** splňující  $z_0 \in L(M)$ ,  $|z_0| \geq k$


**SPOR!**

## Uzávěrové vlastnosti 1/2

**Definice:** Třída regulárních jazyků je uzavřená vůči operaci  $\circ$ , pokud výsledek operace  $\circ$  na libovolné regulární jazyky je opět regulární jazyk.

### Ilustrace:

- Třída regulárních jazyků je uzavřená vůči *sjednocení*.  
To znamená:



## Uzávěrové vlastnosti 2/2

**Tvrzení:** Třída regulárních jazyků je uzavřena vůči: **sjednocení, konkatenaci, iteraci.**

### Důkaz:

- Necht'  $L_1, L_2$  jsou dva **regulární jazyky**
- Potom existují dva RV  $r_1, r_2$ :  $L(r_1) = L_1, L(r_2) = L_2$ ;
- Podle definice regulárních výrazů:
  - $r_1.r_2$  je RV značící  $L_1 L_2$
  - $r_1 + r_2$  je RV značící  $L_1 \cup L_2$
  - $r_1^*$  je RV značící  $L_1^*$
- Každý RV značí regulární jazyk, tedy  $L_1 L_2, L_1 \cup L_2, L_1^*$  jsou **regulární jazyky**

# Algoritmus: KA pro doplněk


- **Vstup:** Úplný KA:  $M = (Q, \Sigma, R, s, F)$
- **Výstup:** Úplný KA:  $M' = (Q, \Sigma, R, s, F')$ ,  

$$L(M') = \overline{L(M)}$$

## • Metoda:

- $F' := Q - F$

## Příklad:



$L(M) = \{x: ab \text{ je podřetězec } x\}$ ;  $L(M') = \{x: ab \text{ není podřetězec } x\}$




# KA pro doplněk: Problém

- Předchozí algoritmus vyžaduje **úplný** KA
- Pokud  $M$  není úplný KA, potom  $M$  musí být převeden na úplný KA a pak může být použit předchozí algoritmus

## Příklad:




Neúplný DKA:

$$L(M_1') \neq \overline{L(M)}! - c \notin L(M), c \notin L(M_1')$$



$$L(M_2') = \overline{L(M)}$$

Úplný DKA:





# Uzávěrové vlastnosti: Doplněk

**Tvrzení:** Třída regulárních jazyků je uzavřena vůči **doplňku**.

## Důkaz:

- Necht'  **$L$**  je **regulární jazyk**
- Pak existuje úplný DKA  $M$ :  $L(M) = L$
- Můžeme sestrojit úplný DKA  $M'$ :  $L(M') = \overline{L}$   
užitím předchozího algoritmu
- Každý KA definuje regulární jazyk, tedy  **$\overline{L}$**  je **regulární jazyk**

# Uzávěrové vlastnosti: Průnik

**Tvrzení:** Třída regulárních jazyků je uzavřena vůči **průniku**.

## Důkaz:

- Necht'  $L_1, L_2$  jsou dva **regulární jazyky**
- $\overline{L_1}, \overline{L_2}$  jsou **regulární jazyky**  
(třída regulárních jazyků je uzavřena vůči doplňku)
- $\overline{L_1} \cup \overline{L_2}$  je **regulární jazyk**  
(třída regulárních jazyků je uzavřena vůči sjednocení)
- $\overline{\overline{L_1} \cup \overline{L_2}}$  je **regulární jazyk**  
(třída regulárních jazyků je uzavřena vůči doplňku)
- $L_1 \cap L_2 = \overline{\overline{L_1} \cup \overline{L_2}}$  je **regulární jazyk**  
(De-Morganovy zákony)

## Boolova algebra jazyků

**Definice:** Necht' je třída jazyků uzavřena vůči sjednocení, průniku a doplňku. Potom tato třída tvoří *Boolovu algebru jazyků*.

**Tvrzení:** Třída regulárních jazyků tvoří Booleovu algebru jazyků.

**Důkaz:**


- Třída regulárních jazyků je uzavřená vůči sjednocení, průniku a doplňku.

# Minimalizace: Rozlišitelné stavy

**Myšlenka:** Řetězec  $w$  *rozlišuje* stavy  $p$  a  $q$ , pokud se DSKA „dostane“ z právě z jedné z konfigurací  $pw$  a  $qw$  do koncového stavu.

**Definice:** Necht'  $M = (Q, \Sigma, R, s, F)$  je DSKA a necht'  $p, q \in Q, p \neq q$ . Stavy  $p$  a  $q$  jsou *rozlišitelné* pokud existuje řetězec  $w \in \Sigma^*$  takový, že:  
 $pw \vdash^* p'$  and  $qw \vdash^* q'$ , kde  $p', q' \in Q$  a  
 $((p' \in F \text{ a } q' \notin F) \text{ nebo } (p' \notin F \text{ a } q' \in F))$ .  
Jinak stavy  $p$  a  $q$  jsou *nerozlišitelné*.

# Rozlišitelné stavy: Příklad



- $s$  a  $q_1$  jsou **rozlišitelné**, protože např. pro  $w = a$ :

$$\begin{aligned} sa &\vdash s, s \notin F \\ q_1 a &\vdash q_2, q_2 \in F \end{aligned}$$

- $q_2$  a  $q_3$  jsou **nerozlišitelné**, protože pro každé  $w \in \Sigma^*$ :

$$\begin{aligned} q_2 w &\vdash^* q_2, q_2 \in F \\ q_3 w &\vdash^* q_3, q_3 \in F \end{aligned}$$

- Ostatní dvojice stavů jsou triviálně **rozlišitelné** pro  $w = \varepsilon$ .

## Minimální KA

**Definice:** Necht'  $M$  je DSKA. Potom,  $M$  je *minimální KA*, pokud  $M$  obsahuje pouze rozlišitelné stavy.

**Tvrzení:** Pro každý DSKA  $M$ , existuje ekvivalentní minimální KA  $M_m$ .

**Důkaz:** Použij následující algoritmus.

# Algoritmus: Minimalizace KA

- **Vstup:** DSKA  $M = (Q, \Sigma, R, s, F)$
- **Výstup:** Minimální KA  $M_m = (Q_m, \Sigma, R_m, s_m, F_m)$


---

- **Metoda:**
- $Q_m = \{\{p: p \in F\}, \{q: q \in Q - F\}\};$
- **repeat**
  - if** existuje  $X \in Q_m$ ,  $d \in \Sigma$ ,  $X_1, X_2 \subset X$  takové, že:
 
$$X = X_1 \cup X_2, X_1 \cap X_2 = \emptyset$$
**and**

$$\{q_1: p_1 \in X_1, p_1 d \rightarrow q_1 \in R\} \subseteq Q_1, Q_1 \in Q_m,$$

$$\{q_2: p_2 \in X_2, p_2 d \rightarrow q_2 \in R\} \cap Q_1 = \emptyset$$
**then** rozštěp  $X$  na  $X_1$  a  $X_2$  v  $Q_m$
- until** není možné provést další štěpení;
- $R_m = \{Xa \rightarrow Y: X, Y \in Q_m, pa \rightarrow q \in R, p \in X, q \in Y, a \in \Sigma\};$
- $s_m = X: s \in X; F_m := \{X: X \in Q_m, X \cap F \neq \emptyset\}.$

# Minimalizace: Příklad 1/4



1)  $X = \{s, f\}$ : Z jedné množiny Z jedné množiny

$d = a$ :  $sa \rightarrow f$   
 $fa \rightarrow s$

$d = b$ :  $sb \rightarrow q_3$   
 $fb \rightarrow q_4$

2)  $X = \{q_1, q_2, q_3, q_4\}$ : Z jedné množiny

$d = a$ :  $q_1 a \rightarrow q_1$   
 $q_2 a \rightarrow q_2$   
 $q_3 a \rightarrow q_4$   
 $q_4 a \rightarrow q_3$

$d = b$ :  $q_1 b \rightarrow s$   
 $q_2 b \rightarrow f$   
 $q_3 b \rightarrow q_1$   
 $q_4 b \rightarrow q_2$

$\{s, f\} \subseteq Q_1 = \{s, f\}$

Štěpení:  $\{q_1, q_2, q_3, q_4\} \Rightarrow \underbrace{\{q_1, q_2\}}_{X_1}, \underbrace{\{q_3, q_4\}}_{X_2}$

$\{q_1, q_2\} \cap Q_1 = \emptyset$



# Minimalizace: Příklad 2/4

$$Q_m = \{\{s, f\}, \{q_1, q_2\}, \{q_3, q_4\}\}$$

1)  $X = \{s, f\}$ : Z jedné množiny Z jedné množiny

$d = a$ :  $sa \rightarrow f$ ,  $fa \rightarrow s$

$d = b$ :  $sb \rightarrow q_3$ ,  $fb \rightarrow q_4$

2)  $X = \{q_1, q_2\}$ : Z jedné množiny Z jedné množiny

$d = a$ :  $q_1a \rightarrow q_1$ ,  $q_2a \rightarrow q_2$

$d = b$ :  $q_1b \rightarrow s$ ,  $q_2b \rightarrow f$

3)  $X = \{q_3, q_4\}$ : Z jedné množiny Z jedné množiny

$d = a$ :  $q_3a \rightarrow q_3$ ,  $q_4a \rightarrow q_4$

$d = b$ :  $q_3b \rightarrow q_1$ ,  $q_4b \rightarrow q_2$

**Žádné další štěpení !!!**

# Minimalizace: Příklad 3/4

$$Q_m = \{\{s, f\}, \{q_1, q_2\}, \{q_3, q_4\}\}$$

$$\begin{array}{l} sa \rightarrow f \in R: \\ fa \rightarrow s \in R: \end{array} \} \Rightarrow \{s, f\}a \rightarrow \{s, f\} \in R_m$$

$$\begin{array}{l} sb \rightarrow q_3 \in R: \\ fb \rightarrow q_4 \in R: \end{array} \} \Rightarrow \{s, f\}b \rightarrow \{q_3, q_4\} \in R_m$$

$$\begin{array}{l} q_1a \rightarrow q_1 \in R: \\ q_2a \rightarrow q_2 \in R: \end{array} \} \Rightarrow \{q_1, q_2\}a \rightarrow \{q_1, q_2\} \in R_m$$

$$\begin{array}{l} q_1b \rightarrow s \in R: \\ q_2b \rightarrow f \in R: \end{array} \} \Rightarrow \{q_1, q_2\}b \rightarrow \{s, f\} \in R_m$$

$$\begin{array}{l} q_3a \rightarrow q_3 \in R: \\ q_4a \rightarrow q_4 \in R: \end{array} \} \Rightarrow \{q_3, q_4\}a \rightarrow \{q_3, q_4\} \in R_m$$

$$\begin{array}{l} q_3b \rightarrow q_1 \in R: \\ q_4b \rightarrow q_2 \in R: \end{array} \} \Rightarrow \{q_3, q_4\}b \rightarrow \{q_1, q_2\} \in R_m$$

# Minimalizace: Příklad 4/4

$$s \in \{s, f\} \Longrightarrow s_m := \{s, f\}$$


$$\left. \begin{array}{l} s \in F: \\ f \in F: \end{array} \right\} \Longrightarrow \{s, f\} \in F_m$$

$M_m = (Q_m, \Sigma, R_m, s_m, F_m)$ , kde:  $\Sigma = \{a, b\}$ ,  $s_m = \{s, f\}$

$Q_m = \{\{s, f\}, \{q_1, q_2\}, \{q_3, q_4\}\}$ ,  $F_m = \{\{s, f\}\}$

$R_m = \{\{s, f\}a \rightarrow \{s, f\}, \{s, f\}b \rightarrow \{q_3, q_4\}, \{q_1, q_2\}a \rightarrow \{q_1, q_2\},$   
 $\{q_1, q_2\}b \rightarrow \{s, f\}, \{q_3, q_4\}a \rightarrow \{q_3, q_4\}, \{q_3, q_4\}b \rightarrow \{q_1, q_2\}\}$

**Celkově:**



# Typy KA: Shrnutí

	KA	KA bez $\varepsilon$ -přech.	DKA	Úplný KA	DSKA	Minimální KA
Počet všech pravidel tvaru $p \rightarrow q$ , kde $p, q \in Q$	0-n	0	0	0	0	0
Počet pravidel tvaru $pa \rightarrow q$ , pro libovolné $p \in Q$ a libovolné $a \in \Sigma$	0-n	0-n	0-1	1	1	1
Počet všech nedostupných stavů	0-n	0-n	0-n	0-n	0	0
Počet všech neukončujících stavů	0-n	0-n	0-n	0-n	0-1	0-1
Počet všech možných těchto automatů pro jeden regulární jazyk	$\infty$	$\infty$	$\infty$	$\infty$	$\infty$	1

# Hlavní rozhodnutelné problémy

## 1. Problém členství:

- Instance: FA  $M$ ,  $w \in \Sigma^*$ ; Otázka:  $w \in L(M)$ ?

## 2. Problém prázdnosti:

- Instance: FA  $M$ ; Otázka:  $L(M) = \emptyset$ ?

## 3. Problém konečnosti:

- Instance: FA  $M$ ; Otázka: Je  $L(M)$  konečný?

## 4. Problém ekvivalence:

- Instance: FA  $M_1, M_2$ ; Otázka:  $L(M_1) = L(M_2)$ ?

## Algoritmus: Problém členství

- **Vstup:** DKA  $M = (Q, \Sigma, R, s, F)$ ;  $w \in \Sigma^*$
  - **Výstup:** **ANO**, pokud  $w \in L(M)$   
**NE**, pokud  $w \notin L(M)$
- 

- **Metoda:**
  - if  $sw \vdash^* f, f \in F$  then napiš('ANO')  
else napiš('NE')
- 

**Celkově:**

Problém členství je pro KA rozhodnutelný

# Algoritmus: Problém prázdnoti

- **Vstup:** KA  $M = (Q, \Sigma, R, s, F)$ ;
  - **Výstup:** **ANO**, pokud  $L(M) = \emptyset$   
**NE**, pokud  $L(M) \neq \emptyset$
- 

- **Metoda:**
  - if  $s$  je neukončující then napiš('ANO')  
else napiš('NE')
- 

**Celkově:**

Problém prázdnoti je pro KA rozhodnutelný

# Algoritmus: Problém konečnosti

- **Vstup:** DKA  $M = (Q, \Sigma, R, s, F)$ ;
  - **Výstup:** **ANO**, pokud  $L(M)$  je konečný  
**NE**, pokud  $L(M)$  je nekonečný
- 
- **Metoda:**
  - Necht'  $k = \text{card}(Q)$
  - **if** existuje  $z \in L(M)$ ,  $k \leq |z| < 2k$  **then** napiš('NE')  
**else** napiš('ANO')
- 

**Pozn.:** Tento algoritmus je založen na tvrzení:

$L(M)$  je nekonečný  $\Leftrightarrow$  existuje  $z: z \in L(M), k \leq |z| < 2k$


---

**Celkově:**

Problém konečnosti je pro KA rozhodnutelný



# Rozhodnutelné problémy: Příklad



**Otázka:**  $ab \in L(M)$  ?

$sab \vdash sb \vdash f, f \in F$

**Odpověď:** **ANO**, protože  $sab \vdash^* f, f \in F$

**Otázka:**  $L(M) = \emptyset$  ?

$Q_0 = \{f\}$

1.  $qa' \rightarrow f; q \in Q; a' \in \Sigma: sb \rightarrow f, fa \rightarrow f$

$Q_1 = \{f\} \cup \{s, f\} = \{f, s\} \dots s$  je ukončující

**Odpověď:** **NE**, protože  $s$  je ukončující

**Otázka:** Je  $L(M)$  konečný?  $k = \text{Card}(Q) = 2$

Všechny řetězce  $z \in \Sigma^*: 2 \leq |z| < 4: aa, bb, ab \in L(M), \dots$

**Odpověď:** **NE**, protože existuje  $z \in L(M), k \leq |z| < 2k$

# Algoritmus: Problém ekvivalence

- **Vstup:** Dva minimální KA,  $M_1$  a  $M_2$
  - **Výstup:** **ANO**, pokud  $L(M_1) = L(M_2)$   
**NE**, pokud  $L(M_1) \neq L(M_2)$
- 


- **Metoda:**
  - **if**  $M_1$  má stejnou strukturu jako  $M_2$  až na pojmenování stavů  
**then** napiš('ANO')  
**else** napiš('NE')
- 

**Celkově:**

Problém ekvivalence je pro KA rozhodnutelný

# Problém ekvivalence: Příklad

Otázka:  $L(M_1) = L(M_2)$ ?



Odpověď: **ANO**, protože  $M_{min1}$  má stejnou strukturu jako  $M_{min2}$