

Optativa 4rt curs de Biotecnologia

Modelització i simulació de biosistemes

Revisió: Sistemes lineals

Joan Albiol


Departament d'Enginyeria Química
Escola d'Enginyeria
Universitat Autònoma de Barcelona



Operacions amb vectors i matrius:

Producte matricial:

Requeriment: el nombre de columnes de la primera matriu ha de ser igual al nombre de files de la segona. Els components es multipliquen un a un i es sumen segons:



Resum d'operacions amb vectors i matrius

$$N_{i,j} \text{ fila } i, \text{ columna } j \quad J = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} 1 \text{ columna} \\ n \text{ files} \end{matrix} \quad N = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 0 & \dots \\ 0 & 1 & -1 & -1 & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix} \begin{matrix} n \text{ columnes} \\ m \text{ files} \\ (m \times n) \end{matrix}$$

Normes de càlcul

Multiplicació per constant: $k \cdot \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ka_{11} & ka_{12} \\ ka_{21} & ka_{22} \end{pmatrix}$

Suma
$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}_{(m \times n)} + \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix}_{(m \times n)} = \begin{pmatrix} a_{11}+b_{11} & a_{12}+b_{12} \\ a_{21}+b_{21} & a_{22}+b_{22} \end{pmatrix}_{(m \times n)}$$

Producte
$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}_{(m \times n)} \cdot \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix}_{(n \times p)} = \begin{pmatrix} a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} & a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22} \\ a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21} & a_{21}b_{12} + a_{22}b_{22} \end{pmatrix}_{(m \times p)}$$

Inversa
$$A B = C \xrightarrow{\quad} A \underbrace{B B^{-1}} = C B^{-1} \xrightarrow{\quad} A = C B^{-1}$$

$$B B^{-1} = I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad B \text{ ha de ser quadrada no singular}$$

Multiplicar per la dreta o per l'esquerra dona resultats diferents:

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 29 & 27 \\ 42 & 40 \end{bmatrix} \quad 1$$

$$\mathbf{A} \times \mathbf{B} = \mathbf{C}$$

$$\begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 17 & 39 \\ 22 & 52 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{B} \times \mathbf{A} = \mathbf{D}$$

Per tant dividir per la dreta o esquerra també

Per transposar el resultat, transposar tot el sistema i canviar l'ordre

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 29 & 27 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{a} \times \mathbf{B} = \mathbf{c}$$

$$\begin{bmatrix} 5 & 7 \\ 6 & 8 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 29 & 27 \\ 22 & 52 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{B}^T \times \mathbf{a}^T = \mathbf{c}^T$$

El treball amb sistemes lineals es facilita molt si s'expressen en forma de matrius i vectors

Exemples:

A)
$$p = a \times x + b \times y$$
$$q = c \times x + d \times y$$

$$\begin{pmatrix} p \\ q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{b} = \mathbf{A} \times \mathbf{x}$$

B)


$$p = a \times x + b \times y + c \times z$$
$$q = d \times x + e \times y + f \times z$$
$$r = g \times x + h \times y + j \times z$$

$$\begin{pmatrix} p \\ q \\ r \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & j \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$


$$\mathbf{b} = \mathbf{A} \times \mathbf{x}$$

Visió gràfica de la solució d'un sistema:


$$1 = x + y$$
$$0 = x - y$$



$$1 = x + y$$
$$0 = x + y$$



$$1 = x + y$$
$$2 = 2x + 2y$$



Habitualment interessa trobar la solució d'un sistema tal com:

Solució: $\mathbf{b} = \mathbf{A} \times \mathbf{x}$

$$\mathbf{x} = \mathbf{A}^{-1} \times \mathbf{b}$$

equivalentment: $\mathbf{A}^{-1} \times \mathbf{b} = \mathbf{A}^{-1} \times \mathbf{A} \times \mathbf{x}$

$$\mathbf{A}^{-1} \times \mathbf{b} = \mathbf{I} \times \mathbf{x}$$

$$\begin{pmatrix} 6 & 8 & 1 \\ 1 & 6 & 5 \\ 2 & 6 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 8 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.67 & 0.33 & 0 \\ -0.17 & -0.67 & 0.5 \\ 0.67 & 0.33 & -0.33 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0.5 & 0.5 & 0.5 \\ 0.5 & -0.5 & 0.5 \\ 0.5 & -0.5 & 0.5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.5 \\ 0.5 \\ 0.5 \end{pmatrix}$$

Un sistema que té solució és '**consistent**'. Si no la té és '**inconsistent**'.

Condicions per tenir solució única:

- El determinant de la matriu A no pot ser zero
- Les files o columnes han de ser 'linealment independents' (num lin. Ind.=rang)
- La matriu ha de tenir rang 'sencer'. (rang igual al nombre de files-columnes)
- La matriu ha de ser quadrada

Si les condicions es compleixen:

- El sistema és determinat i de solució única

Si les condicions no es compleixen:

- a) Si hi ha més equacions que incògnites però el rang és igual al nombre d'incògnites ('**sobredeterminat**', redundant): Es pot trobar una solució amb la '**pseudoinversa**'
- $$\mathbf{x} = \left(\mathbf{A}^T \times \mathbf{A} \right)^{-1} \times \mathbf{A}^T \times \mathbf{b}$$

- b) Si **no** hi ha un nombre d'equacions suficient o si el rang és 'deficient'. '**subdeterminat**':

- El nombre de solucions és infinit.
- És necessari determinar els '**graus de llibertat**'
(graus de llibertat) gdl= incògnites - rang
- Cal mesurar tantes variables com '**graus de llibertat**' per trobar una solució al sistema.

Cas particular: si el sistema és 'homogeni'

$$0 = \mathbf{A} \times \mathbf{x}$$

- Si la matriu és de rang 'sencer' el sistema només té una solució: **zeros**
- Si la matriu és de rang 'deficitari' el sistema pot tenir altres solucions que la trivial (o no tenir solució)
- Si la matriu representa un sistema 'subdeterminat' però **consistent**, hi ha infinites solucions
- l'espai vectorial que compren el conjunt de vectors \mathbf{x} que fan **zero** = $\mathbf{A} \cdot \mathbf{x}$ es coneix com l'espai '**nul**' o '**kernel**'.
- Les **dimensions** de l'espai nul són iguals al **màxim nombre** de vectors '**linealment independents**' de l'espai. També són iguals al nombre de vectors que formen una 'base' de l'espai nul. Igual també al nombre de graus de llibertat del sistema.
- La matriu '**kernel**' -**K**- està formada per tants vectors com les dimensions de l'espai nul. Representa una '**base**' de l'espai nul. Qualsevol vector solució de $0 = \mathbf{A} \cdot \mathbf{x}$, és combinació lineal de la base i per tant: $\mathbf{x} = \mathbf{K} \times \boldsymbol{\alpha}$

Suposem que es poden mesurar tantes variables com graus de llibertat

Un sistema: $\mathbf{0} = \mathbf{A} \times \mathbf{x}$

Es pot descompondre en: $\mathbf{0} = \mathbf{A}_c \times \mathbf{x}_c + \mathbf{A}_m \times \mathbf{x}_m$

Subíndex m = mesurats, c=calculats

Amb solució $\mathbf{x}_c = -\mathbf{A}_c^{-1} \times \mathbf{A}_m \times \mathbf{x}_m$ Sempre que existeixi la inversa de \mathbf{A}_c

Idènticament per un sistema no homogeni:

$$\mathbf{b} = \mathbf{A} \times \mathbf{x} \quad \mathbf{b} = \mathbf{A}_c \times \mathbf{x}_c + \mathbf{A}_m \times \mathbf{x}_m$$

$$\mathbf{x}_c = \mathbf{A}_c^{-1} \times (\mathbf{b} - \mathbf{A}_m \times \mathbf{x}_m) \quad \text{Sempre que existeixi la inversa}$$

Per descompondre el sistema (o la matriu A) (en una part corresponent a les mesures i un altra als calculats) cal recordar que podem reordenar les columnes d'una matriu si reordenem també el vector x sense que canviï la solució del sistema

A qualsevol sistema consistent es pot definir una ‘**solució general del sistema**’ com a combinació lineal d’una solució particular i de la solució del sistema homogeni subjacent:

Es a dir donat un sistema: $\mathbf{b} = \mathbf{A} \times \mathbf{x}$ Que té per solució el vector: \mathbf{v}

Lavors: $\mathbf{v} = \mathbf{p} + \mathbf{h}$ on: \mathbf{p} És una solució particular

Per exemple: $\mathbf{p} = \left(\mathbf{A}^T \times \mathbf{A} \right)^{-1} \times \mathbf{A}^T \times \mathbf{b}$

\mathbf{h} És una solució del sistema

homogeni: $\mathbf{0} = \mathbf{A} \times \mathbf{h} \quad \mathbf{h} = \mathbf{K} \times \alpha$

$$\mathbf{v} = \mathbf{p} + \mathbf{K} \times \alpha$$

Alfa és un vector amb tantes files com columnes té K. Igual als graus de llibertat del sistema.

Donant valors a alfa es pot calcular qualsevol solució del sistema.

Es fa servir, per exemple per explorar les solucions possibles que compleixen algun altra condició.

Exemples:

Sistema sobredeterminat:

$$\begin{array}{ccc} \begin{matrix} 3 & 4 \\ 7 & 7 \\ 1 & 2 \\ 5 & 6 \end{matrix} \begin{matrix} \hat{u} \\ \hat{u} \\ \hat{u} \\ \hat{u} \end{matrix} & = & \begin{matrix} 1 \\ 5 \\ 7 \\ 5 \end{matrix} \begin{matrix} \hat{e} \\ \hat{e} \\ \hat{e} \\ \hat{e} \end{matrix} \\ \begin{matrix} 2 & 3 \\ 4 & 6 \\ 8 & 9 \\ 4 & 3 \end{matrix} \begin{matrix} \hat{u} \\ \hat{u} \\ \hat{u} \\ \hat{u} \end{matrix} & = & \begin{matrix} 2 \\ 4 \\ 8 \\ 4 \end{matrix} \begin{matrix} \hat{e} \\ \hat{e} \\ \hat{e} \\ \hat{e} \end{matrix} \end{array}$$

$$\mathbf{x} = (\mathbf{A}^T \times \mathbf{A})^{-1} \times \mathbf{A}^T \times \mathbf{b}$$

$$\begin{array}{ccc} \begin{matrix} 3 & 4 \\ 7 & 7 \\ 1 & 2 \\ 5 & 6 \end{matrix} \begin{matrix} \hat{u} \\ \hat{u} \\ \hat{u} \\ \hat{u} \end{matrix} & = & \begin{matrix} 1 \\ 5 \\ 7 \\ 5 \end{matrix} \begin{matrix} \hat{e} \\ \hat{e} \\ \hat{e} \\ \hat{e} \end{matrix} \\ \begin{matrix} 2 & 3 \\ 4 & 6 \\ 8 & 9 \\ 4 & 3 \end{matrix} \begin{matrix} \hat{u} \\ \hat{u} \\ \hat{u} \\ \hat{u} \end{matrix} & = & \begin{matrix} 2 \\ 4 \\ 8 \\ 4 \end{matrix} \begin{matrix} \hat{e} \\ \hat{e} \\ \hat{e} \\ \hat{e} \end{matrix} \end{array}$$

Sistema subdeterminat (\mathbf{A}_c invertible):

(Suposem que s'ha mesurat X_1 i X_2)

$$\begin{array}{ccc} \begin{matrix} 7 & 0 \\ 1 & 3 \\ 1 & 3 \end{matrix} \begin{matrix} \hat{u} \\ \hat{u} \\ \hat{u} \end{matrix} & = & \begin{matrix} 1 \\ 5 \\ 5 \end{matrix} \begin{matrix} \hat{e} \\ \hat{e} \\ \hat{e} \end{matrix} \\ \begin{matrix} 2 & 3 \\ 4 & 6 \\ 4 & 6 \end{matrix} \begin{matrix} \hat{u} \\ \hat{u} \\ \hat{u} \end{matrix} & = & \begin{matrix} 2 \\ 4 \\ 4 \end{matrix} \begin{matrix} \hat{e} \\ \hat{e} \\ \hat{e} \end{matrix} \end{array}$$

$$\mathbf{x}_c = \mathbf{A}_c^{-1} \times (\mathbf{b} - \mathbf{A}_m \times \mathbf{x}_m)$$

$$\begin{array}{ccc} \begin{matrix} 7 & 0 \\ 1 & 3 \\ 1 & 3 \end{matrix} \begin{matrix} \hat{u} \\ \hat{u} \\ \hat{u} \end{matrix} & = & \begin{matrix} 1 \\ 5 \\ 5 \end{matrix} \begin{matrix} \hat{e} \\ \hat{e} \\ \hat{e} \end{matrix} \\ \begin{matrix} 2 & 3 \\ 4 & 6 \\ 4 & 6 \end{matrix} \begin{matrix} \hat{u} \\ \hat{u} \\ \hat{u} \end{matrix} & = & \begin{matrix} 2 \\ 4 \\ 4 \end{matrix} \begin{matrix} \hat{e} \\ \hat{e} \\ \hat{e} \end{matrix} \end{array}$$

Sistema subdeterminat (A_c no invertible):

$$\begin{bmatrix} 0 & -1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ -15 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Kernel de A:

$$\mathbf{K} = \begin{bmatrix} 0.5 \\ 0.5 \\ 0 \\ -0.5 \\ 0.5 \end{bmatrix}$$

Solució particular
amb pseudoinversa:

$$\mathbf{p} = \begin{bmatrix} 15 \\ 0 \\ 15 \\ 15 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Qualsevol solució és
funció de alfa:

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 15 \\ 0 \\ 15 \\ 15 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -0.5 \\ 0.5 \\ 0 \\ -0.5 \\ 0.5 \end{bmatrix} \alpha$$

$$\mathbf{v} = \mathbf{p} + \mathbf{K} \alpha$$