


腹膜透析病人若發生腹膜炎可能導致嚴重的併發症。研究發現，病人接受侵入性檢查與發生腹膜炎之間有重要相關。因此，接受侵入性檢查前使用預防性抗生素可以降低腹膜炎發生率！

### 需要使用預防性抗生素的檢查項目

1. 腹部檢查：大腸直腸鏡檢查、膀胱鏡檢查、膽囊內視鏡切除術、內視鏡逆行性膽胰管造影術。
2. 婦科檢查：子宮頸抹片、子宮鏡檢查及子宮內膜刮除術等。
3. 其他侵入治療：拔牙、植牙。



### 侵入性檢查前注意事項

1. 腹腔內視鏡檢查及牙科侵入性治療前，病人需回腎臟科門診經由醫師評估後，使用預防性抗生素。
2. 因透析藥水是葡萄糖溶液，灌入腹腔後腹膜的防禦力減弱，接受腹部及子宮頸抹片檢查前，需先將腹腔的透析液漏空，避免感染。

### 如何使用預防性抗生素

1. 將醫師開的抗生素加入腹膜透析液藥水後，注入腹腔內留置約**6-8**小時，在檢查日早上先將腹腔的透析液漏空，再去做腹腔內視鏡檢查。
2. 檢查前一日睡前吃醫師開的口服抗生素。

### 腹膜透析導管與透析藥水污染時處理方法

汙染因素	處理方法
迷你輸液管接頭汙染	<p>1.勿更換藥水，蓋上新的小白帽後，請聯絡腹膜透析護理師並立刻就醫，更換新的迷你輸液管。</p> <p>2.經醫師評估是否使用預防性抗生素。</p>

<p>將破損的腹膜透析藥水注入腹腔</p>	<p>1.注入透析藥水時發現藥袋破損，請立即分離藥水後聯絡腹膜透析護理師並就醫處理。</p> <p>2.依醫囑使用預防性抗生素。</p>
<p>迷你輸液管破損</p>	<p>1.夾上小白夾或反摺導管避免漏水，請立即聯絡腹膜透析護理師並就醫，更換新的迷你輸液管。</p> <p>2.依醫囑使用預防性抗生素。</p>
<p>鈦金屬接頭和迷你輸液管鬆脫</p>	<p>1.拴緊金屬接頭，夾上小白夾或反摺導管避免漏水，請立即聯絡腹膜透析護理師並就醫，更換新的迷你輸液管。</p>

	2.依醫囑使用預防性抗生素。
--	----------------

病人接受侵入性檢查前務必告知腹膜透析護理師，並由醫師評估後使用預防

性抗生素，若未提早使用預防性抗生素，將會增加腹膜炎感染率。