

一、什麼是暫時性雙腔透析導管？適用於急性腎衰竭、預接受長期血液透析但尚未建立動靜脈瘻管或 等待動靜脈瘻管成熟、動靜脈瘻管感染或功能喪失的病人，會先放置暫時性導管進行血液透析治療。此導管有兩個管腔，一般放置於內頸靜脈或股靜脈，在無感染或阻塞下，頸靜脈導管可留置4週，股靜脈導管可留置2週。

二、暫時性雙腔透析導管注意事項 (一)可在急診、病房、加護病房或血液透析室直接放置導管，放置後須砂袋加壓2-4小時，並注意有無出血、皮下血腫、呼吸短促、胸痛、咳嗽不止等情形。(二)導管放置後可立即使用此導管做血液透析治療。治療時，護理師會幫您做導管護理及更換敷料；請您保持傷口清潔乾燥，避免感染，若有滲血或弄濕，請隨時通知護理師處理。每次透析結束後，護理師會將抗凝劑注入導管內，預防血液凝固。(三)除非醫師許可或急救，否則除血液透析使用外，禁止由導管做任何治療(包含給藥、抽血)，以延長導管使用壽命。

三、居家自我照顧注意事項 (一)家中須備有無菌棉棒、無菌紗布、碘酒、無菌生理食鹽水、紙膠，若有滲濕、滲血或敷料脫落，請遵照護理師教導方式進行換藥。(二)導管傷口勿隨意塗抹藥膏，需依醫囑指示方可使用。(三)保持導管周圍皮膚乾燥，注意勿弄濕傷口，若不慎弄濕須立即換藥；並禁止淋浴泡澡、游泳。(四)每日觀察導管插入處皮膚有無紅、腫、熱、痛、滲血或膿樣分泌物，導管有無縫線脫落、移位、外露長度變長等情形，若發生以上情況或有發燒、寒顫，請立即連絡醫護人員或返院就醫。(五)不可自行將覆蓋於傷口及導管出口的紗布或紙膠撕開，更不可任意讓傷口敞開、鬆開管夾或用手直接觸碰傷口及導管。若紗布、紙膠不慎脫落，應立即更換敷料，以免造成感染。(六)萬一導管不慎滑脫，請立即用無菌紗布壓迫止血，並立刻返院就醫。(七)若為意識不清或躁動病人，為避免不自主拔管危險，必要時雙手可以適當約束。(八)內頸靜脈導管與股靜脈導管個別注意事項：1.內頸靜脈導管：(1)沐浴採擦澡方式，胸部以下可用水沖洗，但須避免弄濕傷口，以免造成感染。(2)可使用髮夾、運動頭帶、紙膠等物品固定導管末端，避免拉扯、晃動、扭轉或加壓於導管上，以減少穿刺處出血及縫線斷落。2.股靜脈導管：(1)平常儘量減少大腿彎曲之動作及下床活動，臥床休息時腿部儘量保持平直，以免導管彎曲及靜脈血回流，造成導管阻塞。(2)沐浴宜採擦澡方式，避免弄濕傷口，造成感染。宜穿著寬鬆內、外褲，避免更衣時不慎拉扯導管，保持會陰處的清潔，避免大小便時弄濕或弄髒傷口。