

1. 造成腎臟受傷的原因？ ◆ 腎水泡：是良性的囊腫。在腎臟有一個或數個水泡並無大礙，但有一種遺傳性疾病叫多囊腎，會導致腎衰竭。◆ 高血壓：會造成腎血管的傷害，進而影響腎功能，腎臟病也會使血壓愈來愈高，造成惡性循環。◆ 糖尿病：會造成腎血管的傷害，糖尿病是國內導致尿毒症患者的第二多原因。

2. 其他可能造成腎臟受傷的原因？ ◆ 暴露在重金屬(如鉛和水銀)，和其他毒性化學物質中。◆ 長期使用止痛劑。◆ 長期使用具腎瘡性的藥物，例：來路不明之中草藥、藥丸。◆ 痛風：長期高尿酸血症易引起腎臟病變。◆ 子癲癇症(懷孕的併發症)

3. 日常生活注意事項： ◆ 多喝水，一天2000-3000c.c.；千萬不可憋尿，易造成尿路感染。\* 控制高血壓及血糖，預防併發症。\* 飲食均衡攝取，定食定量。\* 排尿不順或有灼熱疼痛感，應儘速求醫，避免造成腎臟損傷。◆ 感冒時，應遵照醫師醫囑用藥，切勿自行至西藥房購買成藥服用。◆ 少吃高脂肪及含鹽份高的食物，例：罐頭食品及醃漬物。\* 應儘量少食用普林含量高之食物。如：豆類、動物內臟類及濃縮肉汁、雞精...等。\* 避免壓力、少抽煙、喝酒，並適量運動。◆ 規律的生活，避免熬夜，充分的睡眠及休息。