當腎臟功能只剩下正常人的十分之一以下時,腎臟無法有效的排除體內代謝廢物及水分。此時,病人會出現尿毒症狀,如水腫、噁心、嘔吐、倦怠、喘,即稱為末期腎衰竭。需要接受飲食控制、藥物治療,嚴重者需要用替代性療法來取代腎臟的功能,以維持正常的生理狀態。

## 末期腎衰竭的治療方式有哪些?

- 保留性保守療法:針對症狀給予藥物治療及飲食控制;此方法簡單 且容易執行可延續療程改善症狀,適用於早期腎衰竭病人。
- 腎臟替代性治療法:
  - 腎臟移植:俗稱「換腎」。經由外科手術,將一個健康的腎臟種 到腎衰竭病人體內,新的腎臟就可以執行原先壞掉腎臟不能 做的功能,移植後需規則服用免疫抑制劑。
  - 血液透析:俗稱「洗血」或「洗腰子」,是應用體外循環進行血液 淨化。將血液導引至人工腎臟的半透膜,排除廢物和多餘的

水分,再將乾淨血液送回體內,此種治療需建立適當的血管通路。

血液透析					
優點	缺點				
•	•				
快速有效地清除廢物和水	須承受打針之苦				
分	● 治療中及治療後可能有不				
● 由專業醫療人員執行	適感				
● 家中不必準備任何透析用	<ul><li>兩次透析間,體內會累積</li></ul>				
品	大量毒素和水分				
	● 飲食限制較嚴格				
	● 對心肺血管系統影響較大				
	● 貧血情形較嚴重				

一星期到醫院3次,與其他病人或醫護人員間的接觸較為頻繁

- 經血液感染疾病的危險性 較腹膜透析者高
- 無法任意更改透析時間

腹膜透析:俗稱「洗肚子」,是透析方式中最早被採用的治療方式。
腹膜透析是一種利用人體天然半透膜一腹膜(一層覆蓋在腹腔內壁及臟器上的薄膜)來代替腎臟排除代謝廢物及多餘水分的功能。

腹膜透析				
優點	缺點			

持續性的透析

是一種可以自我掌控與安排的透析

- 飲食限制比較少
- 不需要打針
- 貧血情形較不嚴重
- 對心血管的影響甚少
- 減少經由血液感染的危險
- 維持較久的殘餘腎功能

若執行不當, 會有腹膜炎

及導管感染的可能

● 可能會使體重、血脂肪增

加

● 有少量蛋白質流失

## 我如何選擇透析治療方式

- 以正向積極樂觀的態度接受透析,並且和您的主治醫師、護理人員 討論您的感受。
- 考慮您對透析後生活型態的期望為何。
- 和您的主治醫師、護理人員討論,什麼是最適合您的透析方式。