類固醇的作用 1. 消炎作用 。 2. 抑制免疫作用 。 3. 血管收縮。 4. 會造成水份及鹽份堆積於體內,引超 高血壓。 5. 血中鉀離子會偏低。 6. 體內脂肪重新分配。 §可能出現的副作用 1. 食慾變好、體重增加、臉變圓(俗稱月亮臉)。 2. 頸背部突起(俗稱水牛背)。 3. 身軀變胖(尤其是腹部)、四肢則變得較紬瘦。 4. 皮膚變薄,血管因皮膚透明度增加而使臉色看超來較紅。 5. 易有瘀青現象,傷口癒合較差。 6. 高血壓、高血糖。 7. 毛髮可能變得比以前黑或濃。 8. 抑制感染、發燒。 9. 消化道潰瘍。 §使用注意事項 1長期服用藥物停用時,需採漸進式地停用。 2.避免服用處方外的蔡品,尤其是消炎止痛藥物,以免長期或大量服用類固醇輾物卻不自知。 3.勿空腹服用,如有腸胃不適可與食物併服。有任何疾病應在服用藥物前先告知醫師,以作為調整劑量的參考。 4.用 藥期間若有異常、或做任何手術 (包含拔牙)、接種疫苗前,須先請示醫師。 5. 有高血壓及糖病病史者,在服藥期間需注意監控血壓及血糖。 6.長期使用類固醇眼菓者,須定期測量眼壓. 以預防青光眼的發生