

一、何時放置暫時性雙腔靜脈導管 1.急性腎衰竭需緊急執行血液透析 2.慢性腎衰竭尚未建立動靜脈瘻管或瘻管未成熟 3.腹膜透析導管無法使用之病人 二、暫時性雙腔靜脈導管放置部位 醫師會依病人血管情況選擇頸部或大腿內側放置一根雙腔導管，作為暫時的血管通路，進行血液透析。三、頸部導管照護 1.穿寬鬆及前扣式上衣，避免套頭或高領衣服，以免拉扯導管造成鬆脫。 2.洗澡時，頭頸部採擦澡方式，胸部以下可用水沖洗；洗頭時採平躺方式，並以保鮮膜覆蓋導管處，避免弄濕口。 3.傷口會有紗布或透明敷料覆蓋，要隨時保持乾燥、清潔、避免潮濕，如果有出血或潮濕時，應立即更換敷料。 4.活動時以不拉扯導管部位處為主，頭頸部可左右上下轉動。四、大腿內側導管照護 1.洗澡時採擦澡方式，避免弄濕傷口上紗布或敷料，造成感染。 2.穿著寬鬆褲子，避免換衣服時拉扯到導管。 3.保持大腿內側的清涼，避免大、小便時弄濕或弄髒導管處傷口。 4.活動時可自然步伐行走；坐姿時大腿內側彎曲不可小於90度、不要超過30分鐘；臥床休息時腿部儘量保持平直，避免因彎曲造成導管扭曲。五、注意事項 避免傷口感染。 1.避免用手碰觸導管周圍皮膚，不可自行撕開紗布或敷料， 2.觀察導管出口周圍皮膚是否有發炎情形如：發紅、熱、痛、化膿或發燒(耳溫>37.5)情形，請立即就醫處理，勿自行擦藥。 3.觀察導管固定的長度，若與原來固定的長度不同時，可能是導管滑脫，應立刻用紙膠固定導管位置，避免拉出，並立即告知透析單位。 4.若導管不慎滑出，先用紗布壓迫傷口30分鐘，若以止血告知透析單位，將安排時間至急診重新放置導管；若無法止血，須立即就醫處理。