

一、目的

植入腹膜透析導管，藉由腹膜透析幫助身體除去過多的水分及尿毒素。

二、手術前照護

1. 手術前泌尿科醫師會進行術前評估及說明，並由麻醉科醫師進行手術前的評估及衛教。
2. 手術前一天需自行用**30mL Easy Antiseptic Liquid 2%**清潔腹部及肚臍周圍，行全身麻醉者於午夜**12**點開始禁食禁水，若為局部麻醉者則不需禁食禁水。
3. 手術過程採全身麻醉或局部麻醉，醫師會以腹腔鏡手術或傳統手術方式植入腹膜透析導管。
4. 手術當天護理師會為您注射點滴、更換手術衣、取下活動假牙及飾品。

三、手術後照護

1. 手術後返回病房後需禁食禁水**6**小時，腹部上存留一條腹膜透析導管。
2. 護理師會適當固定導管預防拉扯，並觀察傷口及導管出口處有無滲血或滲液情形，若有傷口疼痛或滲濕情形，請告知護理師處理或換藥。
3. 手術後隔天開始到腹膜透析室，由腹膜透析護理師進行透析訓練及傷口換藥，並由腹膜透析室護理師教導腹膜透析技術及導管注意事項。
4. 手術後避免增加腹壓的動作，如：咳嗽、腹部用力等。需保持排便順暢，必要時可以使用軟便劑。
5. 手術後**10~14**天傷口痊癒後可拆線。
6. 由腹膜透析護理師評估導管出口及傷口情形，若已完全癒合後即可開始淋浴，但不可泡澡，洗澡時需使用防護工具(如：防水透明敷料)。洗澡後導管出口處需立即換藥。

四、注意事項

1. 每日需洗澡，養成良好衛生習慣，可採淋浴或擦澡，切記不可泡澡。
2. 每日至少須做導管出口護理一次，尤其洗澡後或流汗多時，應執行更換敷料及檢查傷口。
3. 將腹膜透析導管固定，不可拉扯或扭轉。
4. 絕對不可以在導管附近使用剪刀或尖銳物品，如針、刀片等，以免劃破導管，導致細菌進入腹膜腔引起腹膜炎。
5. 不要在導管出口處繫腰帶、抓癢，或任意塗抹藥膏、痱子粉、乳液。