

腎結石可發生在任何年齡，但以**20~55歲**的成年人居多，男性多於女性。腎結石發生與環境、飲食和職業有關，且易反覆發作，早期沒有症狀易被忽略，常因有血尿、疼痛等症狀時才來求醫。

腎結石常見的症狀

腎結石最具代表性的症狀是陣發的、尖銳劇烈的疼痛，稱之為腎絞痛。腎絞痛起源於腰部深處，並輻射到四周。男性向下輻射至睪丸，女性則輻射至膀胱。疼痛劇烈、噁心、嘔吐、蒼白、冒汗、血尿、發冷、發熱、頻尿、腹脹不適等都是常見症狀。

腎結石的分類

最常見的是草酸鈣結石，約佔 **75 %**，大小通常小於二公分，呈黑色、灰色、白色的密集。

約有 **10 ~20 %**為磷酸性結石其形狀呈鹿角形，主要是因為細菌感染所引起的結石。

有**5%**為純粹尿酸性結石，為尿酸太高所致，外表為透明橘黃色的結晶。

腎臟檢查的介紹

尿液檢查:可檢查病人是否有血尿、蛋白尿、細菌感染、早期腎臟病、肝病、結石、腫瘤等疾病。

腎臟超音波檢查:對於腎臟的大小、形狀，是否水泡或腫瘤，及腎皮層好壞，是否有慢性腎炎、腎是否水腫，有相當好的診斷效果。

X光攝影:對一般腰酸背痛的检查為最快速有效的方法。

中醫方面

腎結石、輸尿管結石和膀胱結石，屬於我國醫學中的 <石淋>、<砂淋>的範圍，多因濕熱蘊結，脾腎虧虛，肝氣鬱滯所致。臨床症見腰痛、腎區痛、排尿突然中斷、尿閉、尿頻、尿急等。

保健方面

水份要足夠：如果身體沒有飲水的限制，每天宜喝 **2,000 ~ 3,000 C.C**，平均分配在一天中。天氣炎熱流汗較多時及發燒、腹瀉、運動後水份要多攝取。

平時不要憋尿。

飲料以開水最好，因為日常生活中大部分飲料(例如：濃茶、咖啡、可樂、巧克力)都含有草酸。

少吃過鹹食物。

勿食過多肉類和豆類食物。

少吃富含草酸的食物，例如：巧克力、核果、深綠色蔬菜、豆腐、茶和可樂等。