



	藥品
	<p>★維他命複合膠囊(<b>B.C Cap</b>):</p> <p>作用:透析時水溶性維生素如<b>B</b>群及<b>C</b>會流失, 所以必需額外補充。</p> <p>用法:一天一顆, 透析</p> <p>日須於透析後服用。</p>
	<p>★葉酸(<b>Folic acid</b>)5mg/tab:</p> <p>作用:幫助身體中蛋白質及氨基酸的利用, 是生成核酸相當重要的維生素, 另外, 在製造紅血球上, 也和維生素<b>B12</b>相輔相成。</p> <p>用法:一天一顆, 透析日須於透析後服用。</p>
	<p>★鈣片(<b>Canat</b>)500mg/tab:</p> <p>作用:結合食物中的磷, 減少腸胃道對磷的吸收。</p> <p>用法:空腹時服用可提高血鈣, 餐中服用可減少腸胃對磷的吸收。</p> <p>副作用:易有氣脹、便秘情形。</p> <p>注意事項:務必咬碎服用, 並依照醫師指示服用, 避免服用過量造成血管和組織鈣化。</p>

	<p>★胃乳片(Ulcerine-P)233mg/tab:</p> <p>作用:結合食物中的磷,減少腸胃道對磷的吸收,用於血鈣過高時的磷結合劑,並可預防副甲狀腺功能亢進引起的骨病變。</p> <p>用法:餐中服用。</p> <p>副作用:容易便秘,長期服用易有鋁中毒現象,需監測血中濃度。</p> <p>注意事項:務必咬碎服用,不要與運動飲料、果汁一起服用,以減少鋁的吸收。</p>
	<p>★活化維生素D3(Onealfa)1mcg/tab:</p> <p>作用:治療副甲狀腺功能亢進,避免產生腎性骨病變。</p> <p>注意事項:定期檢查血中鈣值及副甲狀腺素。</p>
	<p>★抗凝血劑(Heparin)5000u/ml:</p> <p>作用:血液透析中會使用肝素防止血液凝固。</p> <p>注意事項:平日須注意有無出血現象,如:解黑便、流鼻血、牙齦出血、結膜出血等,如有上述情形應先告知醫護人員。</p>
	<p>★紅血球生成素(NESP)20mcg/1ml:</p> <p>作用:刺激骨髓造血,改善貧血。</p>

	注意事項:少數會有高血壓情形。
	<p>★ 鐵劑(Fe-Back)20mg/5ml:</p> <p>作用:鐵是造血的原料之一,缺乏鐵時,須依病情補充鐵劑。</p> <p>用法:於透析中或透析後稀釋緩慢注射。</p> <p>注意事項:靜脈注射須注意是否有過敏情形。</p>

附註一:以上藥物請與醫師討論過後依需要選擇服用。

附註二:若自行有服用其他藥物或補品,請一定要帶來與醫師討論過後再決定繼續服用與否,免得未受其益先受其害。