

透析液種類

成分：葡萄糖

- 濃度：**1.5%**
- 字體顏色：黑色
- 停留4小時大約可脫出多少水：**100-300ml**
-
- 濃度：**2.5%**
- 字體顏色：藍色
- 停留4小時大約可脫出多少水：**300-500ml**
-
- 濃度：**4.25%**
- 字體顏色：紅色
- 停留4小時大約可脫出多少水：**500-800ml**
-

特殊藥水成分

特殊藥水成分(依健保規定使用)：玉米澱粉

- 濃度：**7.5%**
- 字體顏色：黑色(愛多尼爾)
- 使用注意事項：用於長時間留置(8-12小時)，可增加脫水量，部分病人有過敏反應。以血糖機測量手指血糖值時，必須使用葡萄糖氧化酶試紙。

特殊藥水成分(依健保規定使用)：胺基酸

- 濃度：**1.1%**
- 字體顏色：黑色(胺基酸)
- 使用注意事項：提供氨基酸，改善營養狀況，需於一天當中熱量攝取最高時段給予。

葡萄糖濃度越高脫水越多，但是也會增加葡萄糖吸收，造成血中三酸甘油脂增高。

水腫時應該先限制水份攝取，必要時再使用高濃度透析液。

太長時間留置會造成透析液倒吸導致脫水量變少，愛多尼爾除外。

天氣冷時透析液要如何保溫呢？

1. 請使用「乾熱法」—電毯或保溫櫃，來溫熱透析液。
2. 溫熱透析液時，不要將外包裝拆封，也不可置於熱水中溫熱。

透析液用量計算與保存

1. 回診前計算家中透析液剩餘量，並寫在聯絡本。
2. 當月透析液使用量，依照健保規定，以每月總天數計算。
3. 按時回診，看診後，透析液會依照「廠商通知行程」由廠商送達家中。
4. 請依照處方濃度、包數、帽蓋、配件逐一點收，如已簽收後才發現物品有誤，恕不補發，若送達時無人簽收，補送時需自付運費。
5. 透析液勿放置在太陽會直接照射、塵土飛揚或雨淋潮濕的地方。
6. 請先使用先送的透析液，並隨時注意透析液及帽蓋的有效期限。