水腫原因多,腎病症候群,細說從頭?

文章來源:(張宗興 醫師)

最近在門診時常看到許多臉部浮脹、手腳水腫的病人,這些病人在最初大都以為自己是「發福」了,直到後來小便漸漸減少了,手腳也出現水腫的現象,這才,開始到處求醫,但往往治療效果不佳,造成病人虛胖日增,困擾不已。水腫,俗稱「水氣」或「腳氣」,是一種相當常見的臨床症狀,但其原因卻相當複雜,若是不能找出正確的病因對症下藥,那麼水腫就難以消失。會造成水腫的原因主要有四種:

- (一)腎病症候群
- (二)心臟衰竭
- (三)肝硬化或肝衰竭
- (四)局部循環不良。

其中心臟和肝膽的問題通常都要找心臟科和肝膽科的專門醫師處理,而局部循環的問題題也 要找出血管或是淋巴管阻塞的位置予以去除,而最重要的腎病症候群就需要腎臟科的專門醫 師來診治了。所謂腎病症候群並不是單一的疾病,而是一群疾病擁有共通的一些臨床症狀, 它主要有四個特徵:

- (一)重度蛋白尿:每天尿蛋白超過3.5公克
- (二)低白蛋白血症
- (三)高脂血症
- (四)全身水腫。

其中尤以重度的蛋白尿為造成此一症候群的主要原因,由於血漿中的白蛋白是維持血管內體液容積的重要成分,因此一旦有大量的蛋白質在尿中流失,血中的白蛋白就會因身體來不及補充而形成低白蛋白血症,接著因血管內渗透壓不足,體液就會流往血管外的組織間隙,而形成我們所見到的水腫現象,一開始水腫往往出現在承受體重或皮下組織鬆軟的位置,如腳部或眼皮等,但病況嚴重時全身都會出現水腫;另外因為肝臟要努力合成白蛋白以補充尿中損失的蛋白,在這同時也會產生大量的脂肪,因而造成高脂血症。蛋白尿主要是因為腎臟受到損傷所造成,而腎臟受損的原因大致可分為兩類:

第一類是原發性的腎疾,如各種腎小球炎等

第二類則是因其他疾病而造成的腎臟損傷,如感染、各種腫瘤、糖尿病、高血壓、藥物中毒、血管炎、膠原病、遺傳性疾病,甚至妊娠毒血症都可以造成蛋白尿。在這許多原因中,若以年紀來區分,15歲以下以微小變化腎病變最多;15~40歲則以局部腎小球硬化、微小變化腎病變、膜性腎病變、全身性紅斑狼瘡,妊娠毒血症最為常見;至於40歲以上則以膜性腎病

變、糖尿病及良性腎硬化最多,由於腎病症候群的發生是不分年齡和性別的,而其診斷又相 當複雜,因此病人不應諱疾忌醫,一有症狀即應赴醫院做詳細檢查,以便找出病因,早日治 療。