# 一、目的

永久性雙腔靜脈導管為永久性洗腎通路(也適於特殊情境的靜脈給藥、抽血、輸液), 當病人不需洗腎或其他治療因素時, 將由心臟外科醫師進行移除。

#### 二、作法

- 1. 手術在心導管室進行, 在局部麻醉下由心臟血管外科醫師植入導管, 並經由精密放射導引確認導管放置部位, 由頭靜脈鎖骨下靜脈(圖一)或頸靜脈(圖二)導入右心房。
- 2. 植入後當天會照一張胸部X光片以確定靜脈導管是否在正常位置,並排除血胸、氣胸的發生。

# 三、靜脈導管處理及照顧注意事項

手術後有兩處傷口,靠近鎖骨上方傷口必須每天消毒及更換敷料,約14-21天拆線。靠近導管置入處傷口,則由洗腎室護理師觀察導管傷口,協助換藥。

先用肥皂及清水徹底洗淨雙手, 採擦澡方式清潔身體, 若不慎沾溼需立刻擦乾, 再以優碘及生理食鹽水消毒傷口, 確認乾燥後覆蓋敷料。

每天檢查導管出口有無腫脹、發紅、滲出物或壓痛,若有以上情形請立刻來看門診,切勿自行處理。

為了導管安全, 任何尖銳物品, 如:剪刀、安全別針不可靠近導管。

洗腎室護理師會用紗布包覆導管尾端並用膠布固定於皮膚上, 切勿拉扯晃動、扭轉或加壓於導管上。

導管若有破裂會有滲出物流出,以紗布壓住導管入口,以防流血,並立刻來醫院處理。

若不小心導管脫落, 請立刻以手壓住導管入口, 以防流血, 並立刻來醫院處理。

如有呼吸短促、胸痛、咳嗽、發燒、寒顫等情形, 請立刻來院就醫。

#### 四、移除導管後注意事項

預備移除導管時,醫師會先暫用抗凝血用藥,由醫師進行導管移除,傷口會由醫師先徒手加壓十五分鐘。

每2小時護理師會再次檢視傷口是否有出血情形,移除導管後需平躺2小時,避免劇烈運動,當日儘量臥床休息。

止血的紗布需置放至隔日,經護理師評估後移除或更給予傷口護理。

移除導管後24小時內不可下床洗澡(可擦澡), 3日內勿搬重物或提重物。

若移除管路傷口有滲血或出血、局部發生紅腫、肢體末稍麻木冰冷或異常疼痛感, 需立即通知護理師處理。

### 五、結論

永久性雙腔導管提供血液透析及輸血、抽血治療等, 管路置放期間需配合預防感染、阻塞、滑脫等注意事項, 並於移除後需配合平躺避免出血等症狀, 當管路移除傷口於返家後出現紅、腫、熱、痛、化膿性分泌物時, 需儘速就醫。