

Tests	Methods	Specimen	Operating schedule	Submission hours	TAT	Price (baht)	Storage*	Reference Value	หมายเหตุ
ห้องปฏิบัติการพยาธิคลินิก (Clinical Pathology Laboratory)									
Hematology (CBC)									
CBC (5-Part diff.)	FFC/CPH/SLS/Hydro-dynamic focusing	EDTA blood 1ml	ทุกวัน	7.30-20.15	1-2 ชั่วโมง	150	2-8°C	To be noted in the report	
CBC (5-Part diff.) + Reti	FFC/CPH/SLS/Hydro-dynamic focusing	EDTA blood 1ml	ทุกวัน	7.30-20.15	1-2 ชั่วโมง	200	2-8°C	To be noted in the report	
CBC (5-Part diff.) + Plt-F	FFC/CPH/SLS/Hydro-dynamic focusing	EDTA blood 1ml	ทุกวัน	7.30-20.15	1-2 ชั่วโมง	200	2-8°C	To be noted in the report	
CBC (5-Part diff.) + Reti + Plt-F	FFC/CPH/SLS/Hydro-dynamic focusing	EDTA blood 1ml	ทุกวัน	7.30-20.15	1-2 ชั่วโมง	250	2-8°C	To be noted in the report	
Blood parasite (Blood smear)	Microscopic	EDTA blood 1ml	ทุกวัน	7.30-20.15	1-2 ชั่วโมง	50	2-8°C	Negative	
PCV (วิธีการปั่น)	Centrifuge	EDTA blood 1ml	ทุกวัน	7.30-20.15	1-2 ชั่วโมง	30	2-8°C	To be noted in the report	
Reticulocyte count (NMB staining)	Microscopic	EDTA blood 1ml	ทุกวัน	7.30-20.15	1-2 ชั่วโมง	50	2-8°C	To be noted in the report	
Platelets count (Blood smear)	Microscopic	EDTA blood 1ml	ทุกวัน	7.30-20.15	1-2 ชั่วโมง	100	2-8°C	To be noted in the report	
Auto Agglutination	Microscopic	EDTA blood 1ml	ทุกวัน	7.30-20.15	1-2 ชั่วโมง	50	2-8°C	Negative	
Blood chemistry									
Urea nitrogen (BUN)	Enzyme Kinetic	Serum/ Li Heparin plasma 1-2 ml	ทุกวัน	7.30-20.15	1-2 ชั่วโมง	50	2-8°C	Dog: 8-28 mg/dL Cat: 19-34 mg/dL	
Creatinine	Jaffe Kinetic	Serum/ Li Heparin plasma 1-2 ml	ทุกวัน	7.30-20.15	1-2 ชั่วโมง	50	2-8°C	Dog: 0.5-1.7mg/dL Cat: 0.9-2.2 mg/dL	
Amylase	CNPG3	Serum/ Li Heparin plasma 1-2 ml	ทุกวัน	7.30-20.15	1-2 ชั่วโมง	100	2-8°C	Dog: 226-1063 U/L Cat: 550-1458 U/L	
Alanine Transferase (ALT)/SGPT	Kinetic 37°C /Kinetic without pyridoxal	Serum/ Li Heparin plasma 1-2 ml	ทุกวัน	7.30-20.15	1-2 ชั่วโมง	50	2-8°C	Dog: 10-109 U/L Cat: 25-97 U/L	
Aspartate Transferase (AST)/SGOT	Kinetic 37°C /Kinetic without pyridoxal	Serum/ Li Heparin plasma 1-2 ml	ทุกวัน	7.30-20.15	1-2 ชั่วโมง	50	2-8°C	Dog: 13-15 U/L Cat: 7-38 U/L	
Alkaline Phosphatase (ALP, ALK)	PNP AMP buff; IFCC	Serum/ Li Heparin plasma 1-2 ml	ทุกวัน	7.30-20.15	1-2 ชั่วโมง	50	2-8°C	Dog: 1-114 U/L Cat: 0-45 U/L	
Creatinine Phosphokinase (CPK)	Colori-metric	Serum 1-2 ml.	ทุกวัน	7.30-20.15	1-2 ชั่วโมง	200	2-8°C	Dog: 52-368 U/L Cat: 69-214 U/L	
Bilirubin (Total)	Jendrassik-Grof	Serum/ Li Heparin plasma 1-2 ml	ทุกวัน	7.30-20.15	1-2 ชั่วโมง	50	2-8°C	Dog: 0-0.3 mg/dL Cat: 0-0.1 mg/dL	
Bilirubin (Direct)	Jendrassik-Grof	Serum/ Li Heparin plasma 1-2 ml	ทุกวัน	7.30-20.15	1-2 ชั่วโมง	50	2-8°C	Dog: 0-0.1 mg/dL Cat: 0 mg/dL	
Cholesterol	Enzyme Colori-metric	Serum/ Li Heparin plasma 1-2 ml	ทุกวัน	7.30-20.15	1-2 ชั่วโมง	50	2-8°C	Dog: 135-278 mg/dL Cat: 71-156 mg/dL	

หมายเหตุ Storage* คือ อุณหภูมิสำหรับการเก็บตัวอย่างก่อนส่งตรวจ ในกรณีที่ไม่สามารถส่งตรวจได้ในทันที

Tests	Methods	Specimen	Operating schedule	Submission hours	TAT	Price (baht)	Storage*	Reference Value	หมายเหตุ
Triglyceride	Enz. Color Total TG	Serum/ Li Heparin plasma 1-2 ml	ทุกวัน	7.30-20.15	1-2 ชั่วโมง	100	2-8°C	Dog: 40-169 mg/dL Cat: 27-94 mg/dL	
Total Protein	Biuret-Blank	Serum/ Li Heparin plasma 1-2 ml	ทุกวัน	7.30-20.15	1-2 ชั่วโมง	50	2-8°C	Dog: 5.4-7.5 g/dL Cat: 6-7.9 g/dL	
Albumin	BCG	Serum/ Li Heparin plasma 1-2 ml	ทุกวัน	7.30-20.15	1-2 ชั่วโมง	50	2-8°C	Dog: 2.3-3.1 g/dL Cat: 2.8-3.9 g/dL	
Uric Acid	Uricase/Peroxidase (POD)	Serum/ Li Heparin plasma 1-2 ml	ทุกวัน	7.30-20.15	1-2 ชั่วโมง	50	2-8°C	Dog: 0.1-0.4 mg/dL Cat: 0-0.3 mg/dL	
Calcium	CPC / Arsenazo	Serum/ Li Heparin plasma 1-2 ml	ทุกวัน	7.30-20.15	1-2 ชั่วโมง	80	2-8°C	Dog: 9.1-11.7 mg/dL Cat: 8.7-11.7 mg/dL	
Phosphorus	Molybdenum UV	Serum/ Li Heparin plasma 1-2 ml	ทุกวัน	7.30-20.15	1-2 ชั่วโมง	80	2-8°C	Dog: 2.9-5.3 mg/dL Cat: 3-6.1 mg/dL	
GGT	Szazs / Persijn	Serum 1-2 ml	ทุกวัน	7.30-20.15	1-2 ชั่วโมง	150	2-8°C	0-15 U/L	
Urine creatinine	Jaffe Kinetic	Urine 5 ml	ทุกวัน	7.30-20.15	1-2 ชั่วโมง	50	2-8°C		
Urine protein (CSF)	Pyrogallol Red-Molybdate	Urine 5 ml	ทุกวัน	7.30-20.15	1-2 ชั่วโมง	100	2-8°C		
Urine protein/creatinine ratio (UPCR)		Urine 5 ml	ทุกวัน	7.30-20.15	1-2 ชั่วโมง	150	2-8°C	Dog: < 0.5 Cat: < 0.5	
Potassium	Indirect ISE	Serum/ Li Heparin plasma 1-2 ml	ทุกวัน	7.30-20.15	1-2 ชั่วโมง	120	2-8°C	Dog: 3.9-5.1 mmol/L Cat: 3.7-6.1 mmol/L	
Electrolyte (K+, Cl-, Na+)	Indirect ISE	Serum/ Li Heparin plasma 1-2 ml	ทุกวัน	7.30-20.15	1-2 ชั่วโมง	200	2-8°C	Dog Na: 142-152 mmol/L Cl: 110-124 mmol/L K: 3.9-5.1 mmol/L Cat Na: 146-156 mmol/L Cl: 115-130 mmol/L K: 3.7-6.1 mmol	
Urinalysis									
ตรวจปัสสาวะ	Reflectance photometer	Urine 5 ml	ทุกวัน	7.30-20.15	1-2 ชั่วโมง	100	2-8°C	To be noted in the report	
ตรวจหาตะกอนปัสสาวะ	Microscopic	Urine sediment	ทุกวัน	7.30-20.15	1 วัน		2-8°C	To be noted in the report	
IDEXX: Catalyst									
Single slide									
Ammonia (NH3)	IDEXX Dry Slide Tech.	Li Heparin plasma 1-2 ml	ทุกวัน	7.30-20.15	1-2 ชั่วโมง	330	-20°C	Dog: 0-98 umol/L Cat: 0-95 umol/L	
Phenobarbital	IDEXX Dry Slide Tech.	Serum 1-2 ml	ทุกวัน	7.30-20.15	1-2 ชั่วโมง	550	-20°C	Subtherapeutic < 15 ug/mL Therapeutic 15-45 ug/mL Ideal 20-30 ug/mL Possibly Toxic > 30 ug/mL	

หมายเหตุ Storage* คือ อุณหภูมิสำหรับการเก็บตัวอย่างก่อนส่งตรวจ ในกรณีที่ไม่สามารถส่งตรวจได้ในทันที

Tests	Methods	Specimen	Operating schedule	Submission hours	TAT	Price (baht)	Storage*	Reference Value	หมายเหตุ
SDMA	IDEXX Dry Slide Tech.	Fresh serum 1-2 ml	ทุกวัน	7.30-20.15	1-2 ชั่วโมง	600	2-8°C	0-14 ug/dL	
C-reactive protein	IDEXX Dry Slide Tech.	Serum 1-2 ml	ทุกวัน	7.30-20.15	1-2 ชั่วโมง	700	2-8°C	0.0-1.0 mg/dL	
Total T4	IDEXX Dry Slide Tech.	Serum 1-2 ml	ทุกวัน	7.30-20.15	1-2 ชั่วโมง	800	2-8°C	0.8-4.7 ug/dL <0.8 ug/dL Subnormal 0.8-4.7 ug/dL Normal 2.3-4.7 ug/dL Grey Zone in old or symptomatic cats >4.7 ug/dL Consistent with hyperthyroidism	
Bile Acid	Dry Slide	Serum/ Li Heparin plasma 1-2 ml	ทุกวัน	7.30-20.15	1-2 ชั่วโมง	850	2-8°C	Preprandial = 0-14.9 umol/L Postprandial = 0-29.9 umol/L	
Panel Slide									
CATALYST NSAID 6: NSAID therapy (ALKP, ALT, AST, BUN, CREA, BUN/CREA)	IDEXX Dry Slide Tech.	Serum 1-2 ml	ทุกวัน	7.30-20.15	1-2 ชั่วโมง	500	-20°C	BUN = 7-27 mg/dL CREA = 0.5-1.8 mg/dL ALT = 10-125 U/L AST = 0-50 U/L ALKP = 23-212 U/L	
CATALYST CHEM 10: safer anesthesia (ALB, ALKP, ALT, BUN, CREA, GLU, TP, ALB/GLOB, BUN/CREA, GLOB)	IDEXX Dry Slide Tech.	Serum 1-2 ml	ทุกวัน	7.30-20.15	1-2 ชั่วโมง	700	-20°C	GLU = 70-143 mg/dL BUN = 7-27 mg/dL CREA = 0.5-1.8 mg/dL ALT = 10-125 U/L ALKP = 23-212 U/L TP = 5.2-8.2 g/dL ALB = 2.2-3.9 g/dL GLOB = 2.5-4.5 g/dL	
IDEXX: SNAP-PRO									
4DX	Snap Rapid Assay Test ELISA Tech.	Whole blood, serum or plasma	ทุกวัน	7.30-20.15	1-2 ชั่วโมง	550	2-8°C	Negative	
FELINE TRIPLE	Snap Rapid Assay Test ELISA Tech.	Whole blood, serum or plasma	ทุกวัน	7.30-20.15	1-2 ชั่วโมง	650	2-8°C	Negative	
cPL	Snap Rapid Assay Test ELISA Tech.	Serum 1-2 ml	ทุกวัน	7.30-20.15	1-2 ชั่วโมง	750	-20°C	Normal	
fPL	Snap Rapid Assay Test ELISA Tech.	Serum 1-2 ml	ทุกวัน	7.30-20.15	1-2 ชั่วโมง	750	-20°C	Normal	
FELINE PROBNP	Snap Rapid Assay Test ELISA Tech.	Serum or EDTA plasma 1-2 ml	ทุกวัน	7.30-20.15	1-2 ชั่วโมง	850	-20°C	Normal	
IDEXX: Procyte									
CBC + Differential WBC + Reticulocytes	Laser flow cytometry, Optical fluorescence and Laminar flow impedance as well as the SLS-hemoglobin method	EDTA blood 1-2ml	ทุกวัน	7.30-20.15	1-2 ชั่วโมง	380	2-8°C	To be noted in the report	

หมายเหตุ Storage* คือ อุณหภูมิสำหรับการเก็บตัวอย่างก่อนส่งตรวจ ในกรณีที่ไม่สามารถส่งตรวจได้ในทันที

Tests	Methods	Specimen	Operating schedule	Submission hours	TAT	Price (baht)	Storage*	Reference Value	หมายเหตุ
Blood gas									
Blood gas analysis	Direct ISE	Lithium Heparin blood 1-2 ml	ทุกวัน	24 ชั่วโมง	1-2 ชั่วโมง	320	2-8°C	To be noted in the report	
Vet scan VS2 for exotic									
Prep Profile II	Spectrophotometry	Lithium Heparin blood 1-2 ml	ทุกวัน	7.30-20.15	1-2 ชั่วโมง	500	2-8°C	To be noted in the report	
Avian Reptilian Profile plus	Spectrophotometry	Lithium Heparin blood 1-2 ml	ทุกวัน	7.30-20.15	1-2 ชั่วโมง	1000	2-8°C	To be noted in the report	
Vcheck									
cPL 2.0	Immunoassay	Serum 1-2 ml	ทุกวัน	7.30-20.15	1-2 ชั่วโมง	500	2-8°C	<200 ng/ml: Normal 200-400 ng/ml: Suspected >400 ng/ml: Abnormal	
fPL 2.0	Immunoassay	Serum 1-2 ml	ทุกวัน	7.30-20.15	1-2 ชั่วโมง	500	2-8°C	≤3.5 ng/ml: Normal 3.6-5.3 ng/ml: Suspected ≥5.4 ng/ml: Abnormal	
Feline Troponin I	Immunoassay	Serum 1-2 ml	ทุกวัน	7.30-20.15	1-2 ชั่วโมง	600	2-8°C	<0.18 ng/ml: Normal 0.18-0.28 ng/ml: Suspected >0.28 ng/ml: Abnormal	
Canine Troponin I	Immunoassay	Serum 1-2 ml	ทุกวัน	7.30-20.15	1-2 ชั่วโมง	600	2-8°C	<0.1 ng/ml: Normal 0.1-0.2 ng/ml: Suspected >0.2 ng/ml: Abnormal	
Feline ProBNP	Immunoassay	Serum 1-2 ml	ทุกวัน	7.30-20.15	1-2 ชั่วโมง	600	2-8°C	<100 pmol/L: Normal ≥100 pmol/L: Abnormal	
Canine ProBNP	Immunoassay	Serum 1-2 ml	ทุกวัน	7.30-20.15	1-2 ชั่วโมง	600	2-8°C	<900 pmol/L: Normal 900-1800 pmol/L: Suspected >1800 pmol/L: Abnormal	
cCortisol	Immunoassay	Serum 1-2 ml	ทุกวัน	7.30-20.15	1-2 ชั่วโมง	500	2-8°C	ACTH-ST, LDDST, or HDDST refer to insert	
FUJI DRI-CHEM: Immuno AU10V									
c-Cortisol (v-COR)	Immunoassay	Serum 1-2 ml	ทุกวัน	ทุกวัน 7.30-20.15	1 ชั่วโมง	900	2-8°C	1.0-30.0 ug/dL	
** กรณีต้องการผลการตรวจวิเคราะห์ด่วนภายใน 1 ชั่วโมง: ช่องทางพิเศษ (Fast Track) คิดค่าบริการเพิ่มเติม 500 บาทต่อตัวอย่าง **									
Hormone (Immulite 1000)									
Canine TLI	Immunoassay	Serum 1-2 ml	อ, พ, อาทิตย์ 10.00-15.00	ทุกวัน 7.30-20.15	3-5 วัน	800	-20°C	5.4-32 ng/mL	
Canine T4	Immunoassay	Serum 1-2 ml	อ, พ, อาทิตย์ 10.00-15.00	ทุกวัน 7.30-20.15	3-5 วัน	500	-20°C	1.3-2.9 ug/dL	
Canine TSH	Immunoassay	Serum 1-2 ml	อ, พ, อาทิตย์ 10.00-15.00	ทุกวัน 7.30-20.15	3-5 วัน	650	-20°C	0-0.5 ng/mL	
Phenobarbital	Immunoassay	Serum 1-2 ml	อ, พ, อาทิตย์ 10.00-15.00	ทุกวัน 7.30-20.15	3-5 วัน	500	-20°C	15-40 ug/mL	
Cortisol	Immunoassay	Serum 1-2 ml	อ, พ, อาทิตย์ 10.00-15.00	ทุกวัน 7.30-20.15	3-5 วัน	400	-20°C	5-25 ug/dL	
T4	Immunoassay	Serum 1-2 ml	อ, พ, อาทิตย์ 10.00-15.00	ทุกวัน 7.30-20.15	3-5 วัน	250	-20°C	5.2-12.5 ug/dL	

หมายเหตุ Storage* คือ อุณหภูมิสำหรับการเก็บตัวอย่างก่อนส่งตรวจ ในกรณีที่ไม่สามารถส่งตรวจได้ในทันที

Tests	Methods	Specimen	Operating schedule	Submission hours	TAT	Price (baht)	Storage*	Reference Value	หมายเหตุ
Urine cortisol/ Urine creatinine ratio (UCCR)	Immunoassay	Urine 1-2 ml	อ, พญ., อาทิตย. 10.00-15.00	ทุกวัน 7.30-20.15	3-5 วัน	450	-20°C	< 10x10 ⁻⁶	
เซลล์วิทยาวิวินิจฉัย (Cytology)									
คำตรวจวินิจฉัยเซลล์วิทยา	Microscopic	Slide	ทุกวัน	8.30-20.15	5-7 วัน	300	Room temp	To be noted in the report	
การตรวจน้ำไขสันหลัง (CSF)	Microscopic	น้ำไขสันหลัง 0.25-1 ml Sterile tube	ทุกวัน	8.30-20.15	5-7 วัน	500	2-8°C	To be noted in the report	
การตรวจของเหลวในช่องอก-ช่องท้อง แมว	Microscopic	ของเหลว 0.25-1 ml ใส่หลอด EDTA และหลอดซีรัม (SST)	ทุกวัน	8.30-20.15	5-7 วัน	500	2-8°C	To be noted in the report	
การตรวจของเหลวในช่องอก-ช่องท้อง สุนัข	Microscopic	ของเหลว 0.25-1 ml ใส่หลอด EDTA	ทุกวัน	8.30-20.15	5-7 วัน	500	2-8°C	To be noted in the report	
ปัสสาวะ (น้ำล้างท่อปัสสาวะ)	Microscopic	ปัสสาวะหรือน้ำล้างท่อปัสสาวะ 0.25-1 ml	ทุกวัน	8.30-20.15	5-7 วัน	300	2-8°C	To be noted in the report	
Prostatic fluid	Microscopic	Prostatic fluid	ทุกวัน	8.30-20.15	5-7 วัน	300	2-8°C	To be noted in the report	
Broncho-alveolar lavage	Microscopic	น้ำล้างช่องอก 0.25-1 ml	ทุกวัน	8.30-20.15	5-7 วัน	300	2-8°C	To be noted in the report	
Semen	Microscopic	Semen	ทุกวัน	8.30-20.15	5-7 วัน	300	2-8°C	To be noted in the report	
Synovial fluid	Microscopic	น้ำไขข้อ 0.25-1 ml	ทุกวัน	8.30-20.15	5-7 วัน	500	2-8°C	To be noted in the report	
ห้องปฏิบัติการจุลชีววินิจฉัย (Microbiology Laboratory)									
เชื้อแบคทีเรีย									
ตรวจหาเชื้อแบคทีเรียด้วยกล้องจุลทรรศน์ด้วยวิธี Gram stain, Modified acid-fast stain, หรือ Dark field (Spirochrome)	Microscopic	ตัวอย่างในภาชนะปลอดเชื้อหรือสไลด์ตัวอย่าง	จ-พญ 8.30-20.30 ศ-อาทิตย 8.30 -16.30	ทุกวัน 7.30-20.15	1 วัน	100	ตามตารางที่ 1**	No organism	
เพาะหาเชื้อแบคทีเรียทั่วไป (Aerobic culture)	Culture	ตัวอย่างในภาชนะปลอดเชื้อหรือในหลอดน้ำส่ง	จ-พญ 8.30-20.30 ศ-อาทิตย 8.30 -16.30	ทุกวัน 7.30-20.15	3-5 วัน	350	ตามตารางที่ 1**	No growth	
เพาะหาเชื้อแบคทีเรียทั่วไป และทดสอบความไวต่อยาต้านจุลชีพ (Aerobic culture and sensitivity test)	Culture	ตัวอย่างในภาชนะปลอดเชื้อหรือในหลอดน้ำส่ง	จ-พญ 8.30-20.30 ศ-อาทิตย 8.30 -16.30	ทุกวัน 7.30-20.15	3-5 วัน	550	ตามตารางที่ 1**	No growth	
เพาะหาเชื้อแบคทีเรียแบบไร้ออกซิเจน และทดสอบความไวต่อยาต้านจุลชีพ (Anaerobic culture and sensitivity test)	Culture	ตัวอย่างในภาชนะปลอดเชื้อแบบไร้ออกซิเจน	จ-พญ 8.30-20.30 ศ-อาทิตย 8.30 -16.30	ทุกวัน 7.30-20.15	7-14 วัน	750	ตามตารางที่ 1**	No growth	
ตรวจหาความเข้มข้นสูงสุดของยา (MIC)	Culture	ตัวอย่างในภาชนะปลอดเชื้อหรือในหลอดน้ำส่ง	จ-พญ 8.30-20.30 ศ-อาทิตย 8.30 -16.30	ทุกวัน 7.30-20.15	5-7 วัน	1100	ตามตารางที่ 1**	To be noted in the report	

หมายเหตุ Storage* คือ อุณหภูมิสำหรับการเก็บตัวอย่างก่อนส่งตรวจ ในกรณีที่ไม่สามารถส่งตรวจได้ในทันที

ตามตารางที่ 1** คือ การนำส่งและการเก็บรักษาในกรณีไม่ได้นำส่งในเวลาที่กำหนดของสิ่งส่งตรวจเพื่อวินิจฉัยโรคติดเชื้อสำหรับห้องปฏิบัติการจุลชีววินิจฉัย

Tests	Methods	Specimen	Operating schedule	Submission hours	TAT	Price (baht)	Storage*	Reference Value	หมายเหตุ
หาปริมาณเชื้อแบคทีเรีย (CFU/ml)	Culture	ตัวอย่างในภาชนะ ปลอดเชื้อ (ตัวอย่างของเหลว ≥ 1 ml)	จ-พ 8.30-20.30 ศ-อาทิตย์ 8.30 -16.30	ทุกวัน 7.30-20.15	3-5 วัน	350	ตามตาราง ที่ 1**	No growth	
เชื้อรา									
ตรวจหาเชื้อราด้วยกล้องจุลทรรศน์ ด้วยวิธี Gram stain, India ink preparation, หรือ KOH preparation	Microscopic	ตัวอย่างในภาชนะ ปลอดเชื้อหรือใน หลอดน้ำส่ง	จ-พ 8.30-20.30 ศ-อาทิตย์ 8.30 -16.30	ทุกวัน 7.30-20.15	1 วัน	100	ตามตาราง ที่ 1**	No organism	
เพาะหาเชื้อยีสต์	Culture	ตัวอย่างในภาชนะ ปลอดเชื้อหรือใน หลอดน้ำส่ง	จ-พ 8.30-20.30 ศ-อาทิตย์ 8.30 -16.30	ทุกวัน 7.30-20.15	4-7 วัน	350	ตามตาราง ที่ 1**	No growth	
เพาะหาเชื้อรา กลุ่มเดอร์มาโตไฟท์ (Dermatophytes)	Culture	ตัวอย่างในภาชนะ ปลอดเชื้อ	จ-พ 8.30-20.30 ศ-อาทิตย์ 8.30 -16.30	ทุกวัน 7.30-20.15	1-2 สัปดาห์	350	ตามตาราง ที่ 1**	No growth	
เพาะหาเชื้อราอื่นๆ (Systemic fungi)	Culture	ตัวอย่างในภาชนะ ปลอดเชื้อ	จ-พ 8.30-20.30 ศ-อาทิตย์ 8.30 -16.30	ทุกวัน 7.30-20.15	1-6 สัปดาห์	350	ตามตาราง ที่ 1**	No growth	ระยะเวลา ขึ้นอยู่กับชนิด ของเชื้อรา
ห้องปฏิบัติการอณูวินิจฉัย (Molecular Laboratory)									
Canine distemper virus	RT-PCR	EDTA Blood 0.5 ml Nasal swab 1-2 swab	จ-ศ 8.30-16.30 อ, พ, อาทิตย์ 8.30-20.30	ทุกวัน 7.30-20.15	3-5 วัน	800	-20°C	Negative	
Canine parvovirus	PCR	Feces swab 1-2 swab	จ-ศ 8.30-16.30 อ, พ, อาทิตย์ 8.30-20.30	ทุกวัน 7.30-20.15	3-5 วัน	700	-20°C	Negative	
Canine adenovirus type I and II	PCR	EDTA Blood 0.5 ml	จ-ศ 8.30-16.30 อ, พ, อาทิตย์ 8.30-20.30	ทุกวัน 7.30-20.15	3-5 วัน	700	-20°C	Negative	
Feline infectious peritonitis virus	RT-PCR	Peritoneal eff. 0.5 ml Plural eff. 0.5 ml	จ-ศ 8.30-16.30 อ, พ, อาทิตย์ 8.30-20.30	ทุกวัน 7.30-20.15	3-5 วัน	800	-20°C	Negative	
Feline panleukopenia virus (feline parvovirus)	PCR	Feces 1-2 swab or EDTA Blood 0.5 ml	จ-ศ 8.30-16.30 อ, พ, อาทิตย์ 8.30-20.30	ทุกวัน 7.30-20.15	3-5 วัน	700	-20°C	Negative	

หมายเหตุ Storage* คือ อุณหภูมิสำหรับการเก็บตัวอย่างก่อนส่งตรวจ ในกรณีที่สามารถส่งตรวจได้ในทันที

ตามตารางที่ 1** คือ การนำส่งและการเก็บรักษาในกรณีไม่ได้นำส่งในเวลาที่กำหนดของสิ่งส่งตรวจเพื่อวินิจฉัยโรคติดเชื้อสำหรับห้องปฏิบัติการจุลชีววินิจฉัย

Tests	Methods	Specimen	Operating schedule	Submission hours	TAT	Price (baht)	Storage*	Reference Value	หมายเหตุ
Feline herpes virus	PCR	Conjunctival swab 1-2 swab Nasal swab 1-2 swab	จ-ศ 8.30-16.30 อ, พ, อาทิตย์ 8.30-20.30	ทุกวัน 7.30-20.15	3-5 วัน	700	-20°C	Negative	
Chlamydia psittaci in cat	PCR	Conjunctival swab 1-2 swab Nasal swab 1-2 swab	จ-ศ 8.30-16.30 อ, พ, อาทิตย์ 8.30-20.30	ทุกวัน 7.30-20.15	3-5 วัน	700	-20°C	Negative	
Feline leukemia virus	PCR	EDTA Blood 0.5 ml	จ-ศ 8.30-16.30 อ, พ, อาทิตย์ 8.30-20.30	ทุกวัน 7.30-20.15	3-5 วัน	700	-20°C	Negative	
Babesia spp	PCR	EDTA Blood 0.5 ml	จ-ศ 8.30-16.30 อ, พ, อาทิตย์ 8.30-20.30	ทุกวัน 7.30-20.15	3-5 วัน	700	-20°C	Negative	
Bird sexing	PCR	EDTA Blood 0.1 ml หรือขนนก 2-3 ขน	จ-ศ 8.30-16.30 อ, พ, อาทิตย์ 8.30-20.30	ทุกวัน 7.30-20.15	3-5 วัน	800	-20°C	Female male	
Psittacine Beak and Feather disease syndrome virus (PBFDV)	PCR	EDTA Blood 0.1 ml หรือขนนก 2-3 ขน	จ-ศ 8.30-16.30 อ, พ, อาทิตย์ 8.30-20.30	ทุกวัน 7.30-20.15	3-5 วัน	700	-20°C	Negative	
Chlamydia psittaci in birds	PCR	Feces swab 1-2 swab	จ-ศ 8.30-16.30 อ, พ, อาทิตย์ 8.30-20.30	ทุกวัน 7.30-20.15	3-5 วัน	700	-20°C	Negative	
Feline immunodeficiency virus	PCR	EDTA Blood 0.5 ml	จ-ศ 8.30-16.30 อ, พ, อาทิตย์ 8.30-20.30	ทุกวัน 7.30-20.15	3-5 วัน	700	-20°C	Negative	
Transmissible venereal tumor	PCR	Mass swab 1-2 swab	จ-ศ 8.30-16.30 อ, พ, อาทิตย์ 8.30-20.30	ทุกวัน 7.30-20.15	3-5 วัน	700	-20°C	Negative	
งานตรวจหาเชื้อชนิดติเอ็นเอ อื่นๆ	PCR		จ-ศ 8.30-16.30 อ, พ, อาทิตย์ 8.30-20.30	ทุกวัน 7.30-20.15	3-5 วัน	700	-20°C	To be noted in the report	

หมายเหตุ Storage* คือ อุณหภูมิสำหรับการเก็บตัวอย่างก่อนส่งตรวจ ในกรณีที่ไม่สามารถส่งตรวจได้ในทันที

ประเภทของสิ่งส่งตรวจและอัตราค่าบริการ (Specimens and Pricelists)

Tests	Methods	Specimen	Operating schedule	Submission hours	TAT	Price (baht)	Storage*	Reference Value	หมายเหตุ
งานตรวจหาเชื้อ ชนิดอาร์เอ็นเอ อื่นๆ	RT-PCR		จ-ศ 8.30-16.30 อ, พ, อาทิตย์ 8.30-20.30	ทุกวัน 7.30-20.15	3-5 วัน	800	-20°C	To be noted in the report	
ห้องปฏิบัติการจุลพยาธิวิทยา (Histopathology Laboratory)									
คำเตรียมสไลด์ H&E (ไม่อ่านผล)	H&E	ชิ้นเนื้อหนา 1-2 ซม. แช่น้ำยา 10% neutral buffered formalin	ทุกวัน 8.30-16.30 อังคาร 8.30-20.30	ทุกวัน 8.30-16.30	10-14 วันทำการ	500 บาท / สไลด์	Room temp	To be noted in the report	
คำเตรียมสไลด์และตรวจวินิจฉัย ตัวอย่างชิ้นเนื้อ (Biopsy) วินิจฉัยทางจุลพยาธิวิทยา	H&E	ชิ้นเนื้อหนา 1-2 ซม. แช่น้ำยา 10% neutral buffered formalin	ทุกวัน 8.30-16.30 อังคาร 8.30-20.30	ทุกวัน 8.30-16.30	10-14 วันทำการ	700 บาท / ตัวอย่าง	Room temp	To be noted in the report	
คำเตรียมสไลด์ H&E สำหรับงานวิจัย (ไม่อ่านผล)	H&E	ชิ้นเนื้อหนา 1-2 ซม. แช่น้ำยา 10% neutral buffered formalin	ทุกวัน 8.30-16.30 อังคาร 8.30-20.30	ทุกวัน 8.30-16.30	10-14 วันทำการ	300 บาท / สไลด์	Room temp	To be noted in the report	
คำอ่านสไลด์ H&E และแปลผล วินิจฉัยทางจุลพยาธิวิทยา (ในกรณี ผู้ส่งตัวอย่างเตรียมสไลด์ H&E มาเอง)	Histopathological	Slide	จ-ศ 8.30-16.30	ทุกวัน 8.30-16.30	10-14 วันทำการ	200 บาท / สไลด์	Room temp	To be noted in the report	
ย้อมสีพิเศษทาง Histochemistry (หลังจากรายงานผล H&E)**									
Gram Bacteria	Kit method	paraffin block	ทุกวัน 8.30-16.30 อังคาร 8.30-20.30	ทุกวัน 8.30-16.30	3-5** วันทำการ	200	Room temp	To be noted in the report	**หลังจาก รายงานผล H&E
Grocott	Kit method	paraffin block	ทุกวัน 8.30-16.30 อังคาร 8.30-20.30	ทุกวัน 8.30-16.30	3-5** วันทำการ	200	Room temp	To be noted in the report	**หลังจาก รายงานผล H&E
Masson trichrome (with aniline blue)	Kit method	paraffin block	ทุกวัน 8.30-16.30 อังคาร 8.30-20.30	ทุกวัน 8.30-16.30	3-5** วันทำการ	200	Room temp	To be noted in the report	**หลังจาก รายงานผล H&E
Periodic acid-Schiff (PAS)	Kit method	paraffin block	ทุกวัน 8.30-16.30 อังคาร 8.30-20.30	ทุกวัน 7.30-20.15	3-5** วันทำการ	150	Room temp	To be noted in the report	**หลังจาก รายงานผล H&E
Ziehl Neelsen	Kit method	paraffin block	ทุกวัน 8.30-16.30 อังคาร 8.30-20.30	ทุกวัน 7.30-20.15	3-5** วันทำการ	150	Room temp	To be noted in the report	**หลังจาก รายงานผล H&E
Congo red	Kit method	paraffin block	ทุกวัน 8.30-16.30 อังคาร 8.30-20.30	ทุกวัน 8.30-16.30	3-5** วันทำการ	150	Room temp	To be noted in the report	**หลังจาก รายงานผล H&E
Alcian blue pH 2.5	Kit method	paraffin block	ทุกวัน 8.30-16.30 อังคาร 8.30-20.30	ทุกวัน 8.30-16.30	3-5** วันทำการ	150	Room temp	To be noted in the report	**หลังจาก รายงานผล H&E

หมายเหตุ Storage* คือ อุณหภูมิสำหรับการเก็บตัวอย่างก่อนส่งตรวจ ในกรณีที่ไม่สามารถส่งตรวจได้ในทันที

Tests	Methods	Specimen	Operating schedule	Submission hours	TAT	Price (baht)	Storage*	Reference Value	หมายเหตุ
Perls	Kit method	paraffin block	ทุกวัน 8.30-16.30 อังคาร 8.30-20.30	ทุกวัน 8.30-16.30	3-5** วันทำการ	200	Room temp	To be noted in the report	**หลังจาก รายงานผล H&E
Toluidine blue	In-house method	paraffin block	ทุกวัน 8.30-16.30 อังคาร 8.30-20.30	ทุกวัน 8.30-16.30	3-5** วันทำการ	50	Room temp	To be noted in the report	**หลังจาก รายงานผล H&E
PAS Diastase	Kit method	paraffin block	ทุกวัน 8.30-16.30 อังคาร 8.30-20.30	ทุกวัน 8.30-16.30	3-5** วันทำการ	250	Room temp	To be noted in the report	**หลังจาก รายงานผล H&E
Masson Fontana Silver	Kit method	paraffin block	ทุกวัน 8.30-16.30 อังคาร	ทุกวัน 8.30-16.30	3-5** วันทำการ	200	Room temp	To be noted in the report	**หลังจาก รายงานผล H&E
ย้อมสีพิเศษทาง Immuno-histochemistry จาก พาราฟินบล็อกเดิม	Immuno- histochemistry	Unstained slide and paraffin block	จ-ศ 8.30-16.30	ทุกวัน 8.30-16.30	7-10** วันทำการ	ชนิดละ 800 บาท	Room temp	To be noted in the report	**หลังจาก รายงานผล H&E
ห้องปฏิบัติการวินิจฉัยโรคสัตว์สู่คน (Zoonosis Laboratory)									
ทางซีรัมวิทยา โรคแพ้ภูมิตนเองในสุนัข	2ME-MPAT	Serum	อ, พฤ 8.30-16.30	ทุกวัน 8.30-16.30	7 วัน ทำการ	300	2-8°C	Negative	
ชุดทดสอบ โรคแพ้ภูมิตนเองในสุนัข	Chromatographic Immunoassay	EDTA blood, serum	ทุกวัน	8.30-16.30	1 - 2 ชั่วโมง	500	2-8°C	Negative	
เพาะเชื้อ Brucella canis	Culture	Whole blood in Brucella broth	อ, พฤ 8.30-16.30	ทุกวัน 8.30-16.30	1 เดือน	800	37°C	Negative	
Leptospirosis	Real time - PCR, MAT	EDTA blood, serum, urine	อ, พฤ 8.30-16.30	ทุกวัน 8.30-16.30	14 วันทำการ	2500	2-8°C	Negative	Out Lab
Others (Out Lab)									
ACTH	ECLIA	EDTA plasma 2-3 ml	ทุกวัน	7.30-20.15	10 วัน	1200	2-8°C	To be noted in the report	
AFP (Alpha - fetoprotein)	CMIA	Serum 1-2 ml	ทุกวัน	7.30-20.15	3 วัน	300	2-8°C	0.89-8.78 ng/mL	
Alpha-1 antitrypsin	NEPH	Serum 1-2 ml	ทุกวัน	7.30-20.15	10 วัน	1600	2-8°C	90-220 mg/dL	
Anti Thrombin III (Plasma $\geq$ 500 μ L)	Chromogenic	3.2% Citrate plasma 2 ml	ทุกวัน	7.30-20.15	10 วัน	900	-20°C	75-125 %	
Bence - Jones Protein	Robert's test	Random Urine 10 ml	ทุกวัน	7.30-20.15	3 วัน	300	2-8°C	Negative	
Bromide	Spectro	Serum 3 - 4 ml	ทุกวัน	7.30-20.15	16 วัน	600	2-8°C	0-50 mg/dl Toxic conc. > 120 mg/dl	
Calcitonin	ECLIA	Serum 1-2 ml	ทุกวัน	7.30-20.15	16 วัน	1000	2-8°C	M = 0-9.52 pg/mL F = 0-6.40 pg/mL	
Cryptococcus Ag (Qualitative)	AGG	Serum 1-2 ml	ทุกวัน	7.30-20.15	3 วัน	400	2-8°C	Negative	
Cryptococcus Ag (Semi Quantitative)	AGG	Serum 1-2 ml	ทุกวัน	7.30-20.15	3 วัน	800	2-8°C	Negative	
C-Peptide	ECLIA	Fasting Serum 1-2 ml	ทุกวัน	7.30-20.15	3 วัน	1200	2-8°C	1.1- 4.4 ng/mL	
D-Dimer	T	3.2% Citrate plasma 2 ml	ทุกวัน	7.30-20.15	3 วัน	650	2-8°C	< 198 ng/mL	

หมายเหตุ Storage* คือ อุณหภูมิสำหรับการเก็บตัวอย่างก่อนส่งตรวจ ในกรณีที่ไม่สามารถส่งตรวจได้ในทันที

Tests	Methods	Specimen	Operating schedule	Submission hours	TAT	Price (baht)	Storage*	Reference Value	หมายเหตุ
Estradiol	CMIA	Serum 1-2 ml	ทุกวัน	7.30-20.15	3 วัน	500	2-8°C	Normal Menstruating Females - Follicular Phase 21-251 pg/mL - Mid-Cycle Phase 38-649 pg/mL - Luteal Phase 21-312 pg/mL Postmenopausal Females not on HRT < 10-28 pg/mL Postmenopausal Females on HRT < 10-144 pg/mL Males 11-44 pg/mL HRT = Hormone Replacement Therapy	
Free T4	CMIA	Serum 1-2 ml	ทุกวัน	7.30-20.15	3 วัน	250	2-8°C	0.70-1.48 ng%	
Digoxin	T	Serum 1-2 ml	ทุกวัน	7.30-20.15	3 วัน	500	2-8°C	Therapeutic Range 0.8-2.0 ng/mL	
Erythropoietin (EPO) level	ECLIA	Serum 1-2 ml	ทุกวัน	7.30-20.15	10 วัน	800	2-8°C	3.7-29.5 mIU/mL	
Ferritin	ECLIA	Serum 1-2 ml	ทุกวัน	7.30-20.15	3 วัน	500	2-8°C	Male = 30-400 ng/mL Female = 13-150 ng/mL	
Folate in Serum	ECLIA	Serum 1-2 ml	ทุกวัน	7.30-20.15	3 วัน	500	2-8°C	3.89-26.8 ng/mL	
Fructosamine	C	Serum 1-2 ml	ทุกวัน	7.30-20.15	3 วัน	400	2-8°C	Male = 205-285 umol/L Female = 205-285 umol/L	
Gastrin	RIA PEG	Fasting Serum 1-2 ml	ทุกวัน	7.30-20.15	25 วัน	3500	2-8°C	Fasting <= 200 pg/ml	
Growth Hormone	ECLIA	Serum 1-2 ml	ทุกวัน	7.30-20.15	10 วัน	1200	2-8°C	To be noted in the report	
Hbe Ab ลิง	CMIA	Serum 1-2 ml	ทุกวัน	7.30-20.15	3 วัน	400	2-8°C	Negative	
Hbe Ag	CMIA	Serum 1-2 ml	ทุกวัน	7.30-20.15	3 วัน	400	2-8°C	Negative	
Hemoculture	Fluorogenic	Blood Culture	ทุกวัน	7.30-20.15	7 วัน	400	Room temp	No Growth	
Hemoglobin A1C (HbA1C)	C	EDTA Blood 2 ml	ทุกวัน	7.30-20.15	3 วัน	350	2-8°C	DCCT/NGSP = 4.0-6.0 % IFCC = 20-42 mmol/mol	
Histoplasmosis Ab	ID	Serum 1-2 ml	ทุกวัน	7.30-20.15	14 วัน	500	2-8°C	Negative	
17-Hydroxy Progesterone	RIA	Serum 1-2 ml	ทุกวัน	7.30-20.15	16 วัน	2000	2-8°C	0.1-1.5 ng/mL	
IGF1	ECLIA	Serum 1-2 ml	ทุกวัน	7.30-20.15	10 วัน	1400	2-8°C	To be noted in the report	
Insulin	ECLIA	Fasting Serum 1-2 ml	ทุกวัน	7.30-20.15	3 วัน	700	2-8°C	2.5-24.9 uIU/mL	
Osmolality (Serum)	FPD	Serum 1-2 ml	ทุกวัน	7.30-20.15	3 วัน	250	2-8°C	280-288 mOsm/kg	
Osmolality (Urine)	FPD	Random Urine 10 ml	ทุกวัน	7.30-20.15	3 วัน	250	2-8°C	155-889 mOsm/kg	
Lipase	C	Serum 1-2 ml	ทุกวัน	7.30-20.15	3 วัน	250	2-8°C	8-78 U/L	
Magnesium (Mg)	C	Serum 1-2 ml	ทุกวัน	7.30-20.15	3 วัน	250	2-8°C	1.6-2.6 mg/dL	
Mercury	AAS-GF	EDTA > 1 ml	ทุกวัน	7.30-20.15	16 วัน	350	2-8°C	To be noted in the report	
PTH (Intact Parathyroid Hormone) แช่ Freeze	ECLIA	EDTA plasma 1-2 ml ปั่นแยกโดยทันที	ทุกวัน	7.30-20.15	3 วัน	750	-20°C	15-65 pg/mL	
Progesterone	CMIA	Serum 1-2 ml	ทุกวัน	7.30-20.15	3 วัน	500	2-8°C	To be noted in the report	
Prolactin	CMIA	Serum 1-2 ml	ทุกวัน	7.30-20.15	3 วัน	400	2-8°C	To be noted in the report	

หมายเหตุ Storage* คือ อุณหภูมิสำหรับการเก็บตัวอย่างก่อนส่งตรวจ ในกรณีที่ไม่สามารถส่งตรวจได้ในทันที

Tests	Methods	Specimen	Operating schedule	Submission hours	TAT	Price (baht)	Storage*	Reference Value	หมายเหตุ
Partial Thromboplastin Time (PTT)	Clotting	Fresh 3.2% Sodium Citrate plasma 2 ml in Ice Bag	ทุกวัน	7.30-20.15	3 วัน	400	on ice	ค่าอ้างอิงเปลี่ยนแปลงตาม Lot น้ำยา	
Prothrombin Time (PT)	Clotting	Fresh 3.2% Sodium Citrate plasma 2 ml in Ice Bag	ทุกวัน	7.30-20.15	3 วัน	400	on ice	ค่าอ้างอิงเปลี่ยนแปลงตาม Lot น้ำยา	
Thrombin Time (TT)	Clotting	Fresh 3.2% Sodium Citrate plasma 2 ml in Ice Bag	ทุกวัน	7.30-20.15	3 วัน	400	on ice	ค่าอ้างอิงเปลี่ยนแปลงตาม Lot น้ำยา	
Rubella Ab IgG	CMIA	Serum 1-2 ml	ทุกวัน	7.30-20.15	3 วัน	400	2-8°C	Immune person > 10 IU/mL	
Testosterone	CMIA	Serum 1-2 ml	ทุกวัน	7.30-20.15	3 วัน	500	2-8°C	To be noted in the report	
Thyroglobulin Ab	CMIA	Serum 1-2 ml	ทุกวัน	7.30-20.15	3 วัน	500	2-8°C	< 4.11 IU/mL	
Toxoplasma gondii Ab (IgG)	CMIA	Serum 1-2 ml	ทุกวัน	7.30-20.15	3 วัน	450	2-8°C	Negative	
Toxoplasma gondii Ab (IgG) titer	IFA	Serum 1-2 ml	ทุกวัน	7.30-20.15	7 วัน	1200	2-8°C	< 1:16	
Toxoplasma gondii Ab (IgM)	CMIA	Serum 1-2 ml	ทุกวัน	7.30-20.15	3 วัน	500	2-8°C	Negative	
Toxoplasma gondii Ab (IgM) titer	IFA	Serum 1-2 ml	ทุกวัน	7.30-20.15	7 วัน	1200	2-8°C	< 1:16	
Transferrin	IT	Serum 1-2 ml	ทุกวัน	7.30-20.15	3 วัน	500	2-8°C	Male = 1.63-3.44 g/L Female = 1.73-3.60 g/L	
Transferrin Saturation	C	Serum 1-2 ml	ทุกวัน	7.30-20.15	3 วัน	500	2-8°C	20-50%	
Transferrin Saturation	C	Serum 1-2 ml	ทุกวัน	7.30-20.15	3 วัน	500	2-8°C	20-50%	
Troponin T	ECLIA	Serum 1-2 ml	ทุกวัน	7.30-20.15	3 วัน	600	2-8°C	0.0-0.014 ng/mL	
T3	CMIA	Serum 1-2 ml	ทุกวัน	7.30-20.15	3 วัน	170	2-8°C	64-152 ng%	
Vitamin B12	ECLIA	Serum 1-2 ml	ทุกวัน	7.30-20.15	3 วัน	500	2-8°C	197-771 pg/mL	
VMA	CC	Urine 24 hrs. 10 ml + 6 NHCL 30 ml	ทุกวัน	7.30-20.15	10 วัน	500	2-8°C	1-11 mg/24 hrs.	
Mate & Normetanephrine	HPLC	Urine 24 hrs. 100 ml with total volume	ทุกวัน	7.30-20.15	21 วัน	4500	2-8°C	To be noted in the report	

หมายเหตุ Storage* คือ อุณหภูมิสำหรับการเก็บตัวอย่างก่อนส่งตรวจ ในกรณีที่ไม่สามารถส่งตรวจได้ในทันที

**ตารางที่ 1 การนำส่งและการเก็บรักษาในกรณีไม่ได้นำส่งในเวลาที่กำหนดของสิ่งส่งตรวจเพื่อวินิจฉัยโรคติดเชื้อสำหรับห้องปฏิบัติการจุลชีววินิจฉัย

ชนิดของสิ่งส่งตรวจ	ภาชนะบรรจุ	การนำส่ง	การเก็บรักษาในกรณีไม่ได้นำส่งในเวลาที่กำหนด
เพาะเชื้อแบคทีเรียทั่วไป			
1. น้ำไขสันหลัง (CSF)	หลอดปราศจากเชื้อหรือ หลอดเก็บ Urine	ภายใน 15 นาที ห้ามแช่เย็น	ไม่เกิน 24 ชม. ที่อุณหภูมิห้อง (25±3 °C)
2. Body fluid เช่น Peritoneal fluid, Plural fluid	หลอดปราศจากเชื้อหรือ หลอดเก็บ Urine	ภายใน 15 นาที ที่อุณหภูมิห้อง (25±3 °C)	ไม่เกิน 24 ชม. ที่อุณหภูมิห้อง (25±3 °C)
3. Urine	หลอดปราศจากเชื้อหรือ หลอดเก็บ Urine	ภายใน 2 ชม. ที่อุณหภูมิห้อง (25±3 °C)	ไม่เกิน 24 ชม. ที่อุณหภูมิ 2-8 °C
4. Feces/ Rectal swab	หลอด Transport media	ภายใน 2 ชม. ที่อุณหภูมิห้อง (25±3 °C)	ไม่เกิน 48 ชม. ที่อุณหภูมิห้อง (25±3 °C)
5. Respiratory tract เช่น Nasal swab, Throat swab	หลอด Transport media	ภายใน 2 ชม. ที่อุณหภูมิห้อง (25±3 °C)	ไม่เกิน 24 ชม. ที่อุณหภูมิห้อง (25±3 °C)
6. Eye swab	หลอด Transport media	ภายใน 2 ชม. ที่อุณหภูมิห้อง (25±3 °C)	ไม่เกิน 24 ชม. ที่อุณหภูมิห้อง (25±3 °C)
7. Ear swab	หลอด Transport media	ภายใน 2 ชม. ที่อุณหภูมิห้อง (25±3 °C)	ไม่เกิน 24 ชม. ที่อุณหภูมิห้อง (25±3 °C)
8. Genital tract เช่น Vaginal swab, Prostatic fluid	หลอด Transport media หรือหลอดเก็บ Urine	ภายใน 2 ชม. ที่อุณหภูมิห้อง (25±3 °C)	ไม่เกิน 24 ชม. ที่อุณหภูมิห้อง (25±3 °C)
9. Pus, Wound, Abscess	หลอด Transport media	ภายใน 2 ชม. ที่อุณหภูมิห้อง (25±3 °C)	ไม่เกิน 24 ชม. ที่อุณหภูมิห้อง (25±3 °C)
10. Tissue	เพลทปราศจากเชื้อ	ภายใน 2 ชม. ที่อุณหภูมิห้อง (25±3 °C)	ไม่เกิน 24 ชม. ที่อุณหภูมิ 2-8 °C
เพาะเชื้อรา			
1. Skin/Hair	ซองซิปลสะอาด	ภายใน 24 ชม. ที่อุณหภูมิห้อง (25±3 °C)	ไม่เกิน 2 สัปดาห์ อุณหภูมิห้อง (25±3 °C)
2. Urine	หลอดปราศจากเชื้อหรือ หลอดเก็บ Urine	ภายใน 2 ชม. ที่อุณหภูมิห้อง (25±3 °C)	ไม่เกิน 24 ชม. ที่อุณหภูมิ 2-8 °C
3. Body fluid เช่น Peritoneal fluid, Plural fluid, Prostatic fluid	หลอดปราศจากเชื้อหรือ หลอดเก็บ Urine	ภายใน 2 ชม. ที่อุณหภูมิห้อง (25±3 °C)	ไม่เกิน 24 ชม. อุณหภูมิห้อง (25±3 °C)
4. Respiratory tract เช่น Nasal swab, Throat swab	หลอด Transport media	ภายใน 2 ชม. ที่อุณหภูมิห้อง (25±3 °C)	ไม่เกิน 24 ชม. อุณหภูมิห้อง (25±3 °C)
5. Vaginal swab	หลอด Transport media	ภายใน 15 นาที ที่อุณหภูมิห้อง (25±3 °C)	ไม่เกิน 24 ชม. อุณหภูมิห้อง (25±3 °C)
6. Pus, Wound, Abscess	หลอด Transport media, หรือหลอดเก็บ Urine	ภายใน 2 ชม. ที่อุณหภูมิห้อง (25±3 °C)	ไม่เกิน 24 ชม. อุณหภูมิห้อง (25±3 °C)
7. Choana/Cloaca swab	หลอด Transport media	ภายใน 2 ชม. ที่อุณหภูมิห้อง (25±3 °C)	ไม่เกิน 24 ชม. อุณหภูมิห้อง (25±3 °C)
8. Tissue	เพลทปราศจากเชื้อ	ภายใน 2 ชม. ที่อุณหภูมิห้อง (25±3 °C)	ไม่เกิน 8 ชม. ที่อุณหภูมิ 2-8 °C

ที่มา: คู่มือการปฏิบัติงานแบคทีเรียและรา สำหรับโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป 2561 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

Methodology	
ZME-MPAT	2-Mercaptoethanol microtiter plate agglutination test
AAS-GF	Atomic absorption graphite
AGG	Agglutination
C	Colorimetric
CC	Column chromatography
CMIA	Chemiluminescent microparticle immunoassay
CPH	Cumulative pulse height detection
ECLIA	Electrochemiluminescence immunoassay
FFC	Fluorescence flow cytometry
FPD	Freezing point depression
H&E	Hematoxylin and eosin stain
HPLC	High performance liquid chromatography
ID	Immunodiffusion
IFA	Immunofluorescent
IT	Immunoturbidimetry
MAT	Microscopic agglutination test
MTT	MTT (3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide) tetrazolium reduction assay
NEPH	Nephelometry
PCR	Polymerase chain reaction
QPCR	Quantitative Real-Time Polymerase chain reaction
RIA	Radio immunoassay
RT-PCR	Reverse transcription polymerase chain reaction
SLS	SLS hemoglobin
T	Turbidimetry

ห้องปฏิบัติการธนาคารเซลล์ (Animals Cell Bank)			
รายการ		อัตราค่าบริการ (ต่อตัวอย่าง)	หมายเหตุ
1. บริการรับฝากเนื้อเยื่อหรือเซลล์สัตว์ ในถังไนโตรเจนเหลว			
รับแช่เนื้อเยื่อหรือเซลล์ (ต่อหลอดที่นำมาฝาก) คิดค่าบริการเป็นเหมาจ่ายรายปี		1,000-30,000 /ปี	ราคาขึ้นกับจำนวนที่ฝากเก็บดูแลเรื่องการเติมไนโตรเจนเหลวให้เพียงพอไม่ได้รับประกันคุณภาพของเซลล์หรือเนื้อเยื่อ 1,000 บาทต่อหลอด (ฝากไม่เกิน 10 หลอด) 900 บาท (ฝากมากกว่า 10 ถึง 20 หลอด) 800 บาทต่อหลอด (ฝากมากกว่า 20-30 หลอด) 700 บาทต่อหลอด (ฝากมากกว่า 30-40 หลอด) 600 บาทต่อหลอด (ฝากมากกว่า 40-50 หลอด) ฝากมากกว่า 50 หลอดขึ้นไป คิดราคาเหมากล่อง 30,000 บาท
2. บริการแยกเลี้ยงเซลล์ปฐมภูมิ			
บริการแยกเซลล์สืบพันธุ์ต้นกำเนิดจากไข่ คิดค่าบริการต่อตัวอ่อนไข่อีก		30,000-70,000	แยกเซลล์ cPGCs และ tPGCs รวมจำนวน 2 หลอด/ ตัวอย่าง พร้อมสกัด DNA จาก extraembryonic tissue ราคาขึ้นกับจำนวนเซลล์ที่ต้องการเก็บและระยะเวลาที่เลี้ยงเซลล์ (เก็บฟรีปีแรก ปีถัดไปเสียค่าฝาก) - หากเพิ่ม characterize (IF) คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม 5,000 บาท ต่อ marker (DAZL, CVH) - หากเพิ่ม Gonadal migration คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
บริการแยกและเพาะเลี้ยงเซลล์ปฐมภูมิจากเนื้อเยื่อสัตว์ชนิดต่างๆ		10,000-25,000 (เก็บแช่แข็งฟรีปีแรก ปีถัดไปเสียค่าฝาก)	แยกเลี้ยงและเก็บที่ passage 1 จำนวน 2 หลอด/ ตัวอย่าง ราคาแปรผันตามสารเคมีที่ใช้เลี้ยงและแยกเซลล์แต่ละประเภท แยกตามชนิดสัตว์ **หากเพิ่มเวลาเลี้ยงเพิ่มต้นทุน passage ละ 2,000-5,000 บาท
3. บริการแยกเลี้ยง/เก็บ/ขยายจำนวนเพื่อปลูกถ่ายเซลล์ปฐมภูมิชนิดเซลล์ต้นกำเนิดมีเซนไคม์สุนัขจากเนื้อเยื่อไขมัน			
บริการเก็บเนื้อเยื่อไขมัน (*) เพื่อแยกเซลล์ต้นกำเนิดมีเซนไคม์ (Adipose tissue derived MSC Isolation)	คำวัสดุ/สารเลี้ยงเซลล์ (เพื่อ isolate ให้ได้เซลล์ปฐมภูมิ)	45,000	เก็บแช่แข็งฟรีปีแรก ปีถัดไปเสียค่าฝาก Cultivation 4 passage (3 flaskT175/1passage) +freeze 3 tube/passage. *หากเพิ่มเวลาเลี้ยงเพิ่มต้นทุน passage ละ 4,500 บาทต่อ T175
บริการขยายจำนวนเซลล์เพื่อการใช้ประโยชน์ทางการรักษาทางคลินิก (Expansion)	คำวัสดุ/ สารเลี้ยงเซลล์ เพื่อขยายจำนวนเซลล์เพื่อการรักษา (**)	14,000-28,000	คิดตามน้ำหนักหมาไม่เกิน 10 kg ต่อการฉีด 2 ครั้ง (20 ล้านเซลล์ / ครั้ง) *หากเพิ่มจำนวนเซลล์ 5 ล้านเซลล์ คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม 4,500 บาทต่อครั้ง

ห้องปฏิบัติการธนาคารเซลล์ (Animals Cell Bank)			
รายการ		อัตราค่าบริการ (ต่อตัวอย่าง)	หมายเหตุ
4. บริการทดสอบชีวภัณฑ์ทางการแพทย์ด้วยเซลล์มะเร็ง			
บริการตรวจสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งการเพิ่มจำนวนของเซลล์มะเร็งในหลอดทดลอง	1.ด้วยวิธี Proliferation Assay	3,000-6,000	1 ความเข้มข้น ทำการทดลอง 3 ซ้ำ/จุดเวลา * หากเพิ่มจำนวนซ้ำ คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มซ้ำละ 500 บาท ต่อ 1 ความเข้มข้น/ จุดเวลา
	2.ด้วยวิธี MTT Assay	4,600-9,200	
บริการตรวจสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งในหลอดทดลอง	1.ด้วยวิธี Invasion Assay	5,000-10,000	1 ความเข้มข้น ทำการทดลอง 3 ซ้ำ/จุดเวลา * บริการ Invasion และ Migration Assay หากเพิ่มจำนวนซ้ำ คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มซ้ำละ 1000 บาท ต่อ 1 ความเข้มข้น/ จุดเวลา ** บริการ Wound healing Assay (ถ่ายภาพชั่วโมงที่ 0 และชั่วโมงสุดท้ายของการทดลอง) - หากเพิ่มจุดเวลาการถ่ายภาพ คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม 300 บาท ต่อจุดเวลา - หากเพิ่มจำนวนซ้ำ คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มซ้ำละ 500 บาท ต่อ 1 ความเข้มข้น/จุดเวลา
	2.ด้วยวิธี Migration Assay	4,500-9,000	
	3.ด้วยวิธี Wound healing Assay	3,000-6,000	
5. บริการขายเซลล์ไลน์ที่มีในธนาคารเซลล์สัตว์ (ไม่รวมค่าขนส่ง)			
— เซลล์ปกติ/เซลล์มะเร็ง เซลล์แบบมีชีวิต (กู้ขึ้นมาจากไนโตรเจนเหลวแล้ว พร้อมใช้งาน) — เซลล์แบบแช่แข็ง		10,000 – 60,000	แบบมีชีวิต ราคาต่อชนิดใน T25 คิดราคาเพิ่ม 2,000 บาท Avian 8,000-15,000 บาท Mammal 10,000-19,000 บาท Cancer cell line 26,000-51,000 บาท
6. บริการอื่นๆ			
Mycoplasma test		2,500-5,000	ราคาต่อตัวอย่าง PCR
บริการทดสอบอื่นๆ		ตกลงราคา	ยื่นใบเสนอราคา