


2026年度 P3 物理 大問1 惑星上・惑星内部の小球の運動(模範解答)

半径 R ・質量 M の一様な惑星と質量 m の小球。万有引力定数 G 。選択問題なので、導出のあとに解答群の番号を書く。

(1) ア 現象



状態①(表面)から状態②(高さ h)まで

小球は表面(状態①、速さ v)から高さ h (状態②)まで上がる。重力以外の力ははたらかない。

解法

大気の抵抗の影響は無視できる → はたらく力は万有引力(保存力)だけ → エネルギー保存則。万有引力による位置エネルギーは $-\frac{GMm}{r}$ (無限遠が基準)。

答案に書く

立式

エネルギー保存則 (v_h : 高さ h での速さ)

$$\frac{1}{2}mv^2 - \frac{GMm}{R} = \frac{1}{2}mv_h^2 - \frac{GMm}{R+h}$$

計算

$$v_h^2 = v^2 - 2GM \left(\frac{1}{R} - \frac{1}{R+h} \right) = v^2 - \frac{2GMh}{R(R+h)}$$

答

$$\therefore v_h = \sqrt{v^2 - \frac{2GMh}{R(R+h)}}$$

$\therefore$ ① .

吟味

$h = 0$ で $v_h = v$ となり、はじめの速さと一致する。 h が大きいほど v_h は小さい(減速)。

イ

現象

最も高い点では、速さが 0 になる。

解法

小球が惑星表面から最も離れていたときの距離 → 最高点では速さ 0。(ア) の式で $v_h = 0$ 、 $h = H$ (H : 最高点の表面からの距離) とおく。

答案に書く

立式

$$0 = v^2 - \frac{2GMH}{R(R+H)}$$

計算

$$v^2 R(R+H) = 2GMH$$

$$H(2GM - v^2 R) = v^2 R^2$$

答

$$\therefore H = \frac{v^2 R^2}{2GM - v^2 R}$$

$\therefore$ ④ .

吟味

$2GM - v^2 R > 0$ のとき $H > 0$ 。 $v \rightarrow 0$ で $H \rightarrow 0$ となり、もっともらしい。

ウ

現象

戻ってこない = 最高点が有限の位置にならない.

解法

じゅうぶんに時間が経過しても小球が惑星表面に戻ってこない → 最高点がない。(イ)の H が有限にならない条件を考える(分母が 0 以下).

答案に書く

立式

$$2GM - v^2 R \leq 0$$

計算

$$v^2 \geq \frac{2GM}{R}$$

答

$$\therefore v \geq \sqrt{\frac{2GM}{R}}$$

$$\therefore \textcircled{4}.$$


吟味

$v = \sqrt{2GM/R}$ は脱出速度で、(ウ)はこの境界を含む。全エネルギー $\frac{1}{2}mv^2 - \frac{GMm}{R} \geq 0$ でも同じ結果になる。

(2)(a)

エ オ

現象



半径 r の球(質量 M_r)と、小球が受ける万有引力 F
惑星は一樣な密度。半径 r の球の質量 M_r を考える。

解法

一樣な球 → 密度が一定。 $r < R$ では質量は体積に比例し、 $r \geq R$ では惑星全体の質量。

答案に書く

立式

$$M_r : M = \frac{4}{3}\pi r^3 : \frac{4}{3}\pi R^3 \quad (r < R)$$

計算

$$M_r = M \frac{r^3}{R^3}$$

答

$$r \geq R : M_r = M$$

$$\therefore \textcircled{0} \text{ (エ)}.$$

$$r < R : M_r = M \frac{r^3}{R^3}$$


$$\therefore \textcircled{3} \text{ (オ)}.$$

吟味

$r = R$ で (エ)(オ) はどちらも M となり、一致する。

カ

現象



左: M_r , 右: F

M_r を r の関数としてグラフにする。

解法

r の関数としてグラフに表す → (エ)(オ) の式の形から概形を読み取る。

答案に書く

立式

計算

r^3 に比例して 0 から増え、 $r = R$ で M に達する。

答

$$\therefore \textcircled{0}.$$

吟味

$r = 0$ で 0、 $r = R$ で M 、 $r > R$ で一定。

ク
ケ

現象

0 から距離 r の小球が、惑星から受ける万有引力 F . M_r が中心 O に集まったとみなせる.

解法

質量 M_r が惑星の中心位置 O に集まったとした場合に小球にはたらく万有引力と同じ → 万有引力の法則を、 $r \geq R$ と $r < R$ に分けて使う.

答案に書く

立式

万有引力の法則

$$F = G \frac{mM_r}{r^2}$$

計算

$$r \geq R \quad (M_r = M)$$

$$F = G \frac{mM}{r^2}$$

$$r < R \quad (M_r = M \frac{r^3}{R^3})$$

$$F = G \frac{m}{r^2} \cdot M \frac{r^3}{R^3} = G \frac{mM}{R^3} r$$

答

∴ ㉔ (キ) .

∴ ㉓ (ク) .

グラフ: $r < R$ では r に比例、 $r \geq R$ では $\frac{1}{r^2}$ で減少


∴ ㉑ (ケ) .

吟味

$r = R$ で (キ)(ク) はどちらも $G \frac{mM}{R^2}$ となり、 F は連続. $r = 0$ で $F = 0$.

(b) コ

現象



x : O から A の向きを正とする

小球は A で静止して出発する。力は常に O を向く.

解法

運動方程式からトンネル内部における小球は → 運動方程式を立て、 $a = -\omega^2 x$ の形なら単振動.

答案に書く

立式

運動方程式 (x : O から A の向きの位置、 a : 加速度)

$$ma = -G \frac{mM}{R^3} x$$

計算

$$a = -\frac{GM}{R^3} x$$

$$\omega = \sqrt{\frac{GM}{R^3}}$$

答

$a = -\omega^2 x$ の形なので、単振動.

∴ ㉔ .

吟味

$x > 0$ で $a < 0$ 、 $x < 0$ で $a > 0$. 加速度はつねに O 向きで、復元力としてはたらく.

サ

現象

A で静止して始まるので、A は振動の端。振幅は R 、中心は O。B は反対の端で、A から B までは半周期。

解法

点 A から静かに落下 → A は振動の端。点 B に初めて到達するまでにかかる時間 → 半周期。単振動の周期は $T = \frac{2\pi}{\omega}$ 。

答案に書く

立式

$$t = \frac{T}{2} = \frac{\pi}{\omega}$$

計算

$$t = \pi \sqrt{\frac{R^3}{GM}}$$

答

$$\therefore t = \pi \sqrt{\frac{R^3}{GM}}$$

$$\therefore \textcircled{\text{ア}} .$$

吟味

m によらない。 $\sqrt{R^3/GM}$ は時間の次元になる。

シ

現象

A で静止した小球が、中心から距離 r の位置にきたときの速さ v 。

解法

中心からの距離 r の位置にある小球の速さ → エネルギー保存則。復元力 $-kx$ ($k = \frac{GMm}{R^3}$) の位置エネルギーは $\frac{1}{2}kx^2$ 。

答案に書く

立式

エネルギー保存則 (中心 O が基準)

$$\frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2} \cdot \frac{GMm}{R^3} r^2 = 0 + \frac{1}{2} \cdot \frac{GMm}{R^3} R^2$$

計算

$$v^2 = \frac{GM}{R^3} (R^2 - r^2)$$

答

$$\therefore v = \sqrt{\frac{GM}{R} \left(1 - \frac{r^2}{R^2}\right)}$$

$$\therefore \textcircled{\text{イ}} .$$

吟味

$r = R$ で $v = 0$ (端で静止)、 $r = 0$ で最大 $v = \sqrt{GM/R}$ となり、単振動の様子と合う。

※ 参照円に着目すると $v = \omega\sqrt{R^2 - r^2}$ となり、同じ結果。

ス

現象

具体的な惑星の数値で、A から B までの時間を求める。

解法

点 A から静かに落下した小球が点 B に初めて到達するのに要する時間 → (サ) の式に、与えられた数値を代入する。

答案に書く

立式

$$t = \pi \sqrt{\frac{R^3}{GM}}$$

計算

$$\sqrt{\frac{R^3}{GM}} = \sqrt{\frac{(6.7 \times 10^6)^3}{6.7 \times 10^{-11} \times 1.0 \times 10^{25}}} = \sqrt{6.7^2 \times 10^4} = 6.7 \times 10^2$$

$$t = 3.1 \times 6.7 \times 10^2 \approx 2.1 \times 10^3 \text{ [s]}$$

$$\frac{2.1 \times 10^3}{60} \approx 35 \text{ [分]}$$

答

$$\text{約 } 35 \text{ 分.}$$

$$\therefore \textcircled{\text{エ}} .$$

吟味

地球 ($R = 6.4 \times 10^6 \text{ m}$, $GM = gR^2$) では $\pi\sqrt{R/g} \approx 42 \text{ 分}$ 。同程度なので妥当。