การผลิต ปาล์มน้ำมัน

- ✓ พันธุ์ปาล์มน้ำมัน
- ✓ การปลูกและการดูแลรักษาปาล์มน้ำมัน ปีที่ 1
- ✓ การปลูกและการดูแลรักษาปาล์มน้ำมัน ปีที่ 2-3
- ✓ การปลูกและการดูแลรักษาปาล์มน้ำมัน ปีที่ 4 ขึ้นไป

กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2579-0151-8

พันธุ์ปาล์มน้ำมัน
ของกรมวิชาการเกษตร

พันธุ์สุราษฎร์ธานี 1

ผลผลิตเฉลี่ย 3.45 ตัน/ไร่/ปี น้ำมันต่อทะลาย 26%

อาจจะมีต้นที่ให้ผลดิบสีเขียว เมื่อสุกเปลี่ยนเป็นสีส้มและ

ต้นที่ให้ผลดิบสีดำ เมื่อสุกเปลี่ยนเป็นสีแดงประมาณ 50% ของจำนวนต้นทั้งหมด

สุราษฎร์ธานี 1

ข้อจำกัด :

- ทุกพันธุ์ไม่สามารถนำเมล็ดที่ได้จากการผสมเปิดไปทำพันธุ์เพื่อปลูกได้ เนื่องจากเป็นลูกผสมชั่วที่ 1 (F1)
- พันธุ์สุราษฎร์ธานี 1 5 และ 7 อาจพบอาการทางใบบิดซึ่งเป็นลักษณะผิดปกติทางพันธุธรรม ในช่วงอายุ 1 – 3 ปี หลังจากนั้นอาการจะเป็นปกติ

พื้นที่แนะนำ

- ปาล์มน้ำพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานีทุกพันธุ์ สามารถปลูกได้ในพื้นที่เหมาะสมและเหมาะสมมาก
- ปาล์มน้ำมันพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 1 2 และ 5 สามารถปลูกได้ในพื้นที่เหมาะสมปานกลาง แต่ควรมีการให้น้ำในช่วงแล้ง

พันธุ์สุราษฎร์ธานี 3

ผลผลิตเฉลี่ย 2.94 ตัน/ไร่/ปี น้ำมันต่อทะลาย 27%

ก้านทะลายยาวปานกลาง ผลผลิตสีดำสุกสีส้มแดง กะลายาง เนื้อในหนาปานกลาง

สุราษฎร์ธานี 3

ข้อจำกัด :

- ทุกพันธุ์ไม่สามารถนำเมล็ดที่ได้จากการผสมเปิดไปทำพันธุ์เพื่อปลูกได้ เนื่องจากเป็นลูกผสมชั่วที่ 1 (F1)
- พันธุ์สุราษฎร์ธานี 1 5 และ 7 อาจพบอาการทางใบบิดซึ่งเป็นลักษณะผิดปกติทางพันธุธรรม ในช่วงอายุ 1 – 3 ปี หลังจากนั้นอาการจะเป็นปกติ

พื้นที่แนะนำ

- ปาล์มน้ำพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานีทุกพันธุ์ สามารถปลูกได้ในพื้นที่เหมาะสมและเหมาะสมมาก
- ปาล์มน้ำมันพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 1 2 และ 5 สามารถปลูกได้ในพื้นที่เหมาะสมปานกลาง แต่ควรมีการให้น้ำในช่วงแล้ง

พันธุ์สุราษฎร์ธานี 4

ผลผลิตเฉลี่ย 3.35 ตัน/ไร่/ปี น้ำมันต่อทะลาย 25%

ผลดิบสีดำ สุกสีส้มแดง

สุราษฎร์ธานี 4

ข้อจำกัด :

- ทุกพันธุ์ไม่สามารถนำเมล็ดที่ได้จากการผสมเปิดไปทำพันธุ์เพื่อปลูกได้ เนื่องจากเป็นลูกผสมชั่วที่ 1 (F1)
- พันธุ์สุราษฎร์ธานี 1 5 และ 7 อาจพบอาการทางใบบิดซึ่งเป็นลักษณะผิดปกติทางพันธุธรรม ในช่วงอายุ 1 – 3 ปี หลังจากนั้นอาการจะเป็นปกติ

พื้นที่แนะนำ

- ปาล์มน้ำพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานีทุกพันธุ์ สามารถปลูกได้ในพื้นที่เหมาะสมและเหมาะสมมาก
- ปาล์มน้ำมันพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 1 2 และ 5 สามารถปลูกได้ในพื้นที่เหมาะสมปานกลาง แต่ควรมีการให้น้ำในช่วงแล้ง

พันธุ์สุราษฎร์ธานี 5

ผลผลิตเฉลี่ย 3.05 ตัน/ไร่/ปี น้ำมันต่อทะลาย 26%

อาจจะมีต้นที่ให้ผลดิบสีเขียว เมื่อสุกเปลี่ยนเป็นสีส้ม และ

ต้นที่ให้ผลดิบสีดำ เมื่อสุกจะเปลี่ยนเป็นสีแดงประมาณ 50% ของจำนวนต้นทั้งหมด

สุราษฎร์ธานี 5

ข้อจำกัด :

- ทุกพันธุ์ไม่สามารถนำเมล็ดที่ได้จากการผสมเปิดไปทำพันธุ์เพื่อปลูกได้ เนื่องจากเป็นลูกผสมชั่วที่ 1 (F1)
- พันธุ์สุราษฎร์ธานี 1 5 และ 7 อาจพบอาการทางใบบิดซึ่งเป็นลักษณะผิดปกติทางพันธุธรรม ในช่วงอายุ 1 – 3 ปี หลังจากนั้นอาการจะเป็นปกติ

พื้นที่แนะนำ

- ปาล์มน้ำพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานีทุกพันธุ์ สามารถปลูกได้ในพื้นที่เหมาะสมและเหมาะสมมาก
- ปาล์มน้ำมันพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 1 2 และ 5 สามารถปลูกได้ในพื้นที่เหมาะสมปานกลาง แต่ควรมีการให้น้ำในช่วงแล้ง

พันธุ์สุราษฎร์ธานี 6

ผลผลิตเฉลี่ย 3.26 ตัน/ไร่/ปี น้ำมันต่อทะลาย 27%

มีลักษณะทะลายยาวใหญ่ น้ำหนักทะลายสูงกว่า 15 กก.

ผลดิบสีดำ สุกสีส้มแดง กะลาบาง เนื้อในหนาปานกลาง



สุราษฎร์ธานี 6

ข้อจำกัด :

- ทุกพันธุ์ไม่สามารถนำเมล็ดที่ได้จากการผสมเปิดไปทำพันธุ์เพื่อปลูกได้ เนื่องจากเป็นลูกผสมชั่วที่ 1 (F1)
- พันธุ์สุราษฎร์ธานี 1 5 และ 7 อาจพบอาการทางใบบิดซึ่งเป็นลักษณะผิดปกติทางพันธุธรรม ในช่วงอายุ 1 – 3 ปี หลังจากนั้นอาการจะเป็นปกติ

พื้นที่แนะนำ

- ปาล์มน้ำพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานีทุกพันธุ์ สามารถปลูกได้ในพื้นที่เหมาะสมและเหมาะสมมาก
- ปาล์มน้ำมันพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 1 2 และ 5 สามารถปลูกได้ในพื้นที่เหมาะสมปานกลาง แต่ควรมีการให้น้ำในช่วงแล้ง

พันธุ์สุราษฎร์ธานี 7

ผลผลิตเฉลี่ย 3.64 ตัน/ไร่/ปี และ ช่วงเจริญเติบโตเต็มที่ (อายุ 5-10 ปี) ให้ผลผลิตเฉลี่ย 4.72 ตัน/ไร่/ปี น้ำมันต่อทะลายเฉลี่ย 24% เนื้อในต่อผลสูง มีเนื้อในต่อผลเฉลี่ย 11%

ผลดิบสีดำ สุกสีส้มแดง ก้านทะลายสั้น เนื้อในหนา กะลาบาง

สุราษฎร์ธานี 7

ข้อจำกัด :

- ทุกพันธุ์ไม่สามารถนำเมล็ดที่ได้จากการผสมเปิดไปทำพันธุ์เพื่อปลูกได้ เนื่องจากเป็นลูกผสมชั่วที่ 1 (F1)
- พันธุ์สุราษฎร์ธานี 1 5 และ 7 อาจพบอาการทางใบบิดซึ่งเป็นลักษณะผิดปกติทางพันธุธรรม ในช่วงอายุ 1–3 ปี หลังจากนั้นอาการจะเป็นปกติ

พื้นที่แนะนำ

- ปาล์มน้ำพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานีทุกพันธุ์ สามารถปลูกได้ในพื้นที่เหมาะสมและเหมาะสมมาก
- ปาล์มน้ำมันพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 1 2 และ 5 สามารถปลูกได้ในพื้นที่เหมาะสมปานกลาง แต่ควรมีการให้น้ำในช่วงแล้ง

พันธุ์สุราษฎร์ธานี 8

ผลผลิตเฉลี่ย 3.34 ตัน/ไร่/ปี และ ช่วงเจริญเติบโตเต็มที่ (อายุ 5-8 ปี) ให้ผลผลิตเฉลี่ย 4.34 ตัน/ไร่/ปี น้ำมันต่อทะลายเฉลี่ย 24.8%

ผลดิบสีดำ สุกสีส้มแดง กะลาบาง เนื้อในหนา

สุราษฎร์ธานี 8

ข้อจำกัด :

- ทุกพันธุ์ไม่สามารถนำเมล็ดที่ได้จากการผสมเปิดไปทำพันธุ์เพื่อปลูกได้ เนื่องจากเป็นลูกผสมชั่วที่ 1 (F1)
- พันธุ์สุราษฎร์ธานี 1 5 และ 7 อาจพบอาการทางใบบิดซึ่งเป็นลักษณะผิดปกติทางพันธุธรรม ในช่วงอายุ 1–3 ปี หลังจากนั้นอาการจะเป็นปกติ

พื้นที่แนะนำ

- ปาล์มน้ำพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานีทุกพันธุ์ สามารถปลูกได้ในพื้นที่เหมาะสมและเหมาะสมมาก
- ปาล์มน้ำมันพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 1 2 และ 5 สามารถปลูกได้ในพื้นที่เหมาะสมปานกลาง แต่ควรมีการให้น้ำในช่วงแล้ง

การปลูกและการดูแลรักษา

การปลูกและการดูแลรักษาปาล์มน้ำมัน ปีที่ 1

1.การคัดเลือกพื้นที่ปลูก วางแผนการปลูก

2.การเตรียมพื้นที่ปลูก

- การสร้างถนน/การทำทางระบายน้ำ
- การปลูกพืชคลุมดิน

2.การเตรียมพื้นที่ปลูก

- ระยะปลูกและการวางผังปลูกปาล์มน้ำมัน



3.การเลือกซื้อพันธุ์ปาล์มน้ำมัน

√ ต้นกล้าปกติ

เลือกซื้อพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมเทเนอรา (DxP) ได้แก่ ลูกผสมสุราษฎร์ธานี จากแปลงเพาะชำที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมวิชาการเกษตร หรือสอบถามจากหน่วยงานสังกัด กรมวิชาการเกษตร และศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี

X ต้นกล้าผิดปกติ

ใบเกิดใหม่สั้น

ใบย่อยแน่นทึบ

ใบย่อยแคบ

ใบย่อยห่างกัน

4.การปลูก

- เตรียมหลุมปลูก ขุดหลุมให้มีขนาดใหญ่กว่าถุงต้นกล้าเล็กน้อย แยกดินบน-ล่างออกจากกัน

- รองก้นหลุมด้วยร็อคฟอสเฟต (0-3-0) อัตรา 250-500 กรัม/หลุม

4.การปลูก

- ปลูกในช่วงฤดูฝนหรือหลังจากปลูกแล้วจะต้องมีฝนตกอีกอย่างน้อยประมาณ 3 เดือน ข้อควรระวังหลังจากปลูกภายใน 10 วัน หากไม่มีฝนตกควรมีการให้น้ำ
- การปลูก ถอดถุงพลาสติกออกจากต้นกล้าอย่าให้ก้อนดินแตกจะทำให้ชะงักการเจริญเติมโต

4.การปลูก

- วางต้นกล้าลงในหลุมปลูกใส่ดินชั้นบนลงก้นหลุมแล้วจึงใส่ดินชั้นล่างตามลงไป
- จัดต้นกล้าให้ตั้งตรงแล้วจึงอัดดินให้แน่น
- เมื่อปลูกเสร็จแล้วโคนต้นกล้าจะต้องอยู่ในระดับเดียวกันกับระดับดินเดิมของแปลงปลูก

5.การปฏิบัติดูแลรักษา

- สำรวจสวนเป็นประจำ เพื่อตรวจต้นปาล์มและตรวจการเข้าทำลายของหนูและศัตรูพืชอื่นๆ
- การป้องกันกำจัดวัชพืชตามความเหมาะสม
- การปลูกซ่อมในช่วงต้นฤดูฝน
- การปลูกพืชแซมอายุสั้น
- ใส่ปุ๋ยเคมีตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร

การปลูกและการดูแลรักษาปาล์มน้ำมัน ปีที่ 2-3

1.การดูแลสวนปาล์มน้ำมันในฤดูแล้ง

- ควรมีการคลุมโคนต้นปาล์มน้ำมัน
- ประเมินความต้องการน้ำ และให้น้ำตามความเหมาะสม

2.การปลูกซ่อม

สำรวจแปลงปลูก เมื่อพบ

- ต้นที่ถูกทำลายโดยศัตรูพืช
- ต้นที่ถูกระทบกระเทือนจากการขนส่ง
- ต้นผิดปกติ

จะต้องขุดทิ้งและปลูกซ่อมให้เร็วที่สุด (ช่วงฤดูฝน)

3.การตัดแต่งทางใบ

- อายุ 1 - 3 ปี ตัดแต่งทางใบออกเท่าที่จำเป็น เช่น ทางใบที่แห้ง ทางใบที่เป็นโรคหรือแมลงทำลาย เป็นต้น

- ปาล์มน้ำมันเริ่มเก็บเกี่ยวครั้งแรกเมื่ออายุ 3 ปี ดังนั้นในช่วงก่อน 3 ปี ควรตัดดอกชุดแรกทิ้ง เพื่อให้ลำต้นสะสมคาร์โบไฮเดรตเพิ่มขึ้น มีการเพิ่มปริมาณราก ซึ่งจะทำให้ทะลายที่ได้มีความสมบูรณ์และขนาดใหญ่ขึ้น

ตารางปริมาณปุ๋ยเคมีสำหรับปาล์มน้ำมัน 3 ปี แรก ที่ปลูกในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ (ดินทั่วๆไป)

อายุปาล์มน้ำมัน	ชนิดและปริมาณปุ๋ยเคมี (กก./ต้น)				
	21 – 0 -0 (N)	0 – 3 -0 (P)	0 – 0 - 60 (K)	กีเซอร์ไรท์ (Mg)	โบเรท
ก่อนปลูก (รองก้นหลุม)	-	0.50	-	-	-
ปีที่ 1	1.55	1.00	1.00	0.50	0.09
ปีที่ 2	3.00	1.50	2.50	1.00	0.13
ปีที่ 3	4.00	1.50	3.00	0.70	0.13
รวม (กก./ต้น/3ปี)	8.55	4.00	6.50	2.30	0.35
รวม (กก./ไร่/3ปี)	194.94	91.20	148.20	52.44	7.99

หมายเหตุ 1. 0-3–0 (ร็อคฟอสเฟต) ควรมีปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมด (Total phosphorus) ไม่ต่ำกว่า 20%P_2O_5

2. ปุ๋ยแต่ละชนิดเฉลี่ยแบ่งใส่ตามความเหมาะสมในแต่ละปี

4.การดูแลรักษา

กลวิธี: วางกับดักหนูรอบต้น หรือใช้ลวดล้อมต้นปาล์ม

4.การดูแลรักษา

ใช้สารเคมี: 1.ใส่ปุ๋ยเคมีตามคำแนะนำดังตาราง

2.ก่อนใส่ปุ๋ยควรกำจัดวัชพืช และใส่ปุ๋ยในขณะที่ดินมีความชื้นเพียงพอ

3.ปุ๋ยไนโตรเจน(N), โพแทสเซียม(K) และแมกนีเซียม(Mg) ควรหว่านบริเวณโคนต้น โดยระยะห่างจากโคนต้นเพิ่มขึ้นตามอายุปาล์ม (0.50–2.50 เมตร) ปุ๋ยฟอสฟอรัส (P) ใส่เป็นแถบบริเวณรอบโคนต้นห่างจากโคนต้น 2.50 เมตร ถึงบริเวณปลายทางใบ

โรคศัตรูและการป้องกันกำจัด

โรคใบไหม้

สาเหตุ เชื้อรา *Curvularia oryzae*

ลักษณะอาการ

เป็นโรคที่สำคัญในแปลงเพาะกล้า ระยะแรกเกิดจุดเล็กๆ โปร่งใส กระจายอยู่บนยอดที่ยังไม่คลี่ ต่อมาแผลพัฒนาขึ้นมีรูปร่างกลมสีน้ำตาลดำ บุ๋มตรงกลาง ขอบแผลนูนมีลักษณะเป็นมัน มีวงสีเหลืองล้อมรอบ ถ้าหากโรคระบาดรุนแรง แผลจะรวมตัวกันใบเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลมองดูคล้ายไฟไหม้ และอาจทำให้ต้นกล้าตายได้

การป้องกันกำจัด

- สังเกตใบอ่อนของต้นกล้า ซึ่งเป็นส่วนที่ง่ายต่อการเข้าทำลายของเชื้อรา หากพบอาการเพียงเล็กน้อย ให้ตัดส่วนที่เป็นโรคออกไปทำลาย
- ต้นที่แสดงอาการรุนแรง ต้องนำออกจากแปลงเพาะ เพื่อกำจัดแหล่งสะสมของเชื้อราสาเหตุ
- ใส่ปุ๋ยบำรุงให้ต้นกล้าแข็งแรง


พรพิมล อธิปัญญาคม

- หากพบโรคยังคงระบาด พ่นทุก 7 วันด้วยสารแมนโคเซบ 80% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 30 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ อะซอกซี่สโตรบิน + ไดฟีโนโคนาโซล 20% + 12.5% เอสซี อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ไทแรม 80% ดับเบิ้ลยูจี อัตรา 30 กรัมต่อน้ำ20 ลิตร หรือแคปแทน 50% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร โดยไม่พ่นสารชนิด เดียวต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน ควรสลับชนิดสาร เพื่อป้องกันเชื้อต้านทานสารเคมี และงดการให้น้ำด้วยระบบพ่นฝอย เปลี่ยนเป็นใช้ระบบน้ำหยด หรือใช้คนรดน้ำ

โรคลำต้นเน่า

สาเหตุ เชื้อเห็ด *Ganoderma boninenes*

ลักษณะอาการ

มักพบบนต้นปาล์มน้ำมันที่มีอายุมากกว่า 20 ปีขึ้นไป โดยสีของใบซีดจางและแห้งตาย ทางใบล่างหักพับทิ้งตัวห้อยลงรอบ ๆ ลำต้น ทางยอดที่ยังไม่คลี่มีจำนวนมากกว่าปกติ ต้นปาล์มน้ำมันหักพับล้มลงที่บริเวณโคนต้น บางต้นจะยืนต้นตาย ภายในลำต้นจะมีลักษณะกลวงเนื้อเยื่อภายใน ผุเปื่อย เปลือกรากเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล เนื้อเยื่อภายในรากเปลี่ยนเป็นสีดำ ราสร้างดอกเห็ดที่โคนต้นหรือที่รากผิวดินบริเวณใกล้โคนต้น ดอกเห็ดมีสีน้ำตาลแดงขอบสีขาว ผิวด้านบนของดอกเห็ดเรียบเป็นมันคล้ายทาด้วยแลคเกอร์ ผิวด้านล่างมีสีขาวขุ่นเต็มไปด้วยรูเล็ก ๆ

พรพิมล อธิปัญญาคม

พรพิมล อธิปัญญาคม

การป้องกันกำจัด

- ตรวจสอบต้นที่เป็นโรคโดยใช้ไม้เคาะลำต้นปาล์มน้ำมันเพื่อฟังเสียงบริเวณที่ถูกทำลาย
- ขุดหลุมรอบ ๆ ต้นปาล์มที่เป็นโรค เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดจากต้นที่เป็นโรคไปยังต้นปกติโดยการสัมผัสกันของราก
- เก็บดอกเห็ดที่เชื้อเห็ดสร้างขึ้นบนโคนต้นปาล์มน้ำมันที่เป็นโรค หรือที่รากบริเวณผิวดินออกจากแปลง
- ผ่าและตัดส่วนที่เป็นโรคออก ทั้งส่วนที่อยู่เหนือดินและส่วนที่อยู่ใต้ดิน แล้วทาบริเวณที่ตัดด้วยสารเคมี เช่น โคลทาร์ หรือสารที่มีส่วนผสมของโคลทาร์ หรือ สารป้องกันกำจัดโรคพืช ไทแรม 80% ดับเบิ้ลยูจี

ชนินทร ดวงสอาด

แมลงศัตรูและการป้องกันกำจัด

ด้วงกุหลาบ

ทำลายกัดกินใบเวลากลางคืน

ป้องกันกำจัดโดยใส่ฟูราดาน 1 ช้อนชา หรือใช้สารเซฟวิน 85% อัตรา 40 กรัม/น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นในเวลาเย็นช่วงใกล้ค่ำทั่วบริเวณต้น

ใบปาล์มถูกกัดกิน

ด้วงกุหลาบ

หนอนหน้าแมว

ทำลายกัดกินใบ ถ้าอาการรุนแรงมากใบถูกกัดจนเหลือแต่ก้านใบ

ป้องกันกำจัด ใช้สารฆ่าแมลงพ่น เริ่มพ่นสารตั้งแต่หนอนยังเล็กอยู่ ควรพ่นซ้ำที่เดิมอีก 1 ครั้ง โดยห่างจากครั้งแรกประมาณ 10 วัน เช่น carbaryl (Sevin 85 % MP) ต่ออัตรา 10 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร lambda cyhalothrin (Karate 2.5 % EC) ในอัตรา 10 มล. ต่อน้ำ 20 ลิตร

หนอนหัวดำ

เฝ้าระวังหนอนหัวดำมะพร้าวในปาล์มน้ำมัน

หนอนหัวดำเข้าทำลายปาล์มน้ำมันที่อยู่ใกล้กับสวนมะพร้าวที่หนอนหัวดำระบาด

หนอนหัวดำ

พบหนอนหัวดำให้ปฏิบัติดังนี้

1.วิธีเขตกรรมและวิธีกล

- ตัดใบที่มีหนอนหัวดำมะพร้าวไปเผาทำลายทันที
- ไม่ควรเคลื่อนย้ายต้นพันธุ์ปาล์มน้ำมันหรือพืชตระกูลปาล์มมาจากแหล่งที่มีการระบาด

หนอน

ดักแด้

2. การใช้ชีววิธี

- ปล่อยแตนเบียนโกนีโอซัสและบราคอนในอัตราชนิดละ 200 ตัว/ไร่
- ประเมินสถานการณ์หลังปล่อยแตนเบียนทุก 7 วัน
- พ่นแบคทีเรียบาซิลัส (Bt) อัตรา 100 มล./ น้ำ 20 ลิตร โดยเครื่องพ่นแรงดันสูงให้ทั่วทรงพุ่ม ควรพ่นช่วงเย็นหลีกเลี่ยงแสงแดด

ลักษณะใบที่ถูกทำลาย

หนูศัตรูและการป้องกันกำจัด

การปลูกและการดูแลรักษา
ปาล์มน้ำมัน ปีที่ 2-3
(หนูศัตรูและการป้องกันกำจัด)

รู้จริงเรื่องพืช
กับกรมวิชาการเกษตร

หนูที่พบในสวนปาล์มน้ำมันปลูกใหม่ อายุ 1 - 4 ปี

1. หนูพุกใหญ่ หรือ หนูแผง

2. หนูท้องขาวบ้าน



3. หนูนาใหญ่

4. หนูป่ามาเลย์

การปลูกและการดูแลรักษา
ปาล์มน้ำมัน ปีที่ 2-3
(หนูศัตรูและการป้องกันกำจัด)

รู้จริงเรื่องพืช
กับกรมวิชาการเกษตร

ลักษณะการทำลายปาล์มน้ำมัน

กล้าต้นปาล์มน้ำมันใน
แปลงเพาะชำ

ต้นปาล์มน้ำมันเล็กใน
สวนปลูกใหม่

ผลปาล์มน้ำมันดิบและ
สุกบนทะลายปาล์ม

การป้องกันกำจัดหนูศัตรูปาล์มปลูกใหม่

ทำการป้องกันกำจัดแบบผสมผสาน

การกำจัดวัชพืช

ล้อมโคนต้นปาล์มเล็กด้วยลวดตาข่าย หรือแผ่นสังกะสี

การใช้กรงดักและกับดักตาย

เลือกใช้สารกำจัดหนู เช่น ยาดำ สตอม บาราคี เส็ด ฯลฯ

สารชีวินทรีย์กำจัดหนู : โปรโตซัว *Sacocystis singaporensis*

วางเหยื่อพิษ 1 ก้อน/ต้น

การจัดการวัชพืชในสวนปาล์มน้ำมัน

ชนิดวัชพืชในสวนปาล์มน้ำมัน

วัชพืชที่พบในสวนปาล์มน้ำมัน

วัชพืชประเภทใบแคบ เช่น

หญ้าคา

Imperata cylindrica L.

หญ้ารังนก

Chloris barabata Sw..

หญ้าปากควาย

Dactyloctenium aegyptium (L.) Willd..

ชนิดวัชพืชในสวนปาล์มน้ำมัน

วัชพืชที่พบในสวนปาล์มน้ำมัน

วัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น

ขี้ไก่ย่าน

Mikania micrantha Kunth

ลูกใต้ใบ

Phyllanthus amarus Schumach. & Thonn.

ชนิดวัชพืชในสวนปาล์มน้ำมัน

วัชพืชที่พบในสวนปาล์มน้ำมัน

วัชพืชประเภทกก เช่น

แห้วหมู

Cyperus rotundus L.

การควบคุมวัชพืชในปาล์มน้ำมัน

✓ ไม่ใช้สารเคมี

1. การดายด้วยจอบบริเวณโคนต้นปาล์มน้ำมัน โดยเฉพาะต้นที่ปลูกใหม่อายุไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งยังไม่ควรใช้สารกำจัดวัชพืชเพราะอาจเป็นพิษต่อต้นปาล์มได้
2. การตัดวัชพืช ต้องทำต่อเนื่องกันอย่างน้อย 3-4 ครั้งต่อปี ในสวนปาล์มปลูกใหม่ และประมาณ 2 ครั้งต่อปี ในปาล์มอายุ 3-4 ปี
3. การปลูกพืชคลุมดิน โดยการปลูกพืชคลุมดินตระกูลถั่ว
4. การปลูกพืชแซม เช่น ถั่วเขียว ข้าวโพด ทำได้ตั้งแต่ปาล์มเริ่มปลูกใหม่ จนกระทั่งปาล์มเริ่มให้ผลผลิต (ประมาณ 3 ปี) พืชที่นำมาปลูกแซมต้องมีระบบราก ความต้องการธาตุอาหาร อัตราการเจริญเติบโต อายุเก็บเกี่ยว และศัตรูธรรมชาติที่แตกต่างจากปาล์มน้ำมัน

✓ ใช้สารเคมี

สารกำจัดวัชพืช	อัตราการใช้ ต่อน้ำ 20 ลิตร ต่อพื้นที่ 1 งาน	วิธีการใช้/ ข้อควรระวัง
พาราควอต (27.6% เอสแอล)	100-120 มิลลิลิตร	พ่นระหว่างแถวปาล์มน้ำมัน หลังวัชพืชงอก มีความสูงไม่เกิน 30 ซม. ขณะพ่น ระวังไม่ให้ละอองสารสัมผัสต้นและใบปาล์ม
กลูโฟซิเนต-แอมโมเนียม (15% เอสแอล)	175-200 มิลลิลิตร	
ไกลโฟเสต (48% เอสแอล)	125-150 มิลลิลิตร	

การปลูกและการดูแลรักษาปาล์มน้ำมัน ปีที่ 4 ขึ้นไป

1. การประเมินความต้องการปุ๋ย (1)

สังเกตลักษณะอาการขาดธาตุอาหารที่ต้นปาล์ม

1. ไนโตรเจน

2. ฟอสฟอรัส

3. โพแทสเซียม

1. การประเมินความต้องการปุ๋ย (2)

สังเกตลักษณะอาการขาดธาตุอาหารที่ต้นปาล์ม

4. ไนโตรเจน

5. โบรอน

2. การตัดแต่งทางใบ (1)

อายุ 4–7 ปี ควรเหลือทางใบประมาณ 3 รอบ นับจากทะลายล่างสุด

อายุ 7–14 ปี ควรเหลือทางใบประมาณ 2 รอบ นับจากทะลายล่างสุด

อายุ 12 ปีขึ้นไป ควรเหลือทางใบประมาณ 1 รอบ นับจากทะลายล่างสุด

3. การวางกองทางใบ

ทางใบที่ตัดแต่งแล้ว ให้วางเรียงทางใบกระจาย**แถวเว้นแถว หรือวางสลับแถวเว้นแถว** เพื่อกระจายอินทรียวัตถุในสวนปาล์มน้ำมันและช่วยรักษาความชุ่มชื้นในดิน

4. การดูแลสวนปาล์มน้ำมันในฤดูแล้ง

- ควรมีการคลุมโคนต้นปาล์มน้ำมัน
- ประเมินความต้องการน้ำ และให้น้ำตามความเหมาะสม

ลักษณะการขาดน้ำของปาล์มน้ำมัน (1)

ใบหอกมากกว่า 1 ใบ
(ใบยอดที่ไม่คลี่)

ทางใบล่างเหลือง
และแห้งของปาล์ม
น้ำมันที่ขาดน้ำ

ทางใบแห้งและการ
หักพับลงของทางใบ
ด้านล่าง

การใส่ปุ๋ยเคมี

ในปีที่ 4 ขึ้นไป กรณีที่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยตามผลวิเคราะห์ใบ ให้ใส่ในปริมาณเท่ากับปีที่ 3 โดยแบ่งใส่อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี

5. การดูแลรักษา (1)

✓ ก่อนใส่ปุ๋ยควรกำจัดวัชพืช และใส่ปุ๋ยในขณะที่ดินมีความชื้นเพียงพอ

5. การดูแลรักษา (2)

ปุ๋ยไนโตรเจน (N), ฟอสฟอรัส (P), โพแทสเซียม (K) และแมกนีเซียม (Mg) ควรหว่านบริเวณรอบโคนต้น โดยระยะห่างจากโคนต้นเพิ่มขึ้นตามอายุปาล์ม (0.50 - 2.50 เมตร)

หนูศัตรูและการป้องกันกำจัด

การปลูกและการดูแลรักษา
ปาล์มน้ำมัน ปีที่ 4 ขึ้นไป
(หนูศัตรูและการป้องกันกำจัด)

หนูที่พบในสวนปาล์มน้ำมันอายุ 4 ปีขึ้นไป

1. หนูป่ามาเลย์

2. หนูท้องขาวบ้าน

การปลูกและการดูแลรักษา
ปาล์มน้ำมัน ปีที่ 4 ขึ้นไป
(หนูศัตรูและการป้องกันกำจัด)

ลักษณะการทำลายปาล์มน้ำมัน

ผลปาล์มน้ำมันดิบและสุกบนทะลายปาล์ม

ช่อดอกเกสรตัวผู้
และตัวเมีย

การป้องกันกำจัดหนูศัตรูปาล์มอายุ 4 ปีขึ้นไป

ทำการป้องกันกำจัดแบบผสมผสาน

การกำจัดวัชพืช การใช้กรงดักและกับดักตาย

เลือกใช้สารกำจัดหนู เช่น ยาดำ สตอม บาราคี เส็ด ฯลฯ

สารชีวินทรีย์กำจัดหนู : โปรโตซัว *Sacocystis singaporensis*

วางเหยื่อพิษ 1 ก้อน/ต้น

อนุรักษ์สัตว์ศัตรูธรรมชาติของหนู เช่น พังพอน แมวดาว นกแสก
เหยี่ยวนกเขาชิครา งูเหลือม งูทางมะพร้าว งูสิง ฯลฯ

6. การเก็บเกี่ยว (1)

เก็บเกี่ยวทะลายที่สุกเต็มที่ โดยสังเกตจากการหลุดร่วงของผลจะต้องมีผลร่วงประมาณ 1-10 ผล

6. การเก็บเกี่ยว (2)

ช่วงการเก็บเกี่ยว 15 วัน/ครั้ง และลดลงในช่วงฤดูฝน เป็น 10 วัน/ครั้ง

6. การเก็บเกี่ยว (3)

การเก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมันอายุ 3-5 ปี ใช้เสียมแทงตรงก้านทะลาย และตัดให้ชิดทะลาย ก้านทะลายยาวไม่เกิน 5 เซนติเมตร

6. การเก็บเกี่ยว (4)

การเก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมันอายุ 5 ปีขึ้นไป ใช้เคียวเกี่ยวก้านทะลายแล้วดึงลง

ตรวจสภาพสวนอย่างสม่ำเสมอ ใช้ปุ๋ยเคมีให้เหมาะสมตามพื้นที่ชนิดของดินและอายุของต้นปาล์มน้ำมัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยงานของกรมวิชาการเกษตร ดังนี้

ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน

โทรศัพท์ 077-259144-6 โทรสาร. 077-259450

โรค แมลงศัตรู และ วัชพืช

สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช โทรศัพท์ 0-2579-8540