

การปลูก
สับปะรด
ระบบเกษตรอินทรีย์
กรมส่งเสริมการเกษตร

การปลูกสับปะรดระบบเกษตรอินทรีย์



คือการปลูกพืช ที่ไม่ใช้สารเคมีที่มนุษย์ทำขึ้นแต่ใช้วัสดุจากธรรมชาติแทนเพื่อลดพิษภัยที่อาจเกิดจากสารเคมี ทั้งในดิน ในน้ำ ในอากาศ และในผลิต

การทำการเกษตรระยะเวลา 50 กว่าปีที่ผ่านมา ได้ใช้พื้นที่ป่าไม้ไปมาก เป็นเหตุให้ปริมาณฝนลดน้อยลงและตกไม่ถูกต้องตามฤดูกาล ดินขาดการบำรุงอย่างถูกต้อง ต้องใช้ปุ๋ยเคมีอย่างมากเพื่อเพิ่มผลผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของพลเมืองที่เพิ่มขึ้น เมื่อใส่ปุ๋ยมากเกินไปทำให้ต้นพืชอ่อนแอ จึงต้องใช้สารเคมีฆ่าแมลงและเชื้อโรคกันขนานใหญ่ ผลที่เกิดขึ้นคือดินเสื่อมโทรม ปลูกพืชไม่ขึ้น สารพิษตกค้างในพืชผล ในดิน ในน้ำ คน สัตว์เจ็บป่วย คนทั่วโลกจึงหันมาทำการเกษตรแบบอินทรีย์มากขึ้นเพื่อสุขภาพของผู้ปลูก

การจัดการดินและระบบการปลูกสับปะรด

สภาพและปัจจัยที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกสับปะรด สภาพพื้นที่ควรอยู่ในเขตเกษตรเศรษฐกิจสับปะรด เป็นพื้นที่ราบหรือที่ดอนมีความสูงจากระดับน้ำทะเลไม่เกิน 600 เมตร ความลาดเอียงประมาณ 1-3 เปอร์เซ็นต์ แต่ไม่ควรเกิน 5-10 เปอร์เซ็นต์ ไม่มีน้ำท่วมขัง ห่างไกลจากแหล่งมลพิษ การคมนาคมสะดวก อยู่ใกล้โรงงานหรือแหล่งรับซื้อผลิต สำหรับลักษณะดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกสับปะรดมีลักษณะเป็นดินร่วน หรือร่วนปนทราย ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง มีอินทรียวัตถุไม่ต่ำกว่า 1.5 เปอร์เซ็นต์ การระบายน้ำและถ่ายเทอากาศดีระดับหน้าดินลึกไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินอยู่ระหว่าง 4.5-5.5 ในด้านสภาพภูมิอากาศนั้น อุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของสับปะรดอยู่ระหว่าง 24-30 องศาเซลเซียส มีปริมาณน้ำฝนกระจายสม่ำเสมอระหว่าง 1,000-1,500 มิลลิเมตรต่อปี และมีแสงแดดจัด

ความต้องการธาตุอาหารของสับปะรด สับปะรดมีความต้องการธาตุอาหารหลักได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมโดยในแต่ละฤดูกาลผลิตสับปะรดต้องการ ไนโตรเจน 6-9 กรัม N ต่อต้น ฟอสฟอรัส 2-4 กรัม P_2O_5 ต่อต้น และโพแทสเซียม 8-15 กรัม K_2O ต่อต้น การปลูกสับปะรดในจำนวน 6,160 ต้นต่อไร่ จะให้ผลผลิตเฉลี่ย 8.8 ตันต่อไร่

สับปะรดเป็นพืชที่ต้องการธาตุไนโตรเจน และโพแทสเซียมในปริมาณค่อนข้างสูง ถ้าขาดไนโตรเจนจะเริ่มแสดงอาการที่ใบอ่อน จะมีสีเขียวจาง ๆ แต่ใบแก่ยังคงมีสีเขียวเข้ม ต่อมาใบที่งอกใหม่จะมีขอบสีแดง ถ้าใบมีสีเหลืองซีดต้องให้ปุ๋ยทันที มิฉะนั้นจะทำให้ผลผลิตลดลงมาก โดยจะไม่เกิดหน่อและตะเกียง

ถ้าขาดโพแทสเซียม ปลายใบจะไหม้ จะมีจุดไหม้ที่ใบแก่ต่อมาเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล และเหี่ยวแห้งไป ผลจะมีขนาดเล็กสุกช้า และมีปริมาณกรดในเนื้อสับปะรดน้อยมาก

สำหรับความต้องการธาตุฟอสฟอรัสในสับปะรด จะน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับธาตุอาหารหลักทั้งสองชนิด แต่ถ้าดินขาดธาตุฟอสฟอรัสแล้วจะทำให้ต้นไม่แข็งแรง หน่อและตะเกียงจะมีจำนวนลดลงอย่างมาก นอกจากนี้ธาตุเหล็กมีความสำคัญ

เช่นกัน สับปะรดที่มีอาการขาดธาตุเหล็ก เริ่มจากใบอ่อนมีสีซีดคล้ายขาดไนโตรเจน และมีรอยแต้มสีแดงขึ้นทั่วไปมีสีน้ำตาลที่ปลายรากและไม่มีรากแขนงให้เห็นผลจะแก่เร็ว แต่มีปริมาณกรด ในเนื้อสับปะรดต่ำในบริเวณดินที่มีแมงกานีสสูงหรือดินมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างสูงกว่า 5.8 จะพบอาการขาดธาตุเหล็กอยู่เสมอ

ในสภาพดินทรายซึ่งมีอินทรียวัตถุต่ำจะพบอาการ ขาดธาตุทองแดง และสังกะสีโดยปรากฏอาการที่ยอดของใบอ่อนและจะบิดเบี้ยว ใบจะแคบและมีสีเหลืองอ่อนความทนทานของผลต่อแสงแดดจะลดลง ทำให้ผิวเปลือกไหม้เกรียม มีลักษณะเป็นหย่อม

สับปะรดเป็นพืชที่มีอายุนาน 4-5 ปี จะเก็บผลผลิตครั้งแรกได้หลังจากปลูกได้ 15-18 เดือน หลังจากนั้นเก็บเกี่ยวปีละครั้งได้อีก 2 รุ่น

การเตรียมพื้นที่

1. การวางผังแปลง

การทำไร่สับปะรดนั้นจำเป็นต้องมีการวางผังแปลงอย่างดีเพื่อให้สะดวกในการปฏิบัติงานและให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนี้ คือ

(1) กำหนดขนาดแปลงและถนน ในพื้นที่ขนาดใหญ่และพื้นที่ขนาดกลาง จะต้องจัดแบ่งพื้นที่ออกเป็นแปลง โดยมีความกว้างของแปลงประมาณ 40-50 เมตร ความยาวไม่จำกัดแต่ไม่ควรยาว เกิน 200 เมตร ระหว่างแปลงมีถนนซึ่งรถยนต์เข้าไปได้ การวางแนวแถวปลูกให้วางขวางแปลง โดยตั้งฉากกับแนวถนน ซึ่งจะสะดวกในการปฏิบัติงาน เช่นใส่ปุ๋ย การเก็บเกี่ยวผลผลิตแปลงปลูกที่มีขนาดกว้างไปจะทำให้แรงงานมากในการขนผลผลิตอกจากแปลง

(2) การวางแนวของแปลงในพื้นที่ราบ ควรวางแนวแปลงปลูกให้เข้ากันได้กับถนน แต่ในบริเวณลาดเอียงหรือลาดชันควรวางแปลงตามยาวขนานกับแนวลาดเอียงคือแถวปลูกจะขวางแนวลาดเอียงเพื่อลดการชะล้างและสูญเสียหน้าดิน จากการไหลของน้ำฝน นอกจากนี้ควรมีการอนุรักษ์ดินและน้ำโดยการปลูกพืชป้องกันการชะล้างพังทลายของดินตามแนวขวางของแปลง เช่น ปลูกหญ้าแฝก เนื่องจากหญ้าแฝก มีส่วนประกอบของรากเจริญเติบโตอย่างหนาแน่นจะช่วยยึด

โครงสร้างของดินได้ และใบหญ้าแฝกสามารถตัดนำมาใช้ประโยชน์ในการคลุมดินระหว่างแถวปลูกสับปะรดได้



(3) การกำหนดทางระบายน้ำทำทางระบายน้ำเพื่อมิให้น้ำขัง

(4) การปลูกพืชเพื่อป้องกันการปนเปื้อนจากภายนอกพื้นที่ หรือทางอากาศโดยปลูกไม้ยืนต้นหรือไม้พุ่มเป็นแนวกันชน ป้องกันลมป้องกันแมลงศัตรูพืช ป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน ควรปลุกพืชตระกูลถั่วประเภทไม้ยืนต้นโตเร็ว ได้แก่ กระถิน แคฝรั่ง มะแฮะ และกระถินเทพา เป็นต้น เนื่องจากเป็นพืชบำรุงดินที่สามารถเพิ่มไนโตรเจนให้กับดินได้ส่วนหนึ่ง

2. การปรับพื้นที่

ในการปรับพื้นที่ถ้าพื้นที่ไม่สม่ำเสมอ ไม่จำเป็นต้องปรับหน้าดินให้เป็นแนวราบเรียบทั้งแปลง แต่เน้นการปรับหน้าดิน เพื่อมากลบ แต่ถ้าเป็นแอ่งลึกหรือกว้างมากให้ทำการแก้ไขโดยทำทางระบายน้ำออกจากแอ่งดังกล่าว

3. การเตรียมดิน

พื้นที่ที่เคยปลูกสับปะรด ให้ไถกลบสับใบและต้นปล่อยให้ย่อยสลายเป็นเวลา 1 เดือน แล้วไถกลบ 1 ครั้ง ตากดิน 7-10 วัน พรวน 1-2 ครั้งยกแปลงสูง 15 เซนติเมตร แล้วทำแนวปลูกสับปะรดกรณีพื้นที่มีความลาดมากกว่า 3 เปอร์เซ็นต์ ต้องทำร่องระบายน้ำรอบแปลงปลูกและทำการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันหรือลดการชะล้างพังทลายของหน้าดิน

การเตรียมพื้นที่ควรทำในฤดูแล้งและมีขั้นตอน ดังนี้

(1) ถ้ามีการตัดไม้หรือไม้พุ่มขนาดใหญ่ให้ใช้รถเกรดหรือรถไถดินติดใบมดไปกองรวมกันให้ออกจากพื้นที่ ในกรณีที่พื้นที่เป็นแปลงสับปะรดเก่าควรใช้รถติดใบมีด ปั่นเพื่อฟันต้น และใบสับปะรดให้ละเอียดเพื่อไถกลบต่อไปเป็นการเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน

(2) ไถด้วยผาน 3 จำนวน 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 2 ไถในแนวขวางกับครั้งแรก การไถควรไถให้ลึกเพื่อให้ซึมลงใต้ดินมากขึ้น

(3) ในพื้นที่ซึ่งดินค่อนข้างอุ้มน้ำหรือเป็นที่ราบควรยกร่องเล็กน้อยเพื่อให้ระบายน้ำได้ดีขึ้นซึ่งอาจจะใช้ผานยกร่องที่ใช้ในไร่อ้อย ความกว้างของร่อง 1.6 เมตร โดยปลูก 2 แถว บนร่องหรือ 2.4 เมตร โดยปลูก 3 แถว บนร่อง

4. การเตรียมแหล่งน้ำ

แหล่งน้ำที่ใช้ในแปลงเพาะปลูกจะต้องแยกกันจากแหล่งน้ำที่ใช้ในแปลงเกษตรเคมีเพื่อป้องกันปัญหาการปนเปื้อนของสารพิษตกค้างสำหรับกรณีที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้จะต้องให้หน่วยงานรับรองเป็นผู้ตรวจประเมินความเป็นไปได้ของแหล่งน้ำในการทำเกษตรอินทรีย์ สำหรับการขุดบ่อกัดเก็บน้ำใหม่ควรมีการปลูกหญ้าแฝกบริเวณขอบบ่อเพื่อป้องกันการพังทลายของดินและรากแฝกสามารถกักเก็บสารพิษได้

การบำรุงดินด้วยอินทรีย์วัตถุ

1. ช่วยการไถเตรียมดิน

หลังจากไถเตรียมดินทำการฉีดพ่นปุ๋ยอินทรีย์น้ำอัตรา 5 ลิตรต่อไร่ โดยเจือจาง 1 : 500-1 : 1,000 แล้วทำการไถกลบวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรได้แก่ เปลือกสับปะรด กากสับปะรด หรือแกลบ แล้วปล่อยทิ้งไว้เพื่อให้เกิดการย่อยสลายเป็นเวลา 1 เดือน

2. ปลูกพืชปุ๋ยสดบำรุงดินก่อนปลูกสับปะรด

หลังจากไถกลบวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร และมีการย่อยสลายสมบูรณ์ดีแล้วทำการปลูกพืชสดได้แก่ ถั่วพร้า หรือปอเทือง หรือถั่วพุ่มในอัตราเมล็ดพันธุ์ 10 5 และ 8 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลำดับในระหว่างการปลูกพืชปุ๋ยสด ทำการฉีดพ่นด้วยปุ๋ยอินทรีย์น้ำอัตรา 5 ลิตรต่อไร่ โดยเจือจาง 1:500-1 : 1,000 ทำการฉีดทุก 10 วัน การใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำจะช่วยเร่งการเจริญเติบโตของใบและลำต้น มีผลทำให้ได้น้ำหนักสดของพืชปุ๋ยสดเพิ่มขึ้น เมื่อพืชปุ๋ยสดมีอายุครบ 50 วัน หรือออกดอก ทำการไถกลบและปล่อยทิ้งไว้ให้ย่อยสลายเป็นเวลา 15 วัน จึงทำการปลูกสับปะรด

3. การปลูกพืชบำรุงดินในช่วงระหว่างปลูกสับปะรด

ในช่วงแรกของการปลูกสับปะรดทำการปลูกพืชตระกูลถั่วบำรุงดินระหว่างแถวหน่อปลูกสับปะรด (เช่น ถั่วเวอนาโร หว่านระหว่างแถวสับปะรด อัตรา 1-2 กิโลกรัมต่อไร่) หรือปลูกถั่วพุ่ม ถั่วพร้า หรือคาโลโปโกเนียม เป็นต้น การปลูกพืชบำรุงดินในระหว่างแถวสับปะรดมีประโยชน์ทำให้เพิ่มไนโตรเจนกับดิน เพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในดิน ทำให้ดินมีความชุ่มชื้นและเป็นการคลุมดิน เพื่อป้องกันวัชพืชขึ้น เศษพืชบำรุงดินดังกล่าวสามารถใช้คลุมดินได้ต่อไป

4. การใช้เศษวัสดุการเกษตรคลุมดินในช่วงระหว่างปลูกสับปะรด

หลังจากที่มีการใช้เศษพืชบำรุงดินคลุมดิน ในระหว่างแถวสับปะรดควรจะนำเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรร่วมด้วยกับการคลุมดิน เช่น ฟางข้าว เปลือกสับปะรด กากสับปะรด แกลบ หรือใบหญ้าแฝก เป็นต้น เพื่อเป็นการช่วยรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินทั้งในด้านการป้องกันการสูญเสียธาตุอาหารในดินและความชื้นในดิน รวมถึงการป้องกันวัชพืชที่จะขึ้นในระหว่างแถวสับปะรดด้วย

5. การใช้ปุ๋ยน้ำชีวภาพแทนการเสริมการเจริญเติบโต

ใช้ปุ๋ยน้ำชีวภาพ อัตรา 5 ลิตรต่อไร่ โดยเจือจาง 1 : 500-1 : 1,000 ใส่ลงดินในช่วงก่อนปลูกหน่อสับปะรด และทุก ๆ 1 เดือน เพื่อเร่งการเจริญของลำต้นและใบจนกระทั่งถึงช่วง บังคับให้ออกดอก เมื่ออายุ 8-12เดือนและเมื่อผลมีอายุ 2.5 เดือน ปุ๋ยน้ำชีวภาพเป็นแหล่งของฮอร์โมน หรือสารเสริมการเจริญเติบโตที่สำคัญหลายชนิด ปุ๋ยน้ำชีวภาพจะช่วยเร่งการเจริญเติบโตของใบและลำต้น ทำให้ใบขยายใหญ่และลำต้นอวบมากขึ้นและผลสับปะรดจะมีขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นการใช้ปุ๋ยน้ำชีวภาพอาจจะให้พร้อมกับช่วงระหว่างการใช้น้ำได้ นอกจากนี้การใส่ปุ๋ยน้ำชีวภาพ จะช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในดินทำให้สามารถควบคุมและยับยั้งการเจริญของเชื้อสาเหตุโรคพืชบางชนิดในดินได้

6. การใช้อินทรีย์วัตถุบางชนิดเพื่อเพิ่มธาตุอาหารพืชและทดแทนปุ๋ยเคมี

ในพื้นที่ 1 ไร่ ซึ่งมีจำนวนต้นสับปะรด 8,500 ต้น ความต้องการปุ๋ยไนโตรเจน 68 กิโลกรัม N ต่อไร่ ปุ๋ยฟอสฟอรัส 25.5 กิโลกรัม P_2O_5 ต่อไร่ และปุ๋ยโพแทสเซียม 85 กิโลกรัม K_2Oต่อไร่ ในการปลูกพืชระบบเกษตรอินทรีย วัตถุเพื่อปรับปรุงโครงสร้างของดินแล้วพืชจำเป็นต้องได้รับธาตุอาหาร เพื่อการเจริญเติบโตและออกผลผลิตด้วย โดยจะต้องใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพซึ่งมีแหล่งของธาตุอาหารปริมาณมากหรือสารปรับปรุงดินธรรมชาต

ดังนั้น การจัดการความสมบูรณ์ของดินไม่เพียงพอ หรือขาดธาตุอาหารที่สำคัญบางชนิดไป สามารถนำอินทรียวัตถุจากธรรมชาติบางประเภทเป็นแหล่งธาตุอาหาร เพื่อเป็นการทดแทนปุ๋ยเคมีบางชนิดได้มีดังนี้

1) แหล่งธาตุไนโตรเจน เช่น มูลไก่ และมูลเป็ด
2) แหล่งธาตุฟอสฟอรัส เช่น หินฟอสฟอรัส กระดูกป่น และมูลค้างคาว
3) แหล่งธาตุโพแทเซียม เช่น ขี้เถ้า และหินปูนบางชนิด
4) แหล่งธาตุแคลเซียม เช่น ปูนขาว โดโลไมท์ เปลือกหอยป่น และกระดูกป่น เป็นต้น

วิธีการปลูก

1. ปลูกด้วยหน่อ คัดหน่อให้มีขนาดเดียวกันสำหรับปลูกในแต่ละแปลง เพื่อสามารถเก็บเกี่ยวได้พร้อมกัน หน่อที่ใช้ปลูกมี 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก (300-500 กรัม) ขนาดกลาง (500-700 กรัม) หรือขนาดใหญ่ (700-900 กรัม) ไม่ควรใช้หน่อพันธุ์ที่หักจากต้นแล้วเก็บไว้นานเกินไปสามารถบังคับดอกได้ดีเมื่ออายุปลูก 8-12 เดือน ขึ้นอยู่กับขนาดของหน่อที่ใช้ปลูก

2. การปลูกและระยะปลูก ก่อนปลูกทำการแช่หน่อด้วยปุ๋ยอินทรีย์น้ำความเข้มข้น 1:500 ถึง 1:1,000 เป็นเวลา 24 ชั่วโมง และวางผึ่งไว้ 1 วัน จากนั้นชุบหน่อด้วยจุลินทรีย์ป้องกันโรคพืช และจุลินทรีย์ป้องกันแมลงศัตรูพืช ทำการปลูกแถวคู่ระยะปลูก 30x30x (80-90) เซนติเมตร ปลูกได้ประมาณ 7,500 - 8,500 ต้นต่อไร่ การปลูกส่วนใหญ่มักปลูกเป็นแถวคู่ ฝังหน่อให้ลึก 15-25 เซนติเมตร ถ้าเป็นการปลูกในช่วงฤดูฝนให้ฝังหน่อเอียง 45 องศา เพื่อป้องกันน้ำขังในยอดถ้าปลูกในฤดูแล้งให้ฝังหน่อตั้งตรง

3. การปลูกสับปะรดในฤดูฝน ควรฝังหน่อให้เอียง 45องศา เพื่อป้องกันน้ำขังในยอด ถ้าปลูกในฤดูแล้งฝังหน่อให้ตั้งตรง หากมีเครื่องมือช่วยปลูก ซึ่งเป็นเหล็กคล้ายมีดปากแหลม ช่วยเปิดหลุมจะทำให้สะดวกและรวดเร็วกว่าใช้จอบเฉลี่ยแล้วผู้ปลูก 1 คน สามารถปลูกได้วันละ 5,000-7,000 หน่อ

การดูแลรักษาและกำจัดศัตรูพืชในระบบเกษตรอินทรีย์

1. การให้น้ำในแปลงปลูกสับปะรด

สับปะรดมีความต้องการน้ำในทุกระยะของการเจริญเติบโต โดยปกติถ้าสับปะรดได้รับน้ำอย่างสม่ำเสมอ ทุกเดือน เดือนละประมาณ 100 มิลลิเมตร จะเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของต้นสับปะรดตามปกติ ในสภาพพื้นที่ปลูกเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จะมีปริมาณน้ำฝนที่ไม่สม่ำเสมอกันในแต่ละเดือนบางช่วงแห้งแล้งยาวนานติดต่อกัน (ธันวาคม-เมษายน) บางช่วง มี ปริมาณน้ำฝนปานกลาง (พฤษภาคม-กันยายน) และบางช่วงมีปริมาณน้ำฝนตกมากเกินไป จนทำให้สับปะรด

สับปะรดเสียหายจากการถูกน้ำขังและเชื้อโรคระบาด (ตุลาคม-พฤศจิกายน)ที่มีผลทำให้การเจริญเติบโตของสับปะรดผิดปกติ ไม่ได้ผลผลิตที่ดีและคุณภาพของผลผลิตลดลง

การวางแผนให้น้ำ เพื่อที่จะกระจายผลผลิตโดยมีเป้าหมายเพื่อให้มีผลผลิตเก็บเกี่ยวในช่วงระหว่างประมาณเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ซึ่งจะเป็นช่วงที่ราคาสับปะรดอยู่ในเกณฑ์ดีทุกปีจะต้องเริ่มจากการวางแผนให้น้ำช่วงระยะปลูก เพื่อให้สับปะรดออกรากตั้งตัวโดยเร็ว ระยะนี้ต้องการน้ำปริมาณค่อนข้างมากกว่าปกติโดยต้องให้น้ำต่อเนื่องจนดินฉ่ำน้ำ (ลักษณะคล้ายกับได้รับฝนที่ตกหนักต่อเนื่องครั้งใหญ่) หลังจากนั้นประมาณ 1-2 สัปดาห์ สับปะรดจะออกรากอย่างสม่ำเสมอ หลังจากนั้นให้น้ำในระยะที่มีฝนปริมาณน้อย หรือฝนทิ้งช่วงตามปกติโดยให้น้ำประมาณเดือนละ 2 ครั้ง พยายามให้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการให้น้ำลงไปในกาบใบปริมาณน้ำที่ให้ขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือโดยสังเกตปริมาณน้ำที่ต้นสับปะรดได้รับบริเวณกาบใบและบริเวณใจกลางยอด ซึ่งถ้ามีน้ำขังอยู่บริเวณกาบใบและยอดพอมองเห็นก็พอเพียงสำหรับการให้ในแต่ละครั้ง

การให้น้ำมีข้อควรพิจารณาดังนี้คือ

1) ไม่จำเป็นต้องให้น้ำถ้ามีปริมาณน้ำฝนสม่ำเสมอตลอดฤดูปลูก
2) ในฤดูแล้งหรือฝนทิ้งช่วงควรให้น้ำต้นสับปะรดที่กำลังเจริญเติบโต สัปดาห์ละ 1-2 ลิตรต่อต้น
3) ควรให้น้ำก่อนและหลังการออกดอก
4) หยุดให้น้ำก่อนเก็บผลผลิต 15-30 วัน

2. การรักษาความชื้นของดินโดยใช้วัสดุคลุมดิน

การใช้วัสดุคลุมผิวดินระหว่างแถวปลูกสับปะรดเพื่อลดการระเหยของน้ำไว้ให้มากที่สุด เป็นวิธีหนึ่งที่ใช้ได้ผล ในต้นทุนต่ำ และอาจจะใช้ทดแทนการให้น้ำชลประทานได้ในบางช่วง เนื่องจากสับปะรดเป็นพืชที่ค่อนข้างจะทนต่อความแห้งแล้งและมีคุณสมบัติพิเศษ ในการเก็บน้ำทั้งการสะสมในใบและสะสมบริเวณกาบใบ การขาดน้ำระยะสั้นๆ อาจจะไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตมากนัก ดังนั้น ในบางช่วงถ้าหากไม่แห้งแล้งต่อเนื่องยาวนานเกินไป การใช้วัสดุคลุมดิน

ค่อนข้างพอเพียงในการรักษาความชื้นของดินไว้ในระยะที่ฝนขาดช่วง วัสดุที่เหมาะสมในการใช้คลุมผิวดินเพื่อรักษาความชื้นในแปลงปลูกสับปะรดควรจะมีคุณสมบัติดังนี้ คือ

1) เป็นวัสดุที่หาได้ง่ายทั่วไปในท้องถิ่น ราคาประหยัดค่าใช้จ่าย
2) ไม่เป็นอันตรายต่อระบบราก หรือต้นสับปะรด
3) มีน้ำหนักเบา ขนส่งสะดวก
4) รักษาความชื้นของดินได้ดี อุ้มน้ำและฝนตกผ่านได้สะดวก
5) สามารถย่อยสลายได้ และเป็นวัสดุปรับปรุงดินในระยะยาว มีวัสดุที่สามารถนำมาใช้เพื่อการคลุมดินหลายชนิดได้แก่ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยอินทรีย์ บางชนิด ขุยมะพร้าวจากโรงงานทำเส้นใย เศษหญ้า เศษสับปะรด หรือเศษใบอ้อย กากปั่นของชานอ้อยจากโรงงานน้ำตาล
6) สามารถควบคุมการงอกของวัชพืชในดินได้
7) สับปะรดมีการเจริญเติบโตสม่ำเสมอ ตากปกติต้นไม่เกิดสภาวะเครียดการขาดน้ำ ซึ่งมีผลดีกับคุณภาพของผลผลิต เพราะสับปะรดมีความต้านทานต่อโรคเพิ่มขึ้น

3. การบังคับดอก

1) ในแปลงเดียวกัน ควรบังคับดอกพร้อมกัน

2) บังคับดอกเมื่อต้นสับปะรดมีน้ำหนักต้นปลูกระหว่าง 2.3-2.8 กิโลกรัม หรือต้นสับปะรดมีอายุระหว่าง 7-8 เดือน ซึ่งจะมีต้นที่อวบใหญ่หรือมีจำนวน 45 ใบขึ้นไป โดยใช้ไม้ฟาดไปที่ต้นสับปะรดเพื่อให้เกิดแผลและต้นสับปะรดสร้างสารเอทธีลีนออกมาทำการบังคับดอกในช่วงเย็นหรือกลางคืน

3) การวางแผนให้สับปะรดออกผลในช่วงดังกล่าวจะต้องวางแผนให้ปุ๋ยที่เหมาะสมควบคู่ไปกับการให้น้ำ โดยเฉพาะต้องหลีกเลี่ยงไม่ให้ต้นสับปะรดออกดอกธรรมชาติในฤดูหนาว ซึ่งการบำรุงต้นด้วยน้ำและปุ๋ยจะมีส่วนให้การผลิตสับปะรดข้ามปีประสบผลสำเร็จ

4. การคลุมผลสับปะรด

การคลุมผลสับปะรดมีจุดประสงค์เพื่อป้องกันแดดเผาผลสับปะรดเพราะจะทำให้เนื้อในผลฝ่อ การคลุมผลสามารถ ทำได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับความสะดวกของเกษตรกร สามารถเลือกได้ 3 วิธีดังนี้

1) การใช้หญ้าหรือฟางข้าวพันรอบบริเวณตอนบนของผลวิธีนี้เกษตรกรนิยมกันมากเพราะได้ผลดีและสะดวก ใช้แรงงานไม่มาก หญ้าที่ใช้พันนั้นส่วนใหญ่นิยมใช้หญ้าคาเพราะมีใบยาวสะดวกในการพันและคงทนอยู่ได้นาน

2) ใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ทำเป็นถุงโดยเย็บถุงกระดาษให้เป็นรูปทรงกระบอกหัวท้ายเปิด แล้วเอาไปสวมผลไว้ กระดาษที่มีความคงทนจะป้องกันแดดเผาได้ดีมาก แต่ส่วนมากกระดาษจะขาดเมื่อถูกน้ำฝนและลมพัด

3) ใช้ใบสับปะรดซึ่งอยู่รอบ ๆ ผลหุ้มโดยมัดปลายใบเข้าหากันวิธีนี้ป้องกันแดดเผาได้ดีแต่ค่อนข้างจะเปลืองแรงงาน

5. การควบคุมวัชพืช

หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีสังเคราะห์ทุกชนิดในการควบคุมวัชพืช แนะนำให้ควบคุมวัชพืชโดยวิธีกล เช่น การเตรียมดินที่เหมาะสม การใช้วัสดุคลุมดินการถอนต้นด้วยมือ วิธีเขตกรรมต่างๆ การใช้เครื่องมือรวมทั้งการปลูกพืชหมุนเวียนหรือพืชตระกูลถั่วคลุมดิน

6. การป้องกันกำจัดโรค แมลงศัตรูพืช และวัชพืช

แมลงศัตรูพืชที่สำคัญและการป้องกันกำจัดระหว่างปลูกสับปะรด สับปะรดเป็นพืชที่มีแมลงศัตรูสำคัญดังนี้

1) เพลี้ยแป้ง

เป็นแมลงศัตรูสับปะรดที่สำคัญมาก จะทำความเสียหายโดยการดูดกินน้ำเลี้ยงจากส่วนต่าง ๆ ของต้นสับปะรดโดยเฉพาะบริเวณกาบใบลำต้น ช่อดอกและผล ทำให้ต้นเจริญเติบโตช้ากว่าที่ควรและเพลี้ยแป้งจะติดอยู่ที่ผลด้วย ทำให้มีปัญหาในด้านการยอมรับของผลสด และมีมดดำเป็น พาหะที่นำไวรัสโรคเหี่ยวเฉา ดังนั้นจะต้องกำจัดรังมดภายในแปลงโดยวิธีการทางธรรมชาติก่อน การเพาะปลูกและต้องระมัดระวังไม่ให้มีเพลี้ยแป้งติดมากับหน่อพันธุ์ โดยการคัดเลือกพันธุ์ที่ดี

2) ไร

ไรทำความเสียหายให้กับหน่อ ต้นที่อยู่ระยะออกดอกและผล โดยไรอาศัยอยู่ตามโคนใบถ้าเข้าทำลายในระยะผลกำลังเริ่มเจริญเติบโตอาจทำให้เนื้อเยื่อรอบผลย่อยเป็นรอยสีน้ำตาลขรุขระเหมือนอาการของผลขาดโบรอน อาจกำจัดได้โดยการใช้สารไพรีทรอยธรรมชาติฉีดพ่น

3) เพลี้ยไฟ

เพลี้ยไฟจะเข้าทำลายที่ผลจะทำให้เกิดรอยแผลสีน้ำตาลและผลมีรูปร่างผิดปกติ เพลี้ยไฟจะระบาดได้มากในสภาพอากาศแห้งแล้ง อาจกำจัดได้โดยการใช้สารไพรทรอยที่ได้จากธรรมชาติมาฉีดพ่นในเวลาเย็นหรือเวลา เช้าก่อนแสงแดดจัด

4) เพลี้ยหอย

เพลี้ยหอยทำความเสียหายโดยการดูดกินน้ำเลี้ยงที่ใบทำให้ต้นสับปะรดอ่อนแอ มักระบาดในช่วงที่มีสภาพอากาศร้อนแห้งแล้ง เพลี้ยหอยมักชอบอาศัยอยู่ตามใบที่ไม่ถูกแสงแดดโดยตรงมากนัก การกำจัดเช่นเดียวกันกับการกำจัดเพลี้ยไฟ คือการใช้สารจากธรรมชาติ เช่น สารไพรีทรอยในการฉีดพ่น

ดังนั้น แนวทางหรือวิธรการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช ในระบบเกษตรอินทรีย์สามารถเลือกปฏิบัติได้ ความเหมาะสมดังนี้

1) ไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์ในการป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูสับปะรด

2) การจัดการทางด้านเขตกรรม เช่น การเตรียมแปลงกำหนดช่วงเวลาปลูกที่เหมาะสมการปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อตัดวงจรการระบาดของโรคและแมลงศัตรูสับปะรด การเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินและสมดุลของธาตุอาหารพืช การจัดน้ำเพื่อให้ต้นสับปะรดเจริญเติบโตดี สมบูรณ์และแข็งแรง สามารถลดการทำลายของโรคแมลงศัตรูสับปะรดได้ส่วนหนึ่ง

3) การจัดการสภาพแวดล้อมไม่ให้เหมาะสม กับการระบาดของโรคและแมลง ศัตรูสับปะรด เช่น การกำจัดวัชพืช การกำจัดเศษซากพืชที่เป็นโรคโดยใช้ปูนขาว หรือกำมะถันผงที่ไม่ผ่านกระบวนการทางเคมี และควรปรับสภาพดินไม่ให้เหมาะสมกับการระบาดของโรค

4) การควบคุมความสมดุลระบบนิเวศน์ของสิ่งมีชีวิตทางธรรมชาติ โดยส่งเสริมการแพร่ขยายปริมาณของแมลงที่มีประโยชน์ต่อพืช เช่น ตัวห้ำ ตัวเบียน และศัตรูธรรมชาติเพื่อช่วยควบคุมแมลงศัตรูสับปะรด

5) การใช้สารสกัดจากพืช เช่น สะเดา ข่า ตะไคร้หอม ใบแคฝรั่ง ฯลฯ ในการกำจัดแมลง

6) ใช้วิธีกล เช่น ใช้แสงไฟล่อ

ศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูสับปะรดที่สำคัญ และพบทั่วไปในไร่สับปะรด มีเพียงชนิดเดียว คือ ด้วงเต่า ตัวเต็มวัยมีขนาดยาว 4.0-4.5 มิลลิเมตรลำตัวด้านบนนูน โค้งสีดำ ด้านล่างแบนราบ อกปล้องแรกและปลายปีกสีส้ม เพศเมียวางไข่สีเหลืองอ่อนเป็นกลุ่มบนพื้นผิวพืช ตัวหนอนมีไข่แป้งสีขาวปกคลุมคล้ายเพลี้ยแป้ง ตัวหนอนและตัวเต็มวัยของด้วงเต่าเป็นตัวห้ำ กัดกินเพลี้ยแป้งศัตรูสำคัญของสับปะรด

ดังนั้นการป้องกันกำจัดศัตรูสับปะรดควรใช้วิธีการที่ปลอดภัยตามคำแนะนำเพื่ออนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติที่เป็นประโยชน์ดังกล่าว

โรคที่สำคัญและการป้องกันกำจัดระหว่างปลูกสับปะรด

โรคของสับปะรดส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อสาเหตุโรคพืชในดินหลายชนิด ดังนั้น จำเป็นต้องมุ่งเน้นให้ความสำคัญการปรับปรุงดิน ด้วยปุ๋ยอินทรีย์ การใช้จุลินทรีย์ไตรโคเดอร์มาควบคุมโรคพืชและการระบายน้ำในแปลงปลูก ช่วยลดการระบายของโรคอย่างมาก โรคของสับปะรดที่สำคัญมีดังนี้

1) โรคยอดเน่า ต้นเน่า และรากเน่า เชื้อราชนิดนี้เป็นสาเหตุให้เกิดโรคเน่าและรากเน่าในพื้นที่เขตร้อน และสามารถเกิดกับโรคพืชหลายชนิด เช่น ทุเรียน ส้ม ยางพารา ป่า ปอแก้ว รา และพริกไทย เป็นต้น

ลักษณะอาการ ใบที่ส่วนยอดจะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีน้ำตาล อ่อนสีเหลือบสีแดงเล็กน้อย ขอบใบจะโค้งลงทางด้านล่าง เมื่อดึงใบส่วนยอด ออกใบจะหลุดติดขึ้นมาได้ง่าย เนื่องจากส่วนของโคนใบถูกทำลาย โคนใบที่เน่าจะมีกลิ่นและขอบใบเป็นสีน้ำตาล โรคส่วนใหญ่จะเข้าทำลายในสภาพดินมีความชื้นสูง

2) โรคโคนเน่าหรือหน่อเน่า เป็นเชื้อราที่พบปกติอยู่แล้วในพื้นที่ที่ปลูกสับปะรด เนื่องจากเป็นเชื้อราที่ช่วยย่อยสลายเศษซากเหลือของต้นสับปะรด

ลักษณะอาการ เป็นโรคที่เกิดกับส่วนขยายพันธุ์ ได้แก่ หน่อพันธุ์ ตะเกียง หรือจุก โดยส่วนโคนจะมีรอยแผลเน่าสีดำ เนื้อเยื่อส่วนที่อ่อนนุ่มจะถูกทำลายเหลือแต่ส่วนที่เป็นเยื่อใยที่แข็งแรงกว่า ต่อมาใบเริ่มเหี่ยวถ้าเป็นในต้นที่โตแล้วต้นจะหักที่ระดับผิวดินได้ง่าย โรคนี้อาจทำให้ต้น ใบ หรือผลเน่าได้ในสภาพที่ดินและอุณหภูมิโดยรอบมีความชื้นสูง ฉะนั้น การป้องกันโดยการรวบรวมหน่อพันธุ์ควรระมัดระวังไม่ใช้เกิดความบอบช้ำ และไม่ควรกองวัสดุปลูกสุมกันไว้ในแปลง ควรผึ่งตากแดดทิ้งไว้ 2-3 วัน เพื่อให้รอยแผลแห้งก่อนใช้ปลูก โดยหงายด้านรอยหักขึ้น

3) โรคเนื้อแกน เชื้อจะเข้าสู่ผลสับปะรด ตั้งแต่ระยะดอกบานและพักตัวอยู่ภายใน หรืออาจเข้าสู่ผลสับปะรด ตั้งแต่ระยะดอกบานและพักตัวอยู่ภายใน หรืออาจเข้าสู่ผลทางรอยแตกของผลในระยะใกล้เก็บเกี่ยว ซึ่งในสภาพที่มีฝนตกหลังผ่านช่วงแล้งมาแล้วระยะหนึ่ง ผลสับปะรดจะเจริญเติบโตเร็วมากจนผิวแตกเป็นแผลมีการเปลี่ยนแปลงปฏิกิริยาทางเคมีทำให้มีสภาพเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเชื้อโรคได้

ลักษณะอาการ เนื้อของสับปะรดจะเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลอ่อนจนถึงน้ำตาลเข้ม ส่วนที่เปลี่ยนมีจะมีลักษณะ แข็งเป็นไต เนื้อบริเวณรอบนอกส่วนที่เปลี่ยนสีจะมีความกรอบมากกว่าปกติ การแสดงอาการของโรคเริ่มจากส่วนกลางของผลย่อยที่อยู่ด้านล่างของผลก่อนและขยายตัวเพิ่มขึ้น อาการอาจจะอยู่เฉพาะภายในผลโดยภายนอกของผลอาจไม่แตกต่างจากสับปะรดปกติเลยทำให้ดูได้ยาก สับปะรดพันธุ์ปัตตาเวียที่ปลูกอยู่ในสภาพภูมิอากาศที่ค่อนข้างร้อนจัดและแล้งจะมีโอกาสเป็นโรคนี้ได้ง่าย

ฉะนั้น การป้องกันโรคที่ดีคือการปลูกในพื้นที่ที่เหมาะสมและมีอุณหภูมิที่พอเหมาะหรือการเตรียมดินปลูกที่ดี เพื่อลดปริมาณเชื้อในแปลงให้ลดน้อยลงและใช้สารธรรมชาติหรือสารที่อนุญาตให้ใช้ในการควบคุมโรค

4) โรครากปม เกิดจากไส้เดือนฝอยอาศัยในดินและแพร่ระบาดเข้าสู่ราก ลำต้นจะชะงักการเจริญเติบโต ใบเหลืองซีดเมื่อถอนลำต้นดูการเตรียมดินที่ดี และควรหลีกเลี่ยงการปลูกพืชที่มีแนวโน้มที่จะเพิ่มปริมาณไส้เดือนฝอย เช่น ถั่วพุ่ม เป็นต้น

ดังนั้น การป้องกันโรคของสับปะรดโดยส่วนใหญ่ดังกล่าวนี้มีหลักการป้องกันที่คล้ายกันดังนี้

1) ปรับพื้นที่แปลงปลูกให้มีการระบายน้ำได้ดี และไม่ปลูกสับปะรดในช่วงที่มีฝนตกชุก

2) ปรับสภาพความเป็นกรดเป็นด่างของดิน ให้อยู่ระหว่าง 4.5-5.5 โดยใช้กำมะถันผง

3) หลีกเลี่ยงการใช้หน่อหรือจุกสับปะรด จากแหล่งและแปลงที่มีโรคระบาด

4) จุ่มหน่อด้วยจุลินทรีย์ควบคุมโรคพืชในราไตรโคเดอร์มา

5) เก็บต้นที่เป็นโรคเผาทำลายฉีดพ่นด้วยปุ๋ยอินทรีย์น้ำความเข้มข้น 1:500-1:1,000 และฉีดพ่นหรือใส่ราพวกไตรโคเดอร์มา

การควบคุมปริมาณสารไนเตรทในสับปะรด

สารไนเตรทในสับปะรดมีผลต่อระบบการผลิตสับปะรดกระป๋องเพราะอาจทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพต่ำ เนื่องจากสารไนเตรทจะกัดกร่อนดีบุกซึ่งเคลือบกระป๋องทำให้อายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์สั้นลง โดยกระป๋องจะมีสีดำ ไม่เป็นที่ต้องการของลูกค้า และเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ดังนั้น ปริมาณไนเตรทในเนื้อสับปะรดไม่ควรเกิน 25 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ปริมาณไนเตรทจะพบมากในรากและลำต้น รองลงมาใบแผลผลตามลำดับในส่วนของผลพบมากที่แกนและเปลือก ในเนื้อพบน้อยที่สุด

ปัจจัยที่สำคัญประการหนึ่งในการลดปริมาณไนเตรทในผลสับปะรด ได้แก่ การเพิ่มธาตุอาหารเสริมหรือจุลธาตุบางชนิด ซึ่งเป็นองค์ประกอบในการลดปริมาณไนเตรท เช่น โมลิบดีนั่ม แมงกานีส แมกนีเซียม และเหล็ก การใส่ปุ๋ยอินทรีย์อัตรา 4 ตันต่อไร่ มีผลทำให้การสะสมไนเตรทในผลสับปะรดลดลงจาก 43.75 เป็น 13.75 ppm. เนื่องจากปุ๋ยอินทรีย์น้ำมีองค์ประกอบของธาตุอาหารเสริมครบทุกธาตุ

โดยธาตุ ดังกล่าวเป็นองค์ประกอบของเอนไซม์ nitrate reductase ทำให้ลดการสะสมไนเตรทในผลสับปะรด

การป้องกันการตกค้างของไนเตรท

ให้ปุ๋ยและน้ำตามคำแนะนำ ห้ามใส่ปุ๋ยไนโตรเจนหลังการบังคับออกดอกแล้ว ห้ามทำลายจุกสับปะรดในแหล่งที่เคยพบปริมาณไนเตรทตกค้างสูงในผลสับปะรด ควรเก็บตัวอย่างใบในระยะบังคับดอกวิเคราะห์ปริมาณธาตุโมลิบดีนัม ถ้าพบความเข้มข้นของธาตุต่ำกว่า 1 ส่วนในล้านส่วน ให้พ่นใบสับปะรดด้วยธาตุโมลิบดีนัม อัตรา 5 มิลลิกรัมต่อต้นในระยะดอกแดง หรือ โพแทสเซียมคลอดไรด์ อัตรา 8 กรัมต่อต้น หลังการบังคับดอกแล้ว 75 วัน

การเก็บผลผลิตสับปะรด



การเก็บผลสับปะรดให้ได้คุณภาพดีควรเก็บ 3 ครั้ง ครั้งแรกจะเก็บได้ประมาณ 20-25 เปอร์เซ็นต์ของผลทั้งหมดในแปลง ครั้งที่สองเก็บหลังจากครั้งแรกประมาณ 5 วัน จะเก็บได้ประมาณ 40-60เปอร์เซ็นต์ของที่สองประมาณ 5 วัน โดยเก็บผลที่เหลือทั้งหมด ลักษณะของผลสับปะรดที่โรงงานต้องการผลต้องไม่แก่จัดเกินไป ผลทรงกระบอก แกนเล็ก เส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ระหว่าง 4-6 นิ้ว หรือมีน้ำหนักผลอยู่ระหว่าง 0.8-3.0 กิโลกรัม ระยะเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม

สับปะรดสำหรับส่งโรงงาน

- เก็บเกี่ยวผลสับปะรดที่มีความสุขแก่ตามมาตรฐาน

ระยะเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม

สับปะรดสำหรับส่งโรงงาน

- เก็บเกี่ยวผลสับปะรดที่มีความสุขแก่ตามมาตรฐาน
- ห้ามใช้สารเคมีทุกชนิดเร่งให้สับปะรดสุกก่อนกำหนด

สับปะรดสำหรับบริโภค

- เก็บเกี่ยวเมื่อตาสับปะรดเริ่มเปิด 2-3 ตา หรือผิวเปลือกเปลี่ยนเป็นสีเหลืองประมาณ 10 เปอร์เซ็นต

วิธีการเก็บเกี่ยว

สับปะรดสำหรับส่งโรงงาน ให้ใช้มือหักผลออกจากต้นโดยไม่ต้องเหลือก้าน แล้วหักจุกออก

สับปะรดสำหรับบริโภค ใช้มีดตัดให้เหลือก้านยาวติดผลประมาณ 10 เซนติเมตร ไม่ต้องหักจุกออก

การจัดการต้นตอ

สับปะรดสามารถไว้ตอได้ 1-2 ครั้ง เมื่อเก็บเกี่ยวแล้ว ควรปฏิบัติดังนี้

- ใช้มีดตัดต้นไม้สับปะรดระดับเหนือดิน 20-30 เซนติเมตรและตัดใบให้เหลือประมาณ 10 เซนติเมตร
- ใช้ต้นและใบสับปะรดคลุมดิน เพื่อรักษาความชื้น และป้องกันการงอกของวัชพืช
- ให้ปุ๋ยและน้ำตามคำแนะนำ
- หักหน่ออากาศ หรือหน่อที่เกิดจากต้นไปใช้ขยายพันธุ์ เหลือเฉพาะหน่อดินไว้เป็นต้นตอ

แนวทางการดูแลและบำรุงรักษาต้นสับปะรด ในช่วงเดือนธันวาคม – มีนาคม

ช่วงนี้เป็นช่วงที่อากาศค่อนข้างหนาว สับปะรดบางส่วนจะออกดอกเอง ตามธรรมชาติ ซึ่งโดยปกติจะออกดอกเองตามธรรมชาติ 50-90% แล้วแต่ขนาด อายุ และความสมบูรณ์ของต้น ฉะนั้นเกษตรกรส่วนใหญ่ที่ปลูกสับปะรดด้วยหน่อจึงมักจะทำการบังคับดอกในช่วงนี้ ซึ่งกรณีนี้ทำให้ต้องเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงที่สับปะรดออกมาก ทำให้ขายผลผลิตได้ในราคาค่อนข้างต่ำ และโดยทั่วไปคุณภาพสับปะรดมักต่ำ โดยมีโรคผลแกนมากกว่าฤดูอื่น ๆ จึงควรปฏิบัติดังนี้

• หลังจากบังคับดอกไปแล้ว 25-30 วัน หรือที่เรียกว่าระยะดอกแดถ้าหากต้นสับปะรดมีความสมบูรณ์น้อย ควรฉีดพ่นด้วยปุ๋ยทางสูตร 23-0-30 อัตรา 5เปอร์เซ็นต์ ต้นละ 75 ซีซี หรือถ้าไม่สามารถหาซื้อปุ๋ยสูตรดังกล่าวได้ก็ให้ใช้ปุ๋ยยูเรีย (46-0-0) ผสมกับปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์ (0-0-60) สัดส่วน 1:1 อัตรา 5 เปอร์เซ็นต์ เหมือนกัน ควรผสมธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริม ที่มีส่วนผสมของโบรอน แมกนีเซียม เหล็ก สังกะสี ลงไปด้วย เพื่อช่วยลดผลแกนและเพิ่มคุณภาพของผลผลิต แต่ไม่ควรใส่ปุ๋ยทางดินโดยเฉพาะอย่างยิ่งปุ๋ยที่มีธาตุอาหารไนโตรเจน ซึ่งอาจมีผลให้มีสารไนเตรทค้างในผลผลิตได้

• ในบริเวณพื้นที่ที่สามารถให้น้ำได้ ควรให้น้ำสม่ำเสมอและหยุดให้น้ำก่อนเก็บเกี่ยว 15-30 วัน หากเป็นพื้นที่ที่ไม่มีแหล่งน้ำควรให้น้ำสับปะรดในช่วงวิกฤติ เช่น ช่วงก่อน หรือหลังการออกดอก สัปดาห์ละ 1-2 ลิตรต่อต้น

• ในแหล่งที่เคยพบปริมาณไนเตรทตกค้างสูงในผลสับปะรดควรเก็บตัวอย่างในระยะบังคับดอก วิเคราะห์ปริมาณธาตุโมลิบดีนัม ถ้าพบความเข้มข้นของธาตุต่ำกว่า 1 ส่วนในล้านส่วน ให้พ่นใบสับปะรดด้วยธาตุโมลิบดีนัม อัตรา 5 มิลลิกรัมต่อต้นในระยะดอกแดง หรือ ปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์ (0-0-60) อัตรา 8 กรัม ต่อต้น หลังบังคับดอกแล้ว 75 วัน

• ห้ามทำลายจุกสับปะรดเพื่อป้องกันการตกค้างของสารไนเตรท

• หลังบังคับดอกไปแล้ว 90 วัน เพื่อป้องกันโรคผลแกนและผลสับปะรดเสียหายจากแดดเผา ควรดำเนินการดังนี้

- ป้องกันโรคผลแกน ให้พ่นปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์ (0-0-60) อัตรา 1 กิโลกรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หลังบังคับดอก 90-105 วันและควบคุมผลเพื่อลดอุณหภูมิภายในผล

- ป้องกันแดดเผาผล ให้คลุมผลเพื่อลดอุณหภูมิภายในผลและป้องกันแดดเผา โดยใช้วัสดุ เช่น กระดาษหนังสือพิมพ์ กระดาษถุงปูน ถุงพลาสติกสีขุ่น ฟางข้าว หญ้าคา หญ้าแฝก เป็นต้น การป้องกันโรคผลแกน การปลูกสับปะรดในระบบหนาแน่นสูง เช่น แถวคู่ สามแถว หรือสี่แถว (ไม่ควรเกิน 12,000 ต้นต่อไร่) จะทำให้อุณหภูมิในแปลงสับปะรดภายใต้ทรงพุ่มสับปะรดมีแนวโน้มต่ำลงและมีความชื้นเพิ่มขึ้น เนื่องจากผลการค้นคว้าวิจัยพบว่าสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะในเรื่องของอุณหภูมิและความชื้นอากาศมีส่วนสัมพันธ์กับการเกิดผลแกน

การขนส่ง

• หลังเก็บเกี่ยว ควรส่งโรงงานหรือผู้รับซื้อภายใน 2 วัน

• รถบรรทุกสับปะรดต้องสะอาด และเหมาะสมกับปริมาณสับปะรดไม่ควรใช้รถที่ใช้บรรทุกดิน สัตว์ มูลสัตว์ ปุ๋ย สารเคมี เพราะอาจมีการปนเปื้อนยกเว้นจะมีการทำความสะอาดอย่างเหมาะสม ก่อนนำมาบรรทุกสับปะรด

• จัดเรียงผลสับปะรดให้ด้านจุกลงข้างล่าง เพื่อให้รับน้ำหนักและป้องกันผลช้ำ

การจัดการดินหลังเก็บเกี่ยว

การจัดการต้นตอหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตโดยสับปะรดนั้นสามารถไว้ตอได้ 1-2 ครั้ง เมื่อเก็บเกี่ยวแล้วให้ใช้มีดตัดต้นสับปะรดระดับเหนือ 20-30 เซนติเมตร และตัดใบให้เหลือประมาณ 10 เซนติเมตร หลังจากการผลผลิตหมดแล้ว เศษใบที่ตัดออกสามารถปกคลุมป้องกันวัชพืชและการสูญเสียความชื้นในดินได้เป็นอย่างดี

เศษซากสับปะรดทุกส่วนที่เหลือในแปลงได้แก่ เศษซากสับปะรดสามารถตีปั่นและไถกลบลงในดินเป็นการเพิ่มอินทรียวัตถุให้กับดินเช่นพื้นที่ปลูกสับปะรดในจังหวัดระยอง จากเดิมมีปริมาณอินทรียวัตถุในดินไม่ถึง 0.1 เปอร์เซ็นต์ (สภาพดินค่อนข้างเป็นทราย) แต่ภายหลังจากปลูกสับปะรดและไถกลบเศษซากที่เหลือในช่วงที่รื้อแปลงปลูกใหม่ (3 ปีต่อครั้ง) เพียงกี่ปลูกสับปะรดใหม่ในรอบที่ 2 (ปีที่4) พบว่าโครงสร้างของดินร่วนซุย อุ้มน้ำดี และสับปะรดเติบโตได้ดีมาก โดยไม่พบการระบาดโรคเน่าของสับปะรด และในปีที่ 6 (รื้อแปลงครั้งที่ 2)พบว่ามีประมาณอินทรียวัตถุในดินมากขึ้นถึง 3.5 เปอร์เซ็นต์ เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายและสะดวกในการจัดการ

ดังนั้นเกษตรกรที่ต้องการลดปัญหาในการทำไร่ สับปะรดปรับปรุงบำรุงดินด้วยการเพิ่มอินทรียวัตถุในแปลงสับปะรดในรูปของปุ๋ยอินทรีย์ชนิดต่าง ๆ เนื่องจากอินทรียวัตถุมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการควบคุมสมบัติทางกายภาพ ชีวภาพและเคมีของดิน ช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ที่ประโยชน์ในดิน ทำให้สามารถควบคุมหรือทำลายเชื้อโรคพืชในดินได้ และเพิ่มความเป็นประโยชน์ของแร่ธาตุในดินด้วย

เรียบเรียงโดย

เกตุอร ทองเครือ กลุ่มสื่อส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร

จัดทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดย

ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร
สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี
กรมส่งเสริมการเกษตร
โทร. 0-2579-5517