

Life & Work OS / Giúp Cy

17.05.02

Báo cáo kết quả chi tiết từng câu

HỌC SINH

Bùi Nguyên Khánh

ĐIỂM

3.75/11.25

ĐÚNG / ĐÃ CHẤM

11/27

THỜI GIAN NỘP

18:27:22 17/5/2026

Phần I

Câu 1

Sai

single_choice

0/0.25 điểm

NỘI DUNG CÂU HỎI

Insulin là hoocmon của cơ thể có tác dụng điều tiết lượng đường trong máu. Thủy phân một phần insulin thu được heptapeptide (X). Khi thủy phân không hoàn toàn X thu được hỗn hợp các peptide trong đó có các peptide sau: Ser-His-Leu; Val-Glu-Ala; His-Leu-Val; Gly-Ser-His. Nếu đánh số amino acid đầu N trong X là số 1 thì amino acid Glu sẽ ở vị trí số

ĐÁP ÁN ĐÚNG

D

ĐÁP ÁN HỌC SINH CHỌN

B

Phần I

Câu 2

Đúng

single_choice

0.25/0.25 điểm

NỘI DUNG CÂU HỎI

Trong y học, dung dịch glucose 5% (G-5) là dịch truyền tĩnh mạch cho những trường hợp bệnh nhân thiếu nước và năng lượng theo chỉ định của bác sĩ. Một chai chứa 500 gam dịch truyền G-5 cung cấp được tối đa m (kJ) năng lượng. Giá trị của m là (Biết 1 gam glucose có thể cung cấp 10 kJ năng lượng).

ĐÁP ÁN ĐÚNG

B

ĐÁP ÁN HỌC SINH CHỌN

B

Phần I

Câu 3

Đúng

single_choice

0.25/0.25 điểm

NỘI DUNG CÂU HỎI

Polypropylene (PP) là chất dẻo thường được sử dụng để sản xuất các sản phẩm thiết bị y tế, đồ gia dụng... PP được tổng hợp từ monomer nào sau đây?

ĐÁP ÁN ĐÚNG

A

ĐÁP ÁN HỌC SINH CHỌN

A

Phần I

Câu 4

Đúng

single_choice

0.25/0.25 điểm

NỘI DUNG CÂU HỎI

Cho bảng giá trị thế điện cực chuẩn của các cặp oxi hóa - khử như sau:

Cặp oxi hóa khử | Fe^{2+}/Fe | Cu^{2+}/Cu | Zn^{2+}/Zn | Ag^{+}/Ag

Thế điện cực chuẩn (V) | -0,44 | +0,34 | -0,76 | +0,80

Pin Galvani thiết lập từ hai cặp oxi hóa - khử nào trong số các cặp trên có sức điện động chuẩn bằng 0,78V?

ĐÁP ÁN ĐÚNG

B

ĐÁP ÁN HỌC SINH CHỌN

B

Phần I

Câu 5




Đúng

single_choice

0.25/0.25 điểm

NỘI DUNG CÂU HỎI

Cho các phản ứng thuận nghịch đang ở trạng thái cân bằng:



Yếu tố áp suất không ảnh hưởng đến chuyển dịch cân bằng của phản ứng thuận nghịch nào?

ĐÁP ÁN ĐÚNG

A

ĐÁP ÁN HỌC SINH CHỌN

A

Phần I

Câu 6

Sai

single_choice

0/0.25 điểm

NỘI DUNG CÂU HỎI

Chất nào sau đây thuộc loại disaccharide?

ĐÁP ÁN ĐÚNG

A

ĐÁP ÁN HỌC SINH CHỌN

D

Phần I

Câu 7

Sai

single_choice

0/0.25 điểm

NỘI DUNG CÂU HỎI

Có 4 dung dịch NH_3 , HCl , NH_4Cl , Na_2CO_3 cùng nồng độ được đánh ngẫu nhiên là A, B, C, D. Giá trị pH và khả năng dẫn điện của dung dịch theo bảng sau:

Dung dịch | A | B | C | D

pH | 5,25 | 11,53 | 1,25 | 11,00

Khả năng dẫn điện | Tốt | Tốt | Tốt | Kém

Các dung dịch A, B, C, D lần lượt là

ĐÁP ÁN ĐÚNG

B

ĐÁP ÁN HỌC SINH CHỌN

A

Phần I

Câu 8

Sai

single_choice

0/0.25 điểm

NỘI DUNG CÂU HỎI

Ngâm hoa quả làm siro thuộc loại tách biệt và tinh chế nào?

ĐÁP ÁN ĐÚNG

D

ĐÁP ÁN HỌC SINH CHỌN

A

Phần I

Câu 9

Sai

single_choice

0/0.25 điểm

NỘI DUNG CÂU HỎI

Chất X được tạo thành trong cây xanh nhờ quá trình quang hợp. Thủy phân hoàn toàn X (xúc tác acid) thu được chất Y. Chất Y có nhiều trong quả nho chín nên còn được gọi là đường nho. Hai chất X và Y lần lượt là

ĐÁP ÁN ĐÚNG

A

ĐÁP ÁN HỌC SINH CHỌN

C

Phần I

Câu 10

Sai

single_choice

0/0.25 điểm

NỘI DUNG CÂU HỎI

Tên gọi theo danh pháp thay thế của chất có công thức cấu tạo $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{NH}_2$ là

ĐÁP ÁN ĐÚNG

D

ĐÁP ÁN HỌC SINH CHỌN

A

Phần I

Câu 11

Sai

single_choice

0/0.25 điểm

NỘI DUNG CÂU HỎI

Trong phòng thí nghiệm, dung dịch chất nào sau đây phù hợp để kiểm tra sự có mặt của ion SO_4^{2-} (aq)?

ĐÁP ÁN ĐÚNG

C

ĐÁP ÁN HỌC SINH CHỌN

D

Phần I

Câu 12

Đúng

single_choice

0.25/0.25 điểm

NỘI DUNG CÂU HỎI

Tên gọi của $\text{CH}_3\text{COOCH}_3$ là

ĐÁP ÁN ĐÚNG

B

ĐÁP ÁN HỌC SINH CHỌN

B

Phần I

Câu 13

Đúng

single_choice

0.25/0.25 điểm

NỘI DUNG CÂU HỎI

Nguyên tố nào sau đây mà nguyên tử có 7 electron ở lớp ngoài cùng?

ĐÁP ÁN ĐÚNG

B

ĐÁP ÁN HỌC SINH CHỌN

B

Phần I

Câu 14

Đúng

single_choice

0.25/0.25 điểm

NỘI DUNG CÂU HỎI

Theo quy định, tất cả các loại chất lỏng, tinh dầu được coi là chất lỏng dễ cháy và là hàng hoá nguy hiểm nếu có điểm chớp cháy nhỏ hơn 60°C không được vận chuyển qua đường hàng không. Cho điểm chớp cháy của một số loại tinh dầu thường gặp như sau:

Tinh dầu | Trầm hương | Quế | Đinh hương | Tràm gió | Oải hương | Thông
Điểm chớp cháy (°C) | 51 | 87 | 87 | 52 | 68 | 65

Trong các tinh dầu trên, theo quy định có bao nhiêu tinh dầu hành khách được phép mang theo lên máy bay?

ĐÁP ÁN ĐÚNG

A

ĐÁP ÁN HỌC SINH CHỌN

A

Phần I

Câu 15

Đúng

single_choice

0.25/0.25 điểm

NỘI DUNG CÂU HỎI

Hợp chất nào dưới đây được sử dụng làm xà phòng?

ĐÁP ÁN ĐÚNG

C

ĐÁP ÁN HỌC SINH CHỌN

C

Phần I

Câu 16

Sai

single_choice

0/0.25 điểm

NỘI DUNG CÂU HỎI

Loại polymer nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng hợp?

ĐÁP ÁN ĐÚNG

C

ĐÁP ÁN HỌC SINH CHỌN

B

Phần I

Câu 17

Chưa chấm

single_choice

0/0.25 điểm

NỘI DUNG CÂU HỎI

Tùy thuộc vào pH của dung dịch, alanine tồn tại một số dạng như hình. Khi $\text{pH} = 3$ thì alanine sẽ tồn tại dạng nào trong các dạng trên? Cho biết pI của alanine là 6,01.

ĐÁP ÁN ĐÚNG

Chưa trả lời

ĐÁP ÁN HỌC SINH CHỌN

D

Phần I

Câu 18

Đúng

single_choice

0.25/0.25 điểm

NỘI DUNG CÂU HỎI

Hiện tượng mưa acid là do không khí bị ô nhiễm bởi các khí nào sau đây?

ĐÁP ÁN ĐÚNG

B

ĐÁP ÁN HỌC SINH CHỌN

B

Phần II

Câu 19

Sai

true_false

0/1 điểm

NỘI DUNG CÂU HỎI

Một nhóm nghiên cứu về tốc độ phản ứng đã tiến hành hai thí nghiệm với vụn đá hoa (thành phần chính là Calcium carbonate) và dung dịch hydrochloric acid.

Thí nghiệm 1: Dùng 0,5 gam vụn đá hoa và 50mL dung dịch hydrochloric acid 1M.

Thí nghiệm 2: Dùng 0,5 gam vụn đá hoa đã được nghiền nhỏ và 50mL dung dịch hydrochloric acid 1M.

Sau đó, nhóm nghiên cứu đã đo thể tích khí sinh ra theo thời gian và xây dựng đồ thị như hình.

ĐÁP ÁN ĐÚNG

a) Đúng; b) Đúng; c) Sai; d) Đúng

ĐÁP ÁN HỌC SINH CHỌN

a) Sai; b) Sai; c) Đúng; d) Sai

Phần II

Câu 20

Sai

true_false

0/1 điểm

NỘI DUNG CÂU HỎI

Theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7624 : 2007, khi chế tạo gương, chiều dày lớp bạc phủ trên bề mặt tấm kính phải đạt tối thiểu 0,7 g/m². Một công ty cần sản xuất 30 000 m² gương có độ dày lớp bạc phủ ở mức 0,75 g/m².

Để tạo ra bạc, người ta tiến hành theo sơ đồ phản ứng như hình:

Saccharose + H₂O; xt H⁺, t° → dung dịch A → trung hòa acid → dung dịch B + dd[Ag(NH₃)₂]OH, t° dư → Ag.

Biết hiệu suất cả quá trình là 75%.

ĐÁP ÁN ĐÚNG

a) Sai; b) Sai; c) Đúng; d) Sai

ĐÁP ÁN HỌC SINH CHỌN

a) Đúng; b) Sai; c) Đúng; d) Sai

Phần II

Câu 21

Đúng

true_false

1/1 điểm

NỘI DUNG CÂU HỎI

Cho sơ đồ (1) biểu diễn sự điện phân dung dịch $\text{CuSO}_4(\text{aq})$ với điện cực trơ, sơ đồ (2) biểu diễn quá trình tinh luyện đồng (Cu) bằng phương pháp điện phân. Trong sơ đồ (2), các khối đồng có độ tinh khiết thấp được gắn với một điện cực của nguồn điện, các thanh đồng mỏng có độ tinh khiết cao được gắn với một điện cực của nguồn điện. Dung dịch điện phân là dung dịch CuSO_4 .

ĐÁP ÁN ĐÚNG

a) Sai; b) Sai; c) Đúng; d) Đúng

ĐÁP ÁN HỌC SINH CHỌN

a) Sai; b) Sai; c) Đúng; d) Đúng

Phần II

Câu 22

Sai

true_false

0/1 điểm

NỘI DUNG CÂU HỎI

Isopropyl myristate là một ester thường được sử dụng trong kem dưỡng da, dầu tẩy trang và sản phẩm chăm sóc tóc như một chất làm mềm, chất kết dính và chất tăng hương thơm vì khả năng thẩm thấu tốt mà không gây nhờn rít. Ester này được tạo ra từ phản ứng giữa acid béo bão hòa myristic và isopropyl alcohol. Công thức khung phân tử của isopropyl myristate như hình.

ĐÁP ÁN ĐÚNG

a) Đúng; b) Đúng; c) Sai; d) Sai

ĐÁP ÁN HỌC SINH CHỌN

a) Đúng; b) Sai; c) Sai; d) Đúng

Phần III

Câu 23

Sai

short_answer

0/0.5 điểm

NỘI DUNG CÂU HỎI

Nescafe đã sản xuất thành công lon coffee tự làm nóng. Để làm nóng coffee, chỉ cần ấn nút để trộn nguyên liệu gồm dung dịch KOH hoặc NaOH rất loãng và CaO; 250 mL coffee trong lon sẽ được hâm nóng đến khoảng 40°C. Giả sử nhiệt dung riêng của coffee là 4,18 J/g.K. Cho $\Delta_f H^\circ_{298}$ (kJ.mol⁻¹) của CaO, H₂O(l), Ca(OH)₂ lần lượt là -635; -286; -985. Nhiệt tỏa ra từ phản ứng thất thoát vào sản phẩm, vỏ hộp và môi trường là 20%. Tính khối lượng CaO theo gam cần cung cấp để làm nóng 250 mL coffee từ 10°C đến 40°C (d = 1,0 g/ml). Làm tròn đến hàng đơn vị.

ĐÁP ÁN ĐÚNG

34

ĐÁP ÁN HỌC SINH CHỌN

Chưa trả lời

Phần III

Câu 24

Sai

short_answer

0/0.5 điểm

NỘI DUNG CÂU HỎI

Các chất X, Y là các hợp chất hữu cơ (đều chứa nguyên tố oxygen trong phân tử) thỏa mãn sơ đồ như hình. Biết Y là hợp chất ở trạng thái rắn ở điều kiện thường. Phân tử khối của Y là bao nhiêu?

ĐÁP ÁN ĐÚNG

112

ĐÁP ÁN HỌC SINH CHỌN

Chưa trả lời

Phần III

Câu 25

Sai

short_answer

0/0.5 điểm

NỘI DUNG CÂU HỎI

Adrenaline là hormone dẫn truyền thần kinh chủ yếu được tiết ra bởi tuyến thượng thận. Nó đóng vai trò quan trọng trong phản ứng "chiến hoặc chạy" của cơ thể. Số lượng nhóm chức -OH thuộc loại alcohol trong chất trên là bao nhiêu?

ĐÁP ÁN ĐÚNG

1

ĐÁP ÁN HỌC SINH CHỌN

3

Phần III

Câu 26

Sai

short_answer

0/0.5 điểm

NỘI DUNG CÂU HỎI

Trong một đề tài khôi phục nước trên sao hỏa của NASA. Tiến hành sấy các mẫu Iron(II) sulfate heptahydrate ($\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$) với độ tinh khiết 99,99% với các khoảng nhiệt độ tăng dần, người ta xử lý số liệu độ giảm khối lượng của chất rắn thu được đồ thị như hình. Giá trị của y là bao nhiêu?

ĐÁP ÁN ĐÚNG

1

ĐÁP ÁN HỌC SINH CHỌN

Chưa trả lời

Phần III

Câu 27

Đúng

short_answer

0.5/0.5 điểm

NỘI DUNG CÂU HỎI

Cho các vật liệu polymer thuộc loại chất dẻo mô tả như hình. Các polymer này có thể tái chế được. Các nhận định: (1) Sáu polymer trên đều là polymer nhiệt dẻo. (2) Trong 6 polymer trên, có 4 polymer tạo từ các monomer là hydrocarbon. (3) Nhựa số 3 (PVC) là loại polymer an toàn nhất để dùng làm màng bọc thực phẩm và có thể đốt cháy tại nhà để xử lý rác thải. (4) Monomer dùng để tổng hợp HDPE, LDPE là $\text{CH}_2=\text{CH}_2$. Sắp xếp các nhận định đúng theo thứ tự tăng dần.

ĐÁP ÁN ĐÚNG

124

ĐÁP ÁN HỌC SINH CHỌN

124

Phần III

Câu 28

Sai

short_answer

0/0.5 điểm

NỘI DUNG CÂU HỎI

Các kim loại X, Y, Z, T được đánh số thứ tự lần lượt từ 1 đến 4. Cho các pin điện hoá và sức điện động chuẩn tương ứng:

Pin điện hóa | X-Y | T-X | Z-X

Sức điện động chuẩn (V) | 0,32 | 0,46 | 1,24

Sắp xếp các kim loại theo chiều giảm dần tính khử từ trái sang phải thành một bộ 4 số.

ĐÁP ÁN ĐÚNG

3412

ĐÁP ÁN HỌC SINH CHỌN

Chưa trả lời

HỌC SINH

test 1

ĐIỂM

0/11.25

ĐÚNG / ĐÃ CHẤM

0/27

THỜI GIAN NỘP

06:24:02 17/5/2026

Phần I

Câu 1

Sai

single_choice

0/0.25 điểm

NỘI DUNG CÂU HỎI

Insulin là hoocmon của cơ thể có tác dụng điều tiết lượng đường trong máu. Thủy phân một phần insulin thu được heptapeptide (X). Khi thủy phân không hoàn toàn X thu được hỗn hợp các peptide trong đó có các peptide sau: Ser-His-Leu; Val-Glu-Ala; His-Leu-Val; Gly-Ser-His. Nếu đánh số amino acid đầu N trong X là số 1 thì amino acid Glu sẽ ở vị trí số

ĐÁP ÁN ĐÚNG

D

ĐÁP ÁN HỌC SINH CHỌN

B

Phần I

Câu 2

Sai

single_choice

0/0.25 điểm

NỘI DUNG CÂU HỎI

Trong y học, dung dịch glucose 5% (G-5) là dịch truyền tĩnh mạch cho những trường hợp bệnh nhân thiếu nước và năng lượng theo chỉ định của bác sĩ. Một chai chứa 500 gam dịch truyền G-5 cung cấp được tối đa m (kJ) năng lượng. Giá trị của m là (Biết 1 gam glucose có thể cung cấp 10 kJ năng lượng).

ĐÁP ÁN ĐÚNG

B

ĐÁP ÁN HỌC SINH CHỌN

D

Phần I

Câu 3

Sai

single_choice

0/0.25 điểm

NỘI DUNG CÂU HỎI

Polypropylene (PP) là chất dẻo thường được sử dụng để sản xuất các sản phẩm thiết bị y tế, đồ gia dụng... PP được tổng hợp từ monomer nào sau đây?

ĐÁP ÁN ĐÚNG

A

ĐÁP ÁN HỌC SINH CHỌN

B

Phần I

Câu 4

Sai

single_choice

0/0.25 điểm

NỘI DUNG CÂU HỎI

Cho bảng giá trị thế điện cực chuẩn của các cặp oxi hóa - khử như sau:

Cặp oxi hóa khử | Fe^{2+}/Fe | Cu^{2+}/Cu | Zn^{2+}/Zn | Ag^{+}/Ag

Thế điện cực chuẩn (V) | -0,44 | +0,34 | -0,76 | +0,80

Pin Galvani thiết lập từ hai cặp oxi hóa - khử nào trong số các cặp trên có sức điện động chuẩn bằng 0,78V?

ĐÁP ÁN ĐÚNG

B

ĐÁP ÁN HỌC SINH CHỌN

Chưa trả lời

Phần I

Câu 5




Sai

single_choice

0/0.25 điểm

NỘI DUNG CÂU HỎI

Cho các phản ứng thuận nghịch đang ở trạng thái cân bằng:



Yếu tố áp suất không ảnh hưởng đến chuyển dịch cân bằng của phản ứng thuận nghịch nào?

ĐÁP ÁN ĐÚNG

A

ĐÁP ÁN HỌC SINH CHỌN

Chưa trả lời

Phần I

Câu 6

Sai

single_choice

0/0.25 điểm

NỘI DUNG CÂU HỎI

Chất nào sau đây thuộc loại disaccharide?

ĐÁP ÁN ĐÚNG

A

ĐÁP ÁN HỌC SINH CHỌN

Chưa trả lời

Phần I

Câu 7

Sai

single_choice

0/0.25 điểm

NỘI DUNG CÂU HỎI

Có 4 dung dịch NH_3 , HCl , NH_4Cl , Na_2CO_3 cùng nồng độ được đánh ngẫu nhiên là A, B, C, D. Giá trị pH và khả năng dẫn điện của dung dịch theo bảng sau:

Dung dịch | A | B | C | D

pH | 5,25 | 11,53 | 1,25 | 11,00

Khả năng dẫn điện | Tốt | Tốt | Tốt | Kém

Các dung dịch A, B, C, D lần lượt là

ĐÁP ÁN ĐÚNG

B

ĐÁP ÁN HỌC SINH CHỌN

Chưa trả lời

Phần I

Câu 8

Sai

single_choice

0/0.25 điểm

NỘI DUNG CÂU HỎI

Ngâm hoa quả làm siro thuộc loại tách biệt và tinh chế nào?

ĐÁP ÁN ĐÚNG

D

ĐÁP ÁN HỌC SINH CHỌN

Chưa trả lời

Phần I

Câu 9

Sai

single_choice

0/0.25 điểm

NỘI DUNG CÂU HỎI

Chất X được tạo thành trong cây xanh nhờ quá trình quang hợp. Thủy phân hoàn toàn X (xúc tác acid) thu được chất Y. Chất Y có nhiều trong quả nho chín nên còn được gọi là đường nho. Hai chất X và Y lần lượt là

ĐÁP ÁN ĐÚNG

A

ĐÁP ÁN HỌC SINH CHỌN

Chưa trả lời

Phần I

Câu 10

Sai

single_choice

0/0.25 điểm

NỘI DUNG CÂU HỎI

Tên gọi theo danh pháp thay thế của chất có công thức cấu tạo $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{NH}_2$ là

ĐÁP ÁN ĐÚNG

D

ĐÁP ÁN HỌC SINH CHỌN

Chưa trả lời

Phần I

Câu 11

Sai

single_choice

0/0.25 điểm

NỘI DUNG CÂU HỎI

Trong phòng thí nghiệm, dung dịch chất nào sau đây phù hợp để kiểm tra sự có mặt của ion SO_4^{2-} (aq)?

ĐÁP ÁN ĐÚNG

C

ĐÁP ÁN HỌC SINH CHỌN

Chưa trả lời

Phần I

Câu 12

Sai

single_choice

0/0.25 điểm

NỘI DUNG CÂU HỎI

Tên gọi của $\text{CH}_3\text{COOCH}_3$ là

ĐÁP ÁN ĐÚNG

B

ĐÁP ÁN HỌC SINH CHỌN

Chưa trả lời

Phần I

Câu 13

Sai

single_choice

0/0.25 điểm

NỘI DUNG CÂU HỎI

Nguyên tố nào sau đây mà nguyên tử có 7 electron ở lớp ngoài cùng?

ĐÁP ÁN ĐÚNG

B

ĐÁP ÁN HỌC SINH CHỌN

Chưa trả lời

Phần I

Câu 14

Sai

single_choice

0/0.25 điểm

NỘI DUNG CÂU HỎI

Theo quy định, tất cả các loại chất lỏng, tinh dầu được coi là chất lỏng dễ cháy và là hàng hoá nguy hiểm nếu có điểm chớp cháy nhỏ hơn 60°C không được vận chuyển qua đường hàng không. Cho điểm chớp cháy của một số loại tinh dầu thường gặp như sau:

Tinh dầu | Trầm hương | Quế | Đinh hương | Tràm gió | Oải hương | Thông
Điểm chớp cháy (°C) | 51 | 87 | 87 | 52 | 68 | 65

Trong các tinh dầu trên, theo quy định có bao nhiêu tinh dầu hành khách được phép mang theo lên máy bay?

ĐÁP ÁN ĐÚNG

A

ĐÁP ÁN HỌC SINH CHỌN

Chưa trả lời

Phần I

Câu 15

Sai

single_choice

0/0.25 điểm

NỘI DUNG CÂU HỎI

Hợp chất nào dưới đây được sử dụng làm xà phòng?

ĐÁP ÁN ĐÚNG

C

ĐÁP ÁN HỌC SINH CHỌN

Chưa trả lời

Phần I

Câu 16

Sai

single_choice

0/0.25 điểm

NỘI DUNG CÂU HỎI

Loại polymer nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng hợp?

ĐÁP ÁN ĐÚNG

C

ĐÁP ÁN HỌC SINH CHỌN

Chưa trả lời

Phần I

Câu 17

Chưa chấm

single_choice

0/0.25 điểm

NỘI DUNG CÂU HỎI

Tùy thuộc vào pH của dung dịch, alanine tồn tại một số dạng như hình. Khi pH = 3 thì alanine sẽ tồn tại dạng nào trong các dạng trên? Cho biết pI của alanine là 6,01.

ĐÁP ÁN ĐÚNG

Chưa trả lời

ĐÁP ÁN HỌC SINH CHỌN

Chưa trả lời

Phần I

Câu 18

Sai

single_choice

0/0.25 điểm

NỘI DUNG CÂU HỎI

Hiện tượng mưa acid là do không khí bị ô nhiễm bởi các khí nào sau đây?

ĐÁP ÁN ĐÚNG

B

ĐÁP ÁN HỌC SINH CHỌN

Chưa trả lời

Phần II

Câu 19

Sai

true_false

0/1 điểm

NỘI DUNG CÂU HỎI

Một nhóm nghiên cứu về tốc độ phản ứng đã tiến hành hai thí nghiệm với vụn đá hoa (thành phần chính là Calcium carbonate) và dung dịch hydrochloric acid.

Thí nghiệm 1: Dùng 0,5 gam vụn đá hoa và 50mL dung dịch hydrochloric acid 1M.

Thí nghiệm 2: Dùng 0,5 gam vụn đá hoa đã được nghiền nhỏ và 50mL dung dịch hydrochloric acid 1M.

Sau đó, nhóm nghiên cứu đã đo thể tích khí sinh ra theo thời gian và xây dựng đồ thị như hình.

ĐÁP ÁN ĐÚNG

a) Đúng; b) Đúng; c) Sai; d) Đúng

ĐÁP ÁN HỌC SINH CHỌN

Chưa trả lời

Phần II

Câu 20

Sai

true_false

0/1 điểm

NỘI DUNG CÂU HỎI

Theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7624 : 2007, khi chế tạo gương, chiều dày lớp bạc phủ trên bề mặt tấm kính phải đạt tối thiểu 0,7 g/m². Một công ty cần sản xuất 30 000 m² gương có độ dày lớp bạc phủ ở mức 0,75 g/m².

Để tạo ra bạc, người ta tiến hành theo sơ đồ phản ứng như hình:

Saccharose + H₂O; xt H⁺, t° → dung dịch A → trung hòa acid → dung dịch B + dd[Ag(NH₃)₂]OH, t° dư → Ag.

Biết hiệu suất cả quá trình là 75%.

ĐÁP ÁN ĐÚNG

a) Sai; b) Sai; c) Đúng; d) Sai

ĐÁP ÁN HỌC SINH CHỌN

Chưa trả lời

Phần II

Câu 21

Sai

true_false

0/1 điểm

NỘI DUNG CÂU HỎI

Cho sơ đồ (1) biểu diễn sự điện phân dung dịch $\text{CuSO}_4(\text{aq})$ với điện cực trơ, sơ đồ (2) biểu diễn quá trình tinh luyện đồng (Cu) bằng phương pháp điện phân. Trong sơ đồ (2), các khối đồng có độ tinh khiết thấp được gắn với một điện cực của nguồn điện, các thanh đồng mỏng có độ tinh khiết cao được gắn với một điện cực của nguồn điện. Dung dịch điện phân là dung dịch CuSO_4 .

ĐÁP ÁN ĐÚNG

a) Sai; b) Sai; c) Đúng; d) Đúng

ĐÁP ÁN HỌC SINH CHỌN

Chưa trả lời

Phần II

Câu 22

Sai

true_false

0/1 điểm

NỘI DUNG CÂU HỎI

Isopropyl myristate là một ester thường được sử dụng trong kem dưỡng da, dầu tẩy trang và sản phẩm chăm sóc tóc như một chất làm mềm, chất kết dính và chất tăng hương thơm vì khả năng thẩm thấu tốt mà không gây nhờn rít. Ester này được tạo ra từ phản ứng giữa acid béo bão hòa myristic và isopropyl alcohol. Công thức khung phân tử của isopropyl myristate như hình.

ĐÁP ÁN ĐÚNG

a) Đúng; b) Đúng; c) Sai; d) Sai

ĐÁP ÁN HỌC SINH CHỌN

Chưa trả lời

Phần III

Câu 23

Sai

short_answer

0/0.5 điểm

NỘI DUNG CÂU HỎI

Nescafe đã sản xuất thành công lon coffee tự làm nóng. Để làm nóng coffee, chỉ cần ấn nút để trộn nguyên liệu gồm dung dịch KOH hoặc NaOH rất loãng và CaO; 250 mL coffee trong lon sẽ được hâm nóng đến khoảng 40°C. Giả sử nhiệt dung riêng của coffee là 4,18 J/g.K. Cho $\Delta_f H^\circ_{298}$ (kJ.mol⁻¹) của CaO, H₂O(l), Ca(OH)₂ lần lượt là -635; -286; -985. Nhiệt tỏa ra từ phản ứng thất thoát vào sản phẩm, vỏ hộp và môi trường là 20%. Tính khối lượng CaO theo gam cần cung cấp để làm nóng 250 mL coffee từ 10°C đến 40°C (d = 1,0 g/ml). Làm tròn đến hàng đơn vị.

ĐÁP ÁN ĐÚNG

34

ĐÁP ÁN HỌC SINH CHỌN

Chưa trả lời

Phần III

Câu 24

Sai

short_answer

0/0.5 điểm

NỘI DUNG CÂU HỎI

Các chất X, Y là các hợp chất hữu cơ (đều chứa nguyên tố oxygen trong phân tử) thỏa mãn sơ đồ như hình. Biết Y là hợp chất ở trạng thái rắn ở điều kiện thường. Phân tử khối của Y là bao nhiêu?

ĐÁP ÁN ĐÚNG

112

ĐÁP ÁN HỌC SINH CHỌN

Chưa trả lời

Phần III

Câu 25

Sai

short_answer

0/0.5 điểm

NỘI DUNG CÂU HỎI

Adrenaline là hormone dẫn truyền thần kinh chủ yếu được tiết ra bởi tuyến thượng thận. Nó đóng vai trò quan trọng trong phản ứng "chiến hoặc chạy" của cơ thể. Số lượng nhóm chức -OH thuộc loại alcohol trong chất trên là bao nhiêu?

ĐÁP ÁN ĐÚNG

1

ĐÁP ÁN HỌC SINH CHỌN

Chưa trả lời

Phần III

Câu 26

Sai

short_answer

0/0.5 điểm

NỘI DUNG CÂU HỎI

Trong một đề tài khôi phục nước trên sao hỏa của NASA. Tiến hành sấy các mẫu Iron(II) sulfate heptahydrate ($\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$) với độ tinh khiết 99,99% với các khoảng nhiệt độ tăng dần, người ta xử lý số liệu độ giảm khối lượng của chất rắn thu được đồ thị như hình. Giá trị của y là bao nhiêu?

ĐÁP ÁN ĐÚNG

1

ĐÁP ÁN HỌC SINH CHỌN

Chưa trả lời

Phần III

Câu 27

Sai

short_answer

0/0.5 điểm

NỘI DUNG CÂU HỎI

Cho các vật liệu polymer thuộc loại chất dẻo mô tả như hình. Các polymer này có thể tái chế được. Các nhận định: (1) Sáu polymer trên đều là polymer nhiệt dẻo. (2) Trong 6 polymer trên, có 4 polymer tạo từ các monomer là hydrocarbon. (3) Nhựa số 3 (PVC) là loại polymer an toàn nhất để dùng làm màng bọc thực phẩm và có thể đốt cháy tại nhà để xử lý rác thải. (4) Monomer dùng để tổng hợp HDPE, LDPE là $\text{CH}_2=\text{CH}_2$. Sắp xếp các nhận định đúng theo thứ tự tăng dần.

ĐÁP ÁN ĐÚNG

124

ĐÁP ÁN HỌC SINH CHỌN

Chưa trả lời

Phần III

Câu 28

Sai

short_answer

0/0.5 điểm

NỘI DUNG CÂU HỎI

Các kim loại X, Y, Z, T được đánh số thứ tự lần lượt từ 1 đến 4. Cho các pin điện hoá và sức điện động chuẩn tương ứng:

Pin điện hóa | X-Y | T-X | Z-X

Sức điện động chuẩn (V) | 0,32 | 0,46 | 1,24

Sắp xếp các kim loại theo chiều giảm dần tính khử từ trái sang phải thành một bộ 4 số.

ĐÁP ÁN ĐÚNG

3412

ĐÁP ÁN HỌC SINH CHỌN

Chưa trả lời