

Life & Work OS / Giúp Cy

17.05.01

Báo cáo kết quả chi tiết từng câu

HỌC SINH

test01

ĐIỂM

Chưa có câu chấm tự động

ĐÚNG / ĐÃ CHẤM

0/0

THỜI GIAN NỘP

06:24:11 17/5/2026

Phần I

Câu 1

Chưa chấm

single_choice

0/0.25 điểm

NỘI DUNG CÂU HỎI

Carbohydrate là những hợp chất hữu cơ tạp chức hầu hết có công thức chung là

ĐÁP ÁN ĐÚNG

Chưa trả lời

ĐÁP ÁN HỌC SINH CHỌN

C

Phần I

Câu 2

Chưa chấm

single_choice

0/0.25 điểm

NỘI DUNG CÂU HỎI

Có bao nhiêu dipeptide mạch hở khi thủy phân hoàn toàn thu được hỗn hợp chỉ gồm glycine và alanine?

ĐÁP ÁN ĐÚNG

Chưa trả lời

ĐÁP ÁN HỌC SINH CHỌN

C

Phần I

Câu 3

Chưa chấm

single_choice

0/0.25 điểm

NỘI DUNG CÂU HỎI

Chất nào sau đây là amine bậc một?

ĐÁP ÁN ĐÚNG

Chưa trả lời

ĐÁP ÁN HỌC SINH CHỌN

Chưa trả lời

Phần I

Câu 4

Chưa chấm

single_choice

0/0.25 điểm

NỘI DUNG CÂU HỎI

Giá trị thế điện cực chuẩn của cặp oxi hoá - khử nào được quy ước bằng 0 V?

ĐÁP ÁN ĐÚNG

Chưa trả lời

ĐÁP ÁN HỌC SINH CHỌN

Chưa trả lời

Phần I

Câu 5

Chưa chấm

single_choice

0/0.25 điểm

NỘI DUNG CÂU HỎI

Cho một số tính chất: có dạng sợi (1); tan trong nước (2); tan trong nước Schweizer (3); phản ứng với nitric acid đặc (xúc tác sulfuric acid đặc) (4); tham gia phản ứng với thuốc thử Tollens (5); bị thủy phân trong dung dịch acid đun nóng (6). Các tính chất của cellulose là

ĐÁP ÁN ĐÚNG

Chưa trả lời

ĐÁP ÁN HỌC SINH CHỌN

Chưa trả lời

Phần I

Câu 6

Chưa chấm

single_choice

0/0.25 điểm

NỘI DUNG CÂU HỎI

Cho các chất sau: saccharose, glycine, acetic acid, ethyl formate, aniline. Số chất tác dụng với dung dịch NaOH trong điều kiện thích hợp là

ĐÁP ÁN ĐÚNG

Chưa trả lời

ĐÁP ÁN HỌC SINH CHỌN

Chưa trả lời

Phần I

Câu 7

Chưa chấm

single_choice

0/0.25 điểm

NỘI DUNG CÂU HỎI

Tơ nào sau đây thuộc loại tơ thiên nhiên?

ĐÁP ÁN ĐÚNG

Chưa trả lời

ĐÁP ÁN HỌC SINH CHỌN

Chưa trả lời

Phần I

Câu 8

Chưa chấm

single_choice

0/0.25 điểm

NỘI DUNG CÂU HỎI

Kí hiệu cặp oxi hoá - khử ứng với quá trình khử: $\text{Fe}^{3+} + 1\text{e} \rightleftharpoons \text{Fe}^{2+}$ là

ĐÁP ÁN ĐÚNG

Chưa trả lời

ĐÁP ÁN HỌC SINH CHỌN

Chưa trả lời

Phần I

Câu 9

Chưa chấm

single_choice

0/0.25 điểm

NỘI DUNG CÂU HỎI

Thủy phân ester X trong dung dịch acid, thu được sản phẩm gồm CH_3COOH và CH_3OH . Công thức cấu tạo của X là

ĐÁP ÁN ĐÚNG

Chưa trả lời

ĐÁP ÁN HỌC SINH CHỌN

Chưa trả lời

Phần I

Câu 10

Chưa chấm

single_choice

0/0.25 điểm

NỘI DUNG CÂU HỎI

Hợp chất nào dưới đây thuộc loại ester?

ĐÁP ÁN ĐÚNG

Chưa trả lời

ĐÁP ÁN HỌC SINH CHỌN

Chưa trả lời

Phần I

Câu 11

Chưa chấm

single_choice

0/0.25 điểm

NỘI DUNG CÂU HỎI

Hợp chất $\text{H}_2\text{NCH}_2\text{COOH}$ có tên gọi thông thường là

ĐÁP ÁN ĐÚNG

Chưa trả lời

ĐÁP ÁN HỌC SINH CHỌN

Chưa trả lời

Phần I

Câu 12

Chưa chấm

single_choice

0/0.25 điểm

NỘI DUNG CÂU HỎI

Cho biết: $E_0(\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}) = -0,440\text{V}$; $E_0(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = +0,340\text{V}$. Sức điện động chuẩn của pin điện hoá Fe - Cu là

ĐÁP ÁN ĐÚNG

Chưa trả lời

ĐÁP ÁN HỌC SINH CHỌN

Chưa trả lời

Phần I

Câu 13

Chưa chấm

single_choice

0/0.25 điểm

NỘI DUNG CÂU HỎI

Phát biểu nào sau đây là không đúng?

ĐÁP ÁN ĐÚNG

Chưa trả lời

ĐÁP ÁN HỌC SINH CHỌN

Chưa trả lời

Phần I

Câu 14

Chưa chấm

single_choice

0/0.25 điểm

NỘI DUNG CÂU HỎI

Khi nghiên cứu về carbohydrate X, nhận thấy:

- X thủy phân hoàn toàn trong dung dịch acid thu được hai sản phẩm hữu cơ.
- X không có phản ứng với thuốc thử Tollens.

Vậy X có thể là

ĐÁP ÁN ĐÚNG

Chưa trả lời

ĐÁP ÁN HỌC SINH CHỌN

Chưa trả lời

Phần I

Câu 15

Chưa chấm

single_choice

0/0.25 điểm

NỘI DUNG CÂU HỎI

Glucose là một loại monosaccharide có nhiều trong quả nho chín. Công thức phân tử của glucose là

ĐÁP ÁN ĐÚNG

Chưa trả lời

ĐÁP ÁN HỌC SINH CHỌN

Chưa trả lời

Phần I

Câu 16

Chưa chấm

single_choice

0/0.25 điểm

NỘI DUNG CÂU HỎI

Tính chất vật lý chung của chất béo là

ĐÁP ÁN ĐÚNG

Chưa trả lời

ĐÁP ÁN HỌC SINH CHỌN

Chưa trả lời

Phần I

Câu 17

Chưa chấm

single_choice

0/0.25 điểm

NỘI DUNG CÂU HỎI

Chất nào sau đây có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp tạo thành polymer?

ĐÁP ÁN ĐÚNG

Chưa trả lời

ĐÁP ÁN HỌC SINH CHỌN

Chưa trả lời

Phần I

Câu 18

Chưa chấm

single_choice

0/0.25 điểm

NỘI DUNG CÂU HỎI

Trong các chất sau đây, chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất?

ĐÁP ÁN ĐÚNG

Chưa trả lời

ĐÁP ÁN HỌC SINH CHỌN

Chưa trả lời

Phần II

Câu 19

Chưa chấm

true_false


0/1 điểm

NỘI DUNG CÂU HỎI

Trong một loại pin cúc áo được sử dụng rộng rãi trong đồng hồ và các thiết bị xảy ra phản ứng:



Cho biết các giá trị thế điện cực chuẩn:



Pin chứa 0,49 gam kẽm và có khả năng chạy được cho đến khi 80% lượng kẽm được tiêu thụ ở cường độ dòng điện là 0,03 mA. Cho $q = I.t = n(e).F$; $F = 96500 \text{ C/mol}$.

ĐÁP ÁN ĐÚNG

Chưa trả lời

ĐÁP ÁN HỌC SINH CHỌN

Chưa trả lời

Phần II

Câu 20

Chưa chấm

true_false

0/1 điểm

NỘI DUNG CÂU HỎI

Điều chế ethyl acetate trong phòng thí nghiệm được tiến hành như sau:

- Bước 1: Cho khoảng 5 mL ethanol và 5 mL acetic acid tuyệt đối vào ống nghiệm, lắc đều hỗn hợp.
- Bước 2: Thêm khoảng 2 mL dung dịch H_2SO_4 đặc, lắc nhẹ để các chất trộn đều với nhau.
- Bước 3: Đặt ống nghiệm vào cốc nước nóng khoảng $60^\circ\text{C} - 70^\circ\text{C}$ trong khoảng 5 phút, thỉnh thoảng lắc đều hỗn hợp. Sau đó lấy ống nghiệm ra khỏi cốc nước nóng, để nguội hỗn hợp rồi rót sang ống nghiệm khác chứa 10 mL dung dịch muối ăn bão hòa thì thấy chất lỏng trong ống nghiệm tách thành hai lớp, lớp trên có mùi thơm đặc trưng.

Phản ứng xảy ra trong thí nghiệm: $\text{CH}_3\text{COOH(l)} + \text{C}_2\text{H}_5\text{OH(l)} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5(\text{l}) + \text{H}_2\text{O(l)}$, $K_c = 4$.

Cho phổ IR của hai hợp chất hữu cơ trong phản ứng và bảng số sóng hấp thụ đặc trưng như hình.

ĐÁP ÁN ĐÚNG

Chưa trả lời

ĐÁP ÁN HỌC SINH CHỌN

Chưa trả lời

Phần II

Câu 21

Chưa chấm

true_false

0/1 điểm

NỘI DUNG CÂU HỎI

Tơ nylon-6,6 là loại tơ có tính dai, bền, mềm mại, óng mượt, ít thấm nước, giặt mau khô và được sử dụng để dệt vải may mặc, làm dây dù, đan lưới. Tơ nylon-6,6 được tổng hợp theo phương trình hóa học như hình.

ĐÁP ÁN ĐÚNG

Chưa trả lời

ĐÁP ÁN HỌC SINH CHỌN

Chưa trả lời

Phần II

Câu 22

Chưa chấm

true_false

0/1 điểm

NỘI DUNG CÂU HỎI

Amine thơm X (C_6H_7N), ở điều kiện thường là chất lỏng, dễ bị oxi hóa khi để ngoài không khí.

ĐÁP ÁN ĐÚNG

Chưa trả lời

ĐÁP ÁN HỌC SINH CHỌN

Chưa trả lời

Phần III

Câu 23

Chưa chấm

short_answer

0/0.5 điểm

NỘI DUNG CÂU HỎI

Indigo dye (hình 1) là một loại thuốc nhuộm màu xanh lam đậm có nguồn gốc tự nhiên từ một số loài thực vật, hoặc có thể được sản xuất tổng hợp. Phần trăm khối lượng của nguyên tố nitrogen trong phân tử Indigo dye là bao nhiêu phần trăm? Làm tròn đến hàng phần mười.

ĐÁP ÁN ĐÚNG

Chưa trả lời

ĐÁP ÁN HỌC SINH CHỌN

Chưa trả lời

Phần III

Câu 24

Chưa chấm

short_answer

0/0.5 điểm

NỘI DUNG CÂU HỎI

Poly(vinyl chloride) (PVC) được điều chế từ khí thiên nhiên theo sơ đồ như hình. Cần bao nhiêu m³ khí thiên nhiên (đo ở điều kiện chuẩn: 25°C, 1 bar) để điều chế được 450 kg PVC? Biết khí thiên nhiên chứa 92% methane về thể tích, còn lại là tạp chất trơ. Làm tròn đến hàng đơn vị.

ĐÁP ÁN ĐÚNG

Chưa trả lời

ĐÁP ÁN HỌC SINH CHỌN

Chưa trả lời

Phần III

Câu 25

Chưa chấm

short_answer

0/0.5 điểm

NỘI DUNG CÂU HỎI

Cho các cặp oxi hoá - khử và giá trị thế điện cực chuẩn tương ứng:

Cặp oxi hoá khử | Cu^{2+}/Cu | $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ | Ag^{+}/Ag

Thế điện cực chuẩn (V) | +0,34 | +0,771 | +0,799

Cho các phát biểu sau ở điều kiện chuẩn:

- (1) Ion Cu^{2+} có tính oxi hoá mạnh hơn ion Fe^{3+} .
- (2) Dãy sắp xếp theo chiều tăng dần tính khử: Ag, Cu, Fe^{2+} .
- (3) Ion Fe^{2+} khử được ion Ag^{+} thành Ag kim loại.
- (4) Ion Fe^{3+} và ion Ag^{+} đều oxi hoá được Cu thành ion Cu^{2+} .

Viết số thứ tự của các phát biểu đúng theo thứ tự tăng dần từ trái sang phải.

ĐÁP ÁN ĐÚNG

Chưa trả lời

ĐÁP ÁN HỌC SINH CHỌN

Chưa trả lời

Phần III

Câu 26

Chưa chấm

short_answer

0/0.5 điểm

NỘI DUNG CÂU HỎI

Cho các ester sau: $\text{C}_6\text{H}_5\text{COOC}_6\text{H}_5$ (phenyl benzoate); $\text{CH}_3\text{COO}-[\text{CH}_2]_2-\text{OOCCH}_2\text{CH}_3$; $\text{CH}_3\text{COOC}_6\text{H}_5$ (phenyl acetate); $\text{CH}_3\text{OOC}-\text{COOCH}_3$; $\text{HCOO}-\text{CH}_2-\text{C}_6\text{H}_5$. Số ester khi tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được alcohol là bao nhiêu?

ĐÁP ÁN ĐÚNG

Chưa trả lời

ĐÁP ÁN HỌC SINH CHỌN

Chưa trả lời

Phần III

Câu 27

Chưa chấm

short_answer

0/0.5 điểm

NỘI DUNG CÂU HỎI

Cho các phát biểu sau:

- (1) Mỡ lợn hoặc dầu dừa có thể dùng làm nguyên liệu để tái chế thành xà phòng.
 - (2) Nước ép quả nho chín có khả năng tham gia phản ứng với thuốc thử Tollens.
 - (3) Trong phân tử peptide mạch hở Gly-Ala-Gly, có 3 nguyên tử oxygen.
 - (4) Tơ nylon-6,6 và tơ nitron (hay olon) đều thuộc loại tơ polyamide.
 - (5) Aniline ($C_6H_5NH_2$) phản ứng với nước bromine tạo thành kết tủa trắng.
 - (6) Cao su lưu hóa có cấu trúc mạng lưới không gian nên đàn hồi tốt hơn cao su thường.
- Liệt kê các phát biểu đúng theo thứ tự tăng dần.

ĐÁP ÁN ĐÚNG

Chưa trả lời

ĐÁP ÁN HỌC SINH CHỌN

Chưa trả lời

Phần III

Câu 28

Chưa chấm

short_answer

0/0.5 điểm

NỘI DUNG CÂU HỎI

Dung dịch saccharose không phản ứng với thuốc thử Tollens, nhưng khi đun nóng với dung dịch acid loãng thì tạo thành dung dịch phản ứng với thuốc thử Tollens. Thủy phân hoàn toàn 0,5 mol saccharose thu được dung dịch X. X tác dụng hoàn toàn với dung dịch $AgNO_3/NH_3$ dư thu được a mol Ag. Giá trị của a là bao nhiêu?

ĐÁP ÁN ĐÚNG

Chưa trả lời

ĐÁP ÁN HỌC SINH CHỌN

Chưa trả lời