

Suche $_{hesse}matrix_x gemaess$

Die Hesse-Matrix einer zweifach differentierbaren reellwertigen Funktion $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ist wie folgt definiert:

****Definition 2.20: Hesse-Matrix****

Seien $n \in \mathbb{N}_+$ und $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ eine zweifach differentierbare reellwertige Funktion. Die Hesse-Matrix von f ist das Vektorfeld $\nabla^2 f$, definiert als:

$$\nabla^2 f := \begin{bmatrix} f_{,1,1} & f_{,1,2} & \cdots & f_{,1,n} \\ f_{,2,1} & f_{,2,2} & \cdots & f_{,2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_{,n,1} & f_{,n,2} & \cdots & f_{,n,n} \end{bmatrix}.$$

(Gleichung 2.142)

Beispiel für eine Funktion $f(x, y) := x^2 \cdot y^2$:

- Der Gradient ∇f ist:

$$\nabla f = \begin{bmatrix} 2xy^2 \\ 2x^2y \end{bmatrix}.$$

- Die Hesse-Matrix $\nabla^2 f$ ist:

$$\nabla^2 f = \begin{bmatrix} 2y^2 & 4xy \\ 4xy & 2x^2 \end{bmatrix}.$$

(Gleichung 2.145)

****Satz 2.14: Schwarz-Clairaut-Young-Satz****

Die Hesse-Matrix H einer zweifach differentierbaren Funktion f ist symmetrisch, d.h., $H^T = H$.

(Gleichung 2.146)

Dies impliziert, dass die partiellen Ableitungen vertauscht werden dürfen, also $f_{,\nu,\mu} = f_{,\mu,\nu}$ für alle $\mu, \nu \in \{1, \dots, n\}$.

(Gleichung 2.147)