

INTRAMICINE / ИНТРАМИЦИН

СЪСТАВ в 1 мл:

Активни субстанции:

Procaine Benzylpenicillin.....200 mg

Dihydrostreptomycin sulphate..... 200 000 UI

ВИДОВЕ ЖИВОТНИ ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Говеда и свине.

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

Лечение на инфекции, причинени от Грам-положителни и Грам-отрицателни бактерии, чувствителни към пеницилин/дихидрострептомицин.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Да не се прилага при установена свръхчувствителност към пеницилин.

МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Подкожно или мускулно инжектиране:

Едър рогат добитък: възрастни – 0,5 мл / 10 кг ж.т.; млади – 8 мл/ 100 кг ж.т. дневно

Свине: 1 мл / 10 кг ж.т.; над 130-150 кг – 5 мл/ 100 кг ж.т. дневно

Продължителността на лечение е 3 дни.

Хомогенизирайте суспензията преди употреба!

КАРЕНТЕН СРОК

Месо: 30 дни;

Мляко: 4 дни (8 издожавания)

Специални предпазни мерки за употреба за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните

Хора със свръхчувствителност към пеницилини не бива да работят с продукта.

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Съхранявайте при температура до 25⁰ C, на тъмно.

Срок на годност след отваряне на флакона: 28 дни.

Флакони по 50 мл, 100 мл и 250 мл.

Производител и притежател на лиценза за употреба: Ceva Sante Animale, 10 av. de la Balastiere 33501, Libourne, France