

## ЕНДЕКТОВЕТ таблетки за кучета

### 1. ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ

Прижател на лиценза за употреба и производител отговорен за осакотяване на партидата:

„БИОВЕТ“ АД

ул. „Петър Раков“ № 39

Пещера 4550

Република България

### 2. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ ЕНДЕКТОВЕТ таблетки за кучета

### 3. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ

Активна субстанция:

Doramectin 0,125 mg; Doramectin 0,250 mg;

Doramectin 1,250 mg

Експципиенти:

Лактоза монохидрат; Пшенично нишесте;

Микрокристална целулоза; Хидроксипропил

целулоза; Магнезиев стеарат; Силициев

диоксид колоидален; Талк; Коригент с аромат

на месо

### 4. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

За контрол на диروفилариоза чрез елиминиране на микрофилариите на сърдечния нематод *Dirofilaria immitis*.

### 5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Продуктът е противопоказан при кученца под 1,5 месечна възраст.

### 6. НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ

Някои кучета от породите Коли, Шелти и Бобтейл са чувствителни към авермектините, в сравнение с кучетата от другите породи, поради вродена непоносимост (идиосинкразия). При кучетата с идиосинкразна интоксикация, клиничните симптоми се изразяват в мидриаза, атаксия, слепота, депресия, обилна саливация, мускулен тремор и др. В тези случаи, може да

LFB1643v2Endect.tbl.all-BG0219

бъде проведено следното лечение: венозно въвеждане на електролитни разтвори; бавно венозно въвеждане на физостигмин в доза 0,06 mg/kg т.м., през 12 часа; при анафилактична реакция се прилагат антихистаминни продукти; при възбудни реакции се прилагат венозно фенобарбитал 2-4 mg/kg т.м. или пентобарбитал 2-30 mg/kg т.м.; прави се промивка на стомаха със затоплена вода или заедно с активен въглен (1-5 g/kg т.м. в 15-30 ml вода), след 30 минути се прилагат осмотични или солеви очистителни.

### 7. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП Кучета

### 8. ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ

Начин на приложение:

Вътрешно, дълбоко върху основата на езика или с атрактивна храна (колбас, сирене и др.).

Дозировка:

Релативна доза - 0,025 mg/kg т.м.

Телесна маса, kg	Тегло на таблетката, mg	Съдържание на дорамектин в таблетка, m	Честота на прилагане
5	50	0,125	ежемесечно
10	100	0,250	ежемесечно
50	500	1,250	ежемесечно

При кучета с телесна маса, различна от посочената в таблицата може да бъде приложена подходяща комбинация от таблетки. Ендектовет таблетки трябва да бъдат прилагани ежемесечно, един месец преди и един месец след летежа на комарите (вектори), пренасящи инвазиоспособните микрофиларии на *Dirofilaria immitis*. Ако интервалът между двете прилагания на продукта е повече от 30 дни, ефикасността на дорамектина може да се намали. За оптимизиране действието на продукта, таблетките трябва да се прилагат в един и същи ден от месеца.

Когато кучето е приемало други продукти за контрол на диروفиларията, прилагането на Ендектовет таблетки трябва да бъде не по-рано от един месец след последното третиране.

## 9. СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

### 10. КАРЕНТЕН СРОК

Не е приложимо.

### 11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Да се съхранява при температура под 30°C.

Да се пази от пряка слънчева светлина.

### 12. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Специални предупреждения за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП

С внимание трябва да се избягват следните практики, тъй като те увеличават риска от развитие на резистентност и в крайна сметка могат да доведат до неефективна терапия:

- Прекалено често и повтарящо се използване на антихелминтици от един и същи клас за продължителен период от време;
- Използване на дози под препоръчаните в резултат на неточно определяне на телесната маса на животното, неправилно прилагане на ветеринарномедицинския продукт или некалибриране на дозиращото устройство (ако се използва такова).

При съмнение за възникване на резистентност към антихелминтни средства трябва да се направят допълнителни изследвания чрез прилагане на подходящи методи (например, тест за редуциране на броя на яйцата във фекалиите). В случаите, когато резултатите от тези тестове убедително доказват наличието на резистентност, трябва да се пристъпи към използване на антихелминтик, принадлежащ към друг фармакологичен клас, който има различен начин на действие.

Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта

Не е приложимо.

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните

При прилагане на продукта да не се яде, пие или пуши. След прилагане ръцете да се измият с вода и сапун.

Бременност и лактация

Може да се прилага по време на бременност.

Взаимодействие с други

ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие

Не са известни.

Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти)

Дорамектинът, приложен в препоръчаната доза и в доза 5 пъти по-висока от препоръчаната, се понася добре от кучетата.

Основни несъвместимости

Не са известни.

### 13. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

ВМП не трябва да бъдат изхвърляни чрез битови отпадъци или отпадни води.

Попитайте Вашия ветеринарен лекар какво да правите с ненужните ВМП. Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда.

### 14. ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА

11/2018

### 15. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Продуктът се предлага в картонена кутия с 1 или 2 блистера по 4 броя таблетки всеки.

Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара.

За всяка информация относно този ветеринарномедицински продукт, моля свържете се с териториалния представител на притежателя на лиценза за употреба.

