

## **ЛИСТОВКА ЗА:**

**МЕТАМИЗОЛ НАТРИЙ 30% инжекционен разтвор 100 ml**  
**METAMIZOLE SODIUM 30% solutio pro injectionibus 100 ml**

За говеда, коне, свине, кучета и котки

### **1. ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ**

ВЕТПРОМ АД, 2400 гр. Радомир, България, ул. "Отец Паисий" № 26

тел.: 0777/8-24-93, 8-02-68; факс: 0777/8-23-91

E-mail: [vetprom@abv.bg](mailto:vetprom@abv.bg)

### **2. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ**

МЕТАМИЗОЛ НАТРИЙ 30% инжекционен разтвор

METAMIZOLE SODIUM – 30% solutio pro injectionibus

### **3. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И ЕКСЦИПИЕНТА**

Metamizole sodium 0.3 g/ 1 ml

Вода за инжекции до 1 ml

### **4. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ**

Болкоуспокояващо, температуропонижаващо и противовъзпалително средство. При спастични състояния на предстомашията, при катарално–спазматична колика метеоризъм и обстипация на червата; при акутно стомашно разширение, съпроводено със силни колични пристъпи; при остър ставен и мускулен ревматизъм, при ишиас, лумбаго; при треска; при болки от пикочен и жлъчен произход; при запушване на хранопровода; при спазми на маточната шийка през време на раждане; при подготовка за провеждане на елементарни хирургически интервенции, при лапаро - руменотомия, кастрация (заедно с локална анестезия), при цезарово сечение.

### **5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ**

Да не се използва при алергии, включително и към други пиразолонови продукти и инхибитори на простагландиновата синтеза (напр. аспирин), нарушение в кръвотворенето; остра чернодробна порфирия.

## **6. НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ**

Продължително прилагане във високи дози може да причини левкопения и агранулоцитоза.

Ако забележите някакво сериозно въздействие или други ефекти, вследствие от употребата на този ВМП, които не са описани в тази листовка, моля незабавно да уведомите Вашия ветеринарен лекар.

## **7. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП**

Говеда, коне, свине, кучета и котки.

## **8. ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ**

Средна доза: 0.01 – 0.02 g/ kg т.м.

Интрамускулно и подкожно при говеда и коне по 20 – 40 ml; при свине до 10 ml; при кучета и котки по 0.03 g/kg т.м.

Интравенозно (бавно) – за говеда и коне по 10 – 20 ml.

Перитонеално – за свине по 0.04 – 0.05 g/kg т.м.

Третирането може да се повтори след 1 час в същите дози.

## **9. СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ**

Няма.

## **10. КАРЕНТЕН СРОК**

### Говеда:

Месо и вътрешни органи – 28 дни.

Мляко – 7 дни.

### Свине:

Месо и вътрешни органи – 28 дни.

### Коня:

Не се разрешава за употреба при коне, чието месо и мляко е предназначено за човешка консумация.

## **11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА**

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Да се съхранява при температура под 25 С.

Да се пази от светлина.

Да се съхранява на сухо място.

Да не се използва този ветеринарномедицински продукт след изтичане срока на годност, посочен върху етикета.

Срок на годност след първото отваряне на опаковката: 28 дни. Да се съхранява в хладилник (2 С– 8 С).

## **12. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ**

### Бременност и лактация:

Безопасността на ветеринарномедицинския продукт не е доказана по време на бременност и лактация. Прилага се само след преценка полза/ риск от отговорния ветеринарен лекар.

### Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие:

Може да се комбинира с атропин, бусколизин и други спазмолитици.

В резултат на чернодробна ензимна индукция Метамизол натрий понижава активността на кумариновите антикоагуланти. Понижава плазмените нива на циклоспорин.

### Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти):

Продължителното прилагане на високи дози може да причини левкопения, агранулоцитоза, алергични реакции, гърчове, намаляване на диурезата.

Няма специфичен антидот. Лечението е симптоматично.

## **13. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА**

ВМП не трябва да бъдат изхвърляни с битови отпадъци или отпадни води.

Попитайте Вашия ветеринарен лекар какво да правите с ненужните ВМП. Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда.

## **14. ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА**

15/01/2012

## **15. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ**

Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара.

За всяка информация относно този ветеринарномедицински продукт, моля свържете се с териториалния представител на притежателя на лиценза за употреба.