


Обезпаразитяване

Алгоритъм

1. **КЧ или КТ?**
2. На каква **възраст** е? (над или под 1 месец?)
3. **Тегло?**
4. **Какво е взимало?** (Ако е взимало Дирофиларио-превантивно преди по-малко от 6 месеца, пак му дай).

Наблюдавайте в следващите 24 часа дали ще изкара паразити. Ако изкара, трябва отново да му се даде хапче след 2 седмици, за да се освободи от паразити напълно.



Куче:

25. ден (3 седмици и половина) – **обезпаразитяване** на малките кученца (с Дронтал пъпи) и майката (Цестал).
След 2 седмици (5 ½ седм.) – второ **обезпаразитяване**.

Първа ваксина (края на 6-та седм.)

Обезпаразитяване - Дронтал пъпи 1 мл/кг / Прококс 0,5 мл/кг (ако КЧ>0,4 кг)

Втора ваксина (края на 8-ма седм.)

Обезпаразитяване (9. седм.) - Дронтал пъпи 1 мл/кг / Прококс 0,5 мл/кг (ако КЧ>0,4 кг)

Обезпаразитяване (11. седм.) - Дронтал пъпи 1 мл/кг / Прококс 0,5 мл/кг (ако КЧ>0,4 кг)

Трета ваксина (края на 12-та седм.)

Ваксина, после обезпаразитяване и ваксина. После обезпаразитяване всеки месец.

Котка:

Първо **обезпаразитяване** – на 1-месечна възраст. Може и по-рано.

Ако са на по-малко от месец – Дронтал пъпи (1 мл/кг)/ Панакюр (50 мг/кг)

Ако са на месец и нагоре – Цестал кет;

под 1 кг	¼ табл.
1-2 кг	½ табл.
2-4 кг	цяла табл.
4-6 кг	1 ½ табл.
6-8 кг	2 табл.

Ако КТ изкарат паразити, то след 2 седмици отново се **обезпаразитява**.

Дирофилариоза:

Не се дава профилактично за дирофилариоза, ако са минали повече от 6 месеца от последния път!

Ушна краста:

Три третиране през две седмици и четвъртото третиране е месец след третото.

КТ до 4 кг – 0.16 мл моксиклиър за кучета.

КТ над 4 кг – 0.32 мл моксиклиър за кучета.

С моксиклиър за кучета е лечението за котки, защото излиза два пъти по-евтино.

Нексгард Комбо – също за ушна краста.

Точно преди четвъртото третиране се прави микроскопско изследване на ушен секрет, за да се прецени дали има нужда от допълнително третиране.

Хейлетиелоза:

Външните обезпаразитяващи не убиват хейлетиелите. Само неостомозан или Ектолуцил, но последното може да причини алергична реакция.

За хейлетиелоза: ампула Неостомозан – пръска се на 5 дена; разрежда се 1 мл в 400 мл вода. Пръска се по гърба и по тила.

Тромбикулоза:

Трумбикулата (жълти гнезденца) се убива само с Ектолуцил.

Как да се дават обезпаразитяващите?

Milpro, Milprazon, Credelio Plus, Panacur – with or **after** food.

Biheldon – **Do not give with food**.

Dihelvet – **With food**.

Cestol, Drontal, (Caniverm, Prazitel, Zipyran) – **Recommended to give after food**.

Others – **With or without food**.