


VETOQUINOL	Nom du produit : Dopram-V Intr FR	
Créé par : P. JARDEL	Référence article : 457598 1118 D L	
le : 05/02/19	Dimensions : 80 x 120 mm	
Visa :	1 couleur	
 281 U		



Magny-Vernois - 70200 LURE (France)



Dopram-V Intranasale® **solution intranasale**

Stimulant respiratoire, réanimation

COMPOSITION

Doxapram 17,4 mg
(s.f. de chlorhydrate monohydraté)
Parahydroxybenzoate de méthyle (E218) 0,9 mg
Excipients QSP 1 ml

PRÉSENTATION

Flacon de 10 ml

AMM n°FR/V/7392976 3/1992

INDICATIONS

Chez les veaux, les poulains, les chiots et les chats :
- Stimulation de la respiration et réanimation post-natale.

CONTRE-INDICATIONS

Obstruction des voies respiratoires.

EFFETS INDESIRABLES

Non connus.

MISES EN GARDE

Mises en garde particulières à chaque espèce cible

Aucune.

Précautions particulières d'emploi chez les animaux

Le produit n'est pas un antagoniste des myorelaxants, ni un antagoniste spécifique des narcotiques et anesthésiques.

Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament vétérinaire aux animaux

Aucune.

Utilisation en cas de gravidité ou de lactation

Sans objet.

Interactions médicamenteuses et autres

Avec les anesthésiques : attendre un minimum de 10 minutes après la fin de l'anesthésie avant d'administrer le produit.

Avec les sympathomimétiques : effet synergique.

Avec la xylazine ou les myorelaxants : effet antagoniste.

Surdosage

Un dosage excessif peut provoquer une hyperventilation capable de conduire à une alcalose respiratoire, une hypertension, de la tachycardie, des spasmes musculaires et une excitation généralisée du système nerveux central.

POSOLOGIE, VOIE ET MODE D'ADMINISTRATION

Voie d'administration : intranasale.

VEAUX, POULAINS :

En moyenne, 0,87 mg de doxapram par kg de poids vif, soit 2,5 ml de solution (1/4 du flacon) par animal correspondant approximativement à une forte pression sur le flacon.

CHIOTS : 1 à 5 gouttes, en fonction de la taille du nouveau-né et de l'intensité de la défaillance respiratoire.

CHATONS : 1 à 2 gouttes, en fonction de l'intensité de la défaillance respiratoire.

Instiller le produit par voie intranasale, la tête étant relevée et les narines placées en position supérieure, afin d'éviter l'écoulement du produit hors des cavités naturelles.

La durée et l'intensité de la réponse dépendent de la dose administrée et de l'état de l'animal au moment de l'intervention. L'administration du produit peut être répétée à intervalles de 15 à 20 minutes si nécessaire ; cependant, ne pas renouveler l'instillation tant que l'effet de la première dose n'a pas cessé. Avant administration du produit il convient de dégager les voies respiratoires du nouveau-né.

TEMPS D'ATTENTE

Viande et abats : zéro jour.

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

Aucune.

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

DATE DE LA DERNIERE NOTICE APPROUVÉE : 12/2018

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES À PRENDRE LORS DE L'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DÉCHETS DÉRIVÉS DE CES MÉDICAMENTS

Les conditionnements vides et tout reliquat de produit doivent être éliminés suivant les pratiques en vigueur régies par la réglementation sur les déchets.

USAGE VÉTÉRINAIRE

**À NE DÉLIVRER QUE SUR ORDONNANCE
DEVANT ÊTRE CONSERVÉE PENDANT AU MOINS CINQ ANS**

RESPECTER LES DOSES PRESCRITES, NE PAS FAIRE AVALER

Liste I

Licence Robins U.S.A.

457598 1118 D