

## Описание

Лактулоза-MIP е лекарствен продукт под формата на сироп, който се прилага за профилактика и лечение на чернодробна енцефалопатия при чернодробна недостатъчност (портална системна енцефалопатия); за лечение на запек (констипация), който не се повлиява от диета и/или друг препоръчан хигиенно- диетичен режим и регулиране на физиологичния ритъм на дебелото черво, както и при необходимост от меки изпражнения (хемороидална болест, операции на дебело черво).

Лактулоза-MIP съдържа лакгулоза (дизахарид), която не се разгражда от ензимите в тънкото черво и достига неразградена в дебелото черво. Чревните бактерии преработват лактулозата до нискомолекулярни органични киселини, които подкиселяват средата и увеличават обема на чревното съдържимо. Това води до стимулиране на перисталтиката (ритмичното свиване на гладките мускули на дебелото черво) и оформяне на меки изпражнения.

**Състав:** лакгулоза (65 g в 100 мл сироп), галактоза, фруктоза и лактозалимонена киселина (безводна), пречистена вода, ароматизатор - череша.

## Начин на употреба

Дозировката и продължителността на лечението се определят от лекар. Ако лекарят не е предписал друго, се препоръчва следната схема на употреба:

### **При запек:**

Дозировката се определя индивидуално и зависи главно от тежестта на запека. Ако след първите два дни не настъпи подобрение, може да се опита с по-висока дозировка! По правило дозировката може да се намали след първите няколко дни в зависимост от индивидуалните нужди на пациента! Продължителността на лечение с Лактулоза-MIP е индивидуална!

### **При чернодробна недостатъчност**

Дозата трябва да се увеличава постепенно.

### **Възрастни:**

След начална дневна доза от 10-15 ml лакгулоза дозата трябва да се увеличи до 30-45 ml лакгулоза, разделена на 3 до 4 приема дневно. Дозата трябва да се прецизира така, че да се постигне двукратно или трикратно изхождания на меки изпражнения всеки ден.

### **Деца:**

Не се препоръчва употреба при деца с чернодробни заболявания.

Lactulose-MIP сироп се приема с неговата мерителна чашка. По-лесно се приема и усвоява с течности като: вода, плодов сок, чай, кафе, кисело мляко, както и с каши. Лактулоза-MIP може да се приема по всяко време, независимо от часовете на хранене и приемът на храна. Когато еднократна дневна доза Лактулоза-MIP е достатъчна за лечение на запек, е установено, че прилагането му сутрин след закуска се понася най-добре. Лаксативния ефект настъпва 2 до 10 часа след

приема на лекарството. Ако дозата е недостатъчна, първата дефекация може да настъпи след 24 -48 часа.

**Нежелани реакции:**

В редки случаи, в първите дни на лечението се засилва образуването на газове в червата (метеоризъм). По правило това отзвучава до няколко дни. Коремни болки и диария са възможни при употреби на дози, по-високи от предписаните. В такива случаи дозата трябва да се намали и да се потърси съвет на лекар. При продължителна употреба Лактулоза-MIP може да предизвика електролитен дисбаланс.