



# Synulox RTU

(Синулокс - готова инжективна суспензия)

Потенциран с квалуланова к-на амоксицилин

**Нова оригинална формулировка** - двойно действие.

**Разширен спектър на действие** - клавулановата киселина потенцира действието на амоксицилина, като го прави активен срещу резистентните ?-лактамаза продуциращи щамове на стафилококи, коли бактерии, салмонели, щамове на кампилобактерии.

-Убива бързо бактериите - увеличава възможността за бързо клинично лечение.

-Отлична абсорбция и проникване - осигурява достатъчно високи нива на Синулокс за постигане на желанния клиничен ефект.

-Високо ефективен - новата формулировка увеличава във висока степен възможността за

лечение само с амоксицилин.

## Описание

Synulox RTU представлява мръсно - бяла суспензия, съдържаща 35 мг/мл клавуланова киселина като калиева сол Ph Eur, 140 мг/мл амоксицилин трихидрат Ph Eur и естествена олеозна основа до 100 ml.

## Начин на действие

а) **In vitro** е активен срещу голям брой микроорганизми:

### Gram -

*Actinobacillus pleuropneumoniae*; *Actinobacillus lignieresii*; *Actinobacillus equuli*; *Bordetella bronchiseptica*; *E.coli*; *Haemophilus* spp.; *Fusiformis* spp.; *Moraxella* spp.; *Pasteurella* spp.; *Proteus mirabilis*; *Salmonella* spp.

### Gram +

*Actinomyces bovis*; *Bacillus anthracis*; *Clostridium* spp.; *Corynebacterium* spp.; *Erysipelothrix rhusiopathiae*; *Streptococci*; *Staphylococci* (включително ?-лактамаза продуциращи щамове)

## б) Показания

**говеда** - респираторни инфекции, инфекции на меките тъкани, заболявания на ставите, абсцеси, метрити, мастити.

**прасета** - респираторни бактериални инфекции при подрастващи, колибацилоза, ММА синдром при свине;

**кучета, котки** - респираторни инфекции, инфекции на пикочните пътища, кожни инфекции (абсцеси, пиодерма, възпаление на аналните жлези), гингивит и др.

**Внимание:** Да не се прилага на зайци, морски свинчета и хамстери

## Доза и начин на приложение

8.75 мг/кг тегло = 1мл суспензия за 20 кг тегло в продължение на 3 до 5 дни.

Хомогенизирайте съдържанието на флакона добре чрез разклащане и инжектирайте подкожно или мускулно на кучета и котки; мускулно на преживни и прасета.

## Карентен срок

Мляко - 48 часа (пет млеконадоя при двукратно доене);

Месо - 14 дни след последното третиране.

**Специални указания:** Винаги да се ползва суха стерилна игла при изтегляне на суспензията за инжектиране!

Клавулановата киселина е чувствителна на влага. Съдържанието на флакона трябва да се оползотвори в рамките на 28 дни!

**Опаковка:** флакони по 40 и 100 ml

**Съхранение:** под 25°C

**Срок на годност:** 18 месеца

**Начин на отпускане:** по лекарско предписание

**Предпазни мерки при унищожаване на неизползван ВМП:** съгласно действащото законодателство на Р България

*Само за ветеринарномедицинско приложение!*

**Наименование или корпоративно име и адрес или регистрирано място на съдържателя на разрешителното на ветеринарномедицинския продукт**

**ПФАЙЗЕР НСР КОРПОРЕЙШЪН ТП, СОФИЯ 1784, БУЛ. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 115А, БЪЛГАРИЯ**