

INTROVIT B-complex

инжекционен разтвор за подкожно или дълбоко интрамускулно приложение при говеда, овце, кози, свине и коне

Притежател на лиценза за употреба:

Interchemie werken "De Adelaar" BV,

Metaalweg 8, 5804 CG Venray, The Netherlands

Tel: + 31 402070 367, Fax: + 31 402070 541, e-mail: registration@interchemie.com

Производител отговорен за освобождаване на партидите:

Interchemie werken "De Adelaar" Eesti AS

Vanapere tee 14, Pringi, Viimsi Parish, Harju Country 74001, Estonia

Tel, fax: + 372-6005006, e-mail: factory@interchemie.com

СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ

1 ml разтвор съдържа:

Активни субстанции

Thiamine hydrochloride	10.0 mg/ml	Riboflavin sodium phosphate	5.0 mg/ml
Pyridoxine hydrochloride	5.0 mg/ml	Cyanocobalamin	20 µg/ml
Dexpanthenol	12.5 mg/ml	Nicotinamide	50.0 mg/ml
Biotin	100.0 µg/ml	Choline chloride	10 mg/ml

Ексципиенти

Benzyl alcohol	Sodium hydroxide ad pH = 4.5
Sodium citrate	Water for injections ad 1 ml

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

Като допълнителен източник на витамини В комплекс в случаи на витаминен дефицит при говеда, овце, кози, свине и коне по време на заболявания, периоди на възстановяване и при условия на стрес (причинени от ваксинация, транспорт, висока влажност, извънредни температурни промени).

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Няма.

НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ

Може да се наблюдава слабо дразнене в мястото на инжектиране.

Ако забележите някакво сериозно въздействие или други ефекти, вследствие от употребата на този ВМП, които не са описани в тази листовка, моля незабавно да уведомите Вашия ветеринарен лекар.

ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Говеда, овце, кози, свине и коне.

ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ

Да се прилага подкожно или дълбоко интрамускулно. Дозата може да бъде приложена 2-3 пъти седмично в зависимост от състоянието на животните. Трябва да се вземат необходимите асептични мерки при работа с продукта.

Коне и говеда: 10 – 15 ml; телета и кончета: 5 – 10 ml; овце и кози: 5 – 10 ml; агнета: 5 – 8 ml; свине: 2 – 10 ml.

СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Ако дозата надвишава 20 ml трябва да бъде разделена и приложена в две места на инжектиране.

КАРЕНТЕН СРОК

Месо: нула дни.

Мляко: нула дни.

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Да се съхранява при температура 15 °C - 25 °C. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Срок на годност след първото отваряне на опаковката: 14 дни.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните:

Трябва да се вземат необходимите асептични мерки при работа с продукта.

Трябва да се избягва инцидентното самоинжектиране.

Бременност и лактация:

INTROVIT B-complex може да бъде прилаган при бременни и лактиращи животни.

СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

Всеки неизползван ветеринарномедицински продукт или остатъци от него, ако има такива, трябва да бъдат унищожени, съобразно изискванията на местното законодателство.

ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА

08/05/2014

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

За всяка информация относно този ветеринарномедицински продукт, моля свържете се с териториалния представител на притежателя на лиценза за употреба:

„Синхроген Фарма“ ООД, бул. „Христофор Колумб“ 43, 1592 София

Телефонен номер: 02 4949 230

Електронна поща: info@synchrogen.eu