

### Остра диария:

КЧ КТ? Възраст? ДОС или ВОС?

#### При младо КЧ:

- **ДОС** – тест **Гиардия** и **копро проба**:
  - Отрицателни – интрамицин
  - Гиардия (+) – Панакюр (фенбендазол) 1 мл/2 кг 3 посл. дни, после 14 дни почивка, после пак 3 дни фенбендазол.
  - *КЧ правят лесно хипогликемии!*
  - *Ако Карагьозов пита: Интрамицин + Гентамицин*
  - *Винаги мери температурата!*
- **ВОС** – тест **CPV, CCV, Giardia** – Интра + Гента (ако не подействат, Метро и Цефтриак), Квамател, Превомакс, Катозал, Вит. Ц, др.

#### При млада КТ:

- **ДОС** – метронидазол. Ако не се повлияе след 3 дена – **копро проба**.
- **ВОС** – тест **панлевкопения** – Интра + Гента (ако не подействат, Метро и Цефтриак), Квамател, Превомакс, Катозал, Вит. Ц, др.

#### Пораснало КЧ (вече на 1-2 години):

Остра диария:

- **ДОС** – първия ден бусколизин и лечебна храна, 12 часа гладно. „Няма да бързаме с АБ. Ако утре отново има разстройство, елате отново.“
- Ако КЧ не е по-добре утре: ???
- **ВОС** – АБ, който може да е
  - Бисептол – по 30 мг/кг сутрин и вечер. Бисептол – събираме двете числа. Повече от 3 хапчета не се дават.
  - Флажил – не повече от три хапчета сутрин и вечер.

#### Пораснала КТ:

Флажил (ако могат да дават хапчета) или ???

Бисептол и интертрим не се дават на КТ! Защото повръщат от тях.

**ВОС** (пораснала котка)

Течна диария – тест панлевкопения

Ако е по-добре – интрамицин и гентамицин/ интрамицин и метронидазол.

При диария – гранула. Пауч – при повръщане.

Ако втори ден е с разстройство – копро проба.

