
# Бяс

## Дефиниция

Бесът е **зоонозно** вирусно заболяване, протичащо с тежки **нервни смущения** - възбуда, парези, парализи и **летален** изход.

## Етиология

Причинител е **рабдовирус** от род Lyssavirus, от семейство Rhabdoviridae. Той е **невротропен** вирус, който в клетките от нервна тъкан формира характерни кръгли, еозинофилни цитоплазмени включения, известни като **телца на Бабеш-Негри**.



#### Епидемиология

**Възприемчиви** са всички бозайници, вкл. и човек, като най-чувствителни са <u>лисиците</u>, а най-устойчиви са <u>птиците</u>.

Основни **източници на инфекцията** са <u>болните</u> животни - които отделят вируса (в най-големи количества) **чрез слюнката**. Вирусоотделителството започва по време на инкубационния период:

- при кучето 6.-14. ден
- при котката 1.-13. ден
- при прилепите 100 преди клиничната изява

Заразяването се осъществява контактно - чрез ухапване и одраскване. А при човек може и при трансплантация на органи.

Преживните се заразяват най-често след ухапване.


## Бесът се дели на два типа:

- градски (кучешки) кучето се явява източник и основен разпространител
- **горски** (лисичи) чийто резервоар са червената и полярната лисици, и прилепите

За поддържането на веригата на заболяването е достатъчно гъстотата на живеещите лисици да е 1 лисица на 2 кв. км.

#### Патогенеза

Входна врата на вируса е <u>ухапната рана</u>, придвижва се <u>по</u> <u>сетивните нерви</u> и достига <u>главния мозък</u>, а от там <u>слюнчените жлези</u>. Вирусът се локализира в **малкия** мозък, в **продълговатия** мозък и в **кората** на главния мозък.



#### Клиника

При **кучето** - най често се среща буйния бяс, който има три стадия:

- **начален** продължава до 3 дни характеризира се с апатия, необщителност, често виене.
- **възбуден** продължава до 3 4 дни кучето тича усилено, <u>напуска</u> <u>стопанина</u>, появява се склонност към хапане, проява на <u>агресия</u>, <u>хидрофобия</u>, <u>саливация</u>.
- **паралитичен** стадии до 3 дни парализират се последователно долната челюст, глътката, хранопровода, езика. Има наличие на кривогледство. Кучето започва да се влачи след парализа на крайниците.

Има и на други форми на беса:

- тих бяс стадия на възбуда липсва
- атипичен бяс липсват възбуда и парализи.

### Диагностика

Диагнозата се поставя въз основа на епидемиологичните данни, на клиничните признаци и се потвърждава от лабораторните изследвания. Необходим материал за лабораторно изследване е цялата глава на животното. Поставя се във водонепропусклив контейнер с плътно затварящ се капак. Контейнерът се слага в друг контейнер с лед. Могат да се ползват полиетиленови торби: първата се завързва и се поставя във втората, като между тях се поставя лед.

В диференциално-диагностично отношение е необходимо да се имат предвид:

• тетанус

- болест на Ауески
- Ганата при кучетата
- Енцефаломелитите при конете

## При преживните да се имат предвид:

- отравяния с неврогенни отрови
- листериоза
- прионовите спонгиоформни заболявания

#### Лечение

Заболяването не се поддава на лечение.

## Превенция и контрол

<u>При внос на кучета котки и други месоядни</u> животни те задължително трябва да се придружават с индивидуален **паспорт** и ветеринарен **сертификат** за произход и здравословно състояние, издаден от държавен ветеринарен лекар, който установява, че:

- 1. животното е **прегледано** от държавен вет. лекар не по-рано от 24 часа преди датата на износа и не е показало клинични признаци на заболяването;
- 2. при животни над 3-месечна възраст е извършена **ваксинация** срещу бяс не по-малко от 30 дни и не повече от 12 месеца преди датата на износа.
- 3. В населеното място, от което произхожда животното, не е регистриран случай на бяс през последните 6 месеца.

# При лабораторно потвърждаване на бяс:

- заболяването се обявява
- прави се епидемиологично проучване
- разпорежда се убиване на заболелите животни
- изолират се съмнителните за бяс животни те се наблюдават за 30 дни, а ако не е възможно, тогава се убиват.
- извършва се задължителна ваксинация срещу бяс на всички кучета, котки и домашни животни, излизащи на паша
- забранява се излизането на животните в други населени места
- забранява се клането

Ограничителните мерки се прекратяват <mark>30 дни</mark> след последния случай на бяс.