

**Ноновулин**

таблетки за кучета и котки

**Nonovulin**

tablets for dogs and cats

**Име и постоянен адрес на притежателя на лиценз за употреба и на производителя, ако те са различни**

Притежател на лиценз за употреба и производител, отговорен за освобождаване на партидата:

"Голашфарма" ООД, гр. Сапарева баня, ул. "Победа" № 33, обл. Кюстендил, Република България  
Моб. тел.: +359 888 300 755, E-mail: golashpharma@abv.bg

**Наименование на Ветеринарномедицинския продукт**

Ноновулин таблетки за кучета и котки

Megestrol acetate 10 mg

**Съдържание на активната субстанция и ексципиентите**

Всяка таблетка съдържа:

Активна субстанция: Megestrol acetate 10 mg

Ексципиенти: Starlac (Lactose monohydrate 85 % и Maydis amyllum 15 %), Povidone, Talcum, Magnesium stearate, Silica, colloidal anhydrous.

**Терапевтични показания**

За блокиране (прекъсване) и отлагане на еструса при кучета и котки; за успокояване на сексуално възбудени мъжки кучета и котараки и свързаните с това промени в поведението (сатириазис); при котки се препоръчва за успешно лечение на милиарен дерматид и еозинофилен гранулом.

**Противопоказания**

Да не се използва при недостигнали полова зрелост кучета и котки; да не се използва при бременни кучета и котки и при псевдобременност; при кучета и котки с гинекологични разстройства на хормонална основа и при гинекологични инфекции.

Да не се използва при животни с диабет.

Да не се използва при мъжките кучета, предназначени за разплод.

**Неблагоприятни реакции**

Понякога се наблюдават опити за повръщане, безапетитие, апатия, поява на лактация, увеличаване на случаите на ендометрити и пиометра, цистозна хиперплазия на ендометрума, провокиране и изостряне на захарен диабет, фиброцистозна дегенерация и тумори на млечната жлеза. При прекратяване на третирането понякога, дори в препоръчаните дози, се наблюдава нередовност в половия цикъл. Ако забележите някакви неблагоприятни реакции, включително и такива, които не са описани в тази листовка или мислите, че ветеринарномедицинският продукт не работи, моля да уведомите Вашия ветеринарен лекар.

**Видове животни, за които е предназначен ВМП**

Кучета и котки.

**Дозировка за всеки вид животното, метод и начин на прилагане**

Прилага се перорално в доза:

Кучета:

За прекъсване на еструса - по 1 - 2 mg на kg/т.м. (средно по 1,5 mg на kg/т.м.) за 3 дни, започвайки с появата на първите признаци на разгонеността (оток на вулвата, поява на кървави флукули в естралния секрет) и по 0,5 - 1 mg на kg/т.м. в следващите 7 дни (по 1 - 2 таблетки в първите 3 дни и по 1/2 - 1 таблетка през следващите 7 дни).

За забавяне (временно отлагане) на еструса (при транспорт, участия в изложби и състезания и др.) - по 0,5 mg на kg/т.м. дневно, като третирането започва 7 дни преди очакваната разгоненост и продължава докато е необходимо отлагането на еструса (минимум 14 дни), като при необходимост от продължаване на ефекта, след почивка от 10 дни процедурата може да се повтори. Това може да се прави само един път на 6 месеца.

При сексуално възбудени мъжки кучета (сатириазис) със или без агресивност или други промени в поведението се използват същите дози, както за прекъсване на еструса при женските кучета.

#### Котки:

За прекъсване на еструса - по 5 mg на котка (1/2 таблетка) за 8 последователни дни, започвайки с първите признаци на еструса.

За отлагане на еструса - по 2,5 mg на котка (1/4 таблетка) 3 пъти седмично през целия естрален период.

При сатириазис при котарациите - по 2 mg на kg/т.м. за 30 дни (до изчезване на признаците).

#### **Съвет за правилно приложение**

Нововулин таблетки не трябва да се прилага заедно с храната за деня.

#### **Карентен срок**

Не е приложимо.

#### **Специални условия за съхранение на продукта**

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места. Да се съхранява в оригинална опаковка.

Да се съхранява при температура под 25° C.

Да се съхранява на сухо място.

Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да не се използва този ветеринарномедицински продукт след изтичане срока на годност, посочен върху опаковката.

#### **Специални предупреждения**

Бременност и лактация:

Не се прилага по време на бременност.

#### Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти):

При продължително приложение във високи дози е възможна апатия и затлъстяване на третираните кучета и котки, glandуло-цистозна хиперплазия на ендометриума, фиброцистозна дегенерация и тумори на млечната жлеза, метрити, пиометри. При младите, недостигнали полова зрелост животни, често се получава липса на еструс и безплодие. При прекратяване на третирането, дори в препоръчаните дози, се наблюдава нередовност в половия цикъл.

#### **Специални мерки за унищожаване на неизползван продукт или остатъци от него, ако има такива**

ВМП не трябва да бъдат изхвърляни чрез битови отпадъци или отпадни води. Попитайте Вашия ветеринарен лекар какво да правите с ненужните ВМП. Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда. Всеки неизползван ветеринарномедицински продукт или остатъци от него трябва да бъдат унищожени в съответствие с изискванията на местното законодателство.

**Датата на последната редакция на текста**

25/10/2017

**Допълнителна информация**